Teeltadvies | schurft, zwartvruchtrot, pseudomonas

24 maart 2026

Dit bericht is verlopen. Eventuele adviezen zijn hierdoor niet meer geldig.

Schurft

De laatste dagen zijn met het mooie weer en hogere temperaturen overal grote hoeveelheden ascosporen rijp geworden, die klaar liggen om uitgestoten te worden. Met de weersvoorspelling voor komende dagen zal dit ook gaan gebeuren. Het ziet er naar uit dat we te maken krijgen met een langere bladnat periode en dus een zware schurftinfectie, die een aantal dagen kan doorlopen. Het lijkt ons verstandig om deze infectie zowel preventief als curatief te bestrijden. Preventief is er bijna overal gespoten met Syllit/Dyssit of Delan en mogen we uitgaan van een preventieve werking van 3-4 dagen. Als het tot een infectie komt is ons advies om een curatieve bespuiting uit te voeren met Faban, Scala/Pyrus of Chorus. Voeg aan Scala/Pyrus en Chorus altijd een preventief middel toe.

Faban 1,2 l/ha

Scala/Pyrus 0,75 l/ha

Chorus 0,4 kg/ha

Delan 0,5 kg/ha

Delan Pro 2,5 l/ha



Zwartvruchtrot

Uit onderzoek naar sporen op blad, van een aangetast perceel uit 2025 dat we hebben laten uitvoeren, is gebleken dat de ascosporen ook rijp zijn en worden uitgestoten. Deze uitgestoten sporen gaan weer conidiën vormen die ervoor zorgen dat er nieuwe aantasting in de percelen kan ontstaan. Uit voorgaande proeven weten we dat het verstandig is om nu een bespuiting uit te voeren met Faban, Scala/Pyrus of Chorus om de aanwezige sporen af te doden en de druk te verlagen.

Afgelopen jaren is in proeven en in de praktijk ervaring opgedaan met Trianum-P (Trichoderma) over de bodem. Hieruit is gebleken dat het een reductie kan geven van zwartvruchtrot. Het advies is om 2 toepassingen van 1,5 kg/ha volvelds uit te voeren. De 1^{e} toepassing kort voor de bloei en de 2^{e} toepassing circa 3 weken later.

De meeste fungiciden hebben een licht nadelig effect op Trianum. Het advies is om vijf tot zeven dagen te wachten met een fungicide, na de behandeling met Trianum.
Sommige fungiciden op basis van pyrimethanil (Scala en Faban) en tebuconazool (Luna Experience) hebben een sterker negatief effect op Trianum-P. Voor deze middelen is het advies

een wachttijd van 14 dagen aan te houden.

Tot slot geeft de fabrikant aan, om Trianum-P na ontvangst koel te bewaren. Zie hiervoor ook het advies op de verpakking.

Trianum-P

2x 1,5 kg/ha



Pseudomonas

De weersomstandigheden die worden voorspeld zijn gunstig voor de ontwikkeling van pseudomonas. Nat en koud weer kunnen de aantasting versterken. Het gaat dan met name om de perenrassen Xenia en B.A. Lucas. Het is belangrijk om de knoppen te versterken met Soriale, Amino Complex en/of Iodus.

Na de bloei kunnen we Luna Care inzetten tegen pseudomonas.

Soriale 1,8 l/ha

Amino Complex 1,5 l/ha

Iodus 1 l/ha



Meeldauw

Op percelen met een hoge druk van meeldauw zien we de eerste aangetaste witte bloemclusters al verschijnen. Dit betekent dat er op deze percelen sporulatie plaatsvindt en nieuwe aantasting kan ontstaan. Het is belangrijk om op deze percelen te starten met de bestrijding. Hiervoor hebben we

diverse middelen, de keuze van het middel is afhankelijk van de ervaringen en de werking uit het verleden. Een sterk middel dat nu ook ingezet kan worden tegen meeldauw en schurft is Sercadis. Onze voorkeur is om dit middel later in het seizoen in te zetten.

Nimrod 0,5 l/ha

Cyflamid 0,5 l/ha

Luna Privilege 0,15 l/ha

Sercadis 0,25 l/ha



Perenbladvlo

Tijdens de waarnemingen in het veld zien we dat de eieren die er nu liggen aan het uitkomen zijn en dat de larven tussen de bloemclusters kruipen. Deze larven kunnen bestreden worden met Teppeki/Afinto. Voor een goede bestrijding is het belangrijk dat de clusters iets loskomen en de larven geraakt kunnen worden. Ook de hoeveelheid opneembare delen zal belangrijk zijn voor een

goede opname en bestrijding. Gebruik bij deze bespuiting voldoende water en voeg WellPower of Siltac SF toe.

Teppeki/Afinto 0,14 kg/ha

WellPower 100 ml per 100 l water

Siltac SF 100 ml per 100 l (alleen bij sneldrogend weer!)



Roze appelluis, roze perenluis en grasluis

De stammoeders van de roze luis zijn nu goed te vinden en daarnaast komen we met name in de peren de grasluizen tegen. Het is belangrijk om tijdig een bestrijding uit te voeren om te voorkomen dat we later in het seizoen een hoge druk hebben. Belangrijk bij deze bestrijding is het raken en een goede opname van de middelen. Op dit moment kan een bestrijding het beste uitgevoerd worden met Teppeki/Afinto of Gazelle. Voor een betere opname WellPower toevoegen en voldoende water gebruiken. Bij het gebruik van Teppeki/Afinto ervoor zorgen dat de pH van de

spuitvloeistof niet hoger is dan pH 6. De pH kan gereguleerd worden met Uptake.

Teppeki/Afinto 0,14 kg/ha

Gazelle, Wopro Luisweg, Amiprid, Inter Aprid 0,25 kg/ha

Het Gazelle en afgeleiden W7 etiket mag opgebruikt worden tot 1 april 2026, waarna de toelating in peer vervalt.



Rupsen

Met regelmaat worden er rupsen van wintervlinder en bladroller in de clusters gevonden. Wanneer dit het geval is zal een bestrijding nodig zijn. Het enige toegelaten middel op dit moment is Xentari. Voor een goede werking moeten de rupsen klein zijn en veel eten. Dit betekent dat de temperatuur boven de 18 graden moet zijn. Voor een betere werking van Xentari is het ook belangrijk dat de pH van de spuitvloeistof aangezuurd wordt tot pH 6.

Vaak zien we dat één bespuiting niet voldoende is, en dat deze nog een of twee keer om de 10 dagen herhaald moet worden.

Xentari 1 kg/ha



Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/fruitteelt/teeltadvies-schurft-zwartvruchtrot-pseudomonas/.