Teeltadvies Steenfruit | luizen, voeding, zwartstrookbeheer en plannen voor volgend jaar

29 september 2026

Dit bericht is verlopen. Eventuele adviezen zijn hierdoor niet meer geldig.

Migrerende luizen bestrijden in de herfst

De bestrijding van de luizen is er niet makkelijker op geworden met het middelenpakket dat nog beschikbaar is. Bij de kersen is het de zwarte kersenluis die jaarlijks voor problemen zorgt. Bij de pruimen zijn het de melige pruimenluis en de groene kortstaartluis.

Deze luizen hebben allemaal een waardplantwisseling in de zomer. Vanaf deze tijd ontstaan er mannetjes- en vrouwtjesluizen, die vanuit de zomerwaardplanten terug migreren naar de kersen of de pruimen. Daar vindt paring plaats en volgt de ei-afzet. Deze eieren overwinteren en komen dan in het voorjaar uit. Dan begint de nieuwe vrouwelijke lijn van luizen met de zogenaamde stammoeders.

Al meerdere jaren wordt er gekeken of het mogelijk is om de luizenbestrijding al in de herfst op te pakken, om hiermee de paring en ei-afzet te voorkomen of in ieder geval te verminderen.

Door de komende periode enkele keren Siltac toe te passen, proberen we de migrerende luizen te doden vóór ze tot ei-afzet overgaan. Een 100% bestrijding zal heel moeilijk zijn, maar het kan de druk naar volgend jaar aanzienlijk verlagen. Het exacte moment van migratie is (nog) niet precies vast te stellen en het is ook wisselend en onduidelijk hoe lang de migratie en ei afzet duren.

Twee tot drie bespuitingen met Siltac in de komende weken lijken het meest logisch. Gebruik hiervoor ongeveer 400 tot 500 liter water per ha, want raken blijft cruciaal. Als dosering kunt u nu 150 ml Siltac per 100 liter water aanhouden dus afhankelijk van het waterverbruik is dat 600 tot 750 ml per hectare. Pas Siltac altijd toe op een droog gewas bij een lage luchtvochtigheid dus sterk drogend weer met uiteraard voldoende temperatuur.

Voeding en Pseudomonas

Als u een bespuiting met Siltac uitvoert, kunt u er ook nog voeding aan toevoegen om de reserves naar volgend jaar te verhogen. Gewasbespuitingen voor de bloei hebben bij kersen en pruimen niet zo heel veel meerwaarde, omdat er voor de bloei haast geen groene delen zijn.

De belangrijkste voedingsstoffen zijn nu stikstof in de vorm van Ureum tot ongeveer 10 kilo met Magnesium 5-7 kg en Borium 1 kg of 1 liter. Toevoeging van 1,50 liter Imex Aminocomplex is altijd logisch.

Als er de komende tijd wat slijtage op het blad komt, kan er nog Koper en Zink toegepast worden. Dit kan tevens de druk van pseudomonas wat verlagen.

N-Balancer

Dit is een (nieuw) product dat allerlei planten in staat stelt om de beschikbare suikers aan het eind van de teelt op te slaan in de reserves, zoals knollen, bollen of vruchten. In meerdere teelten zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan. Ook voor houtige gewassen kan het enige tijd voor de bladval een positief effect hebben op het transport en de opslag van reserves in het hout. Het zou dan sterkere knoppen moeten geven, wat de basis blijft voor een goed product in 2027.

N-Balancer bevat onder andere molybdeen en een hoge dosering borium. Met een dosering van 3-5 liter per ha kunt u hier ervaring mee opdoen. De Borium in het standaardschema kan dan achterwege blijven. Het is de bedoeling om dit middel drie tot vier weken voor de verwachte bladval toe te passen. Probeer ook altijd een stuk over te slaan zodat de eventuele verschillen vast te stellen zijn.

Zwartstrook beheer

Het is altijd de vraag hoe we de zwartstrook en de onkruidbeheersing onder de bomen overzichtelijk en controleerbaar houden. Een schone, overzichtelijke zwartstrook is nodig om u niet te laten verrassen door muizenschade en in het voorjaar geeft een schone zwartstrook minder lage temperaturen bij nachtvorst. Het onkruid onder de bomen kan nu eventueel nog een keer gemaaid of geklepeld worden. Voor een veilige glyfosaatbespuiting is het beter om nog te wachten, want de bomen zijn nog volop actief.

Waar teveel grassen onder de bomen blijft staan kan nu wel een bestrijding met Agil (0,75 ltr/ha mag twee keer per jaar, hogere dosering mag maar 1 keer per jaar) of kerb (2,50 ltr/ha) gedaan worden. Kiemend onkruid kan worden voorkomen met AZ 500. De toelating is 0,30 ltr/ha

boomgaard. Wacht met AZ 500 tot de temperaturen echt lager zijn, dan blijft de zwartstrook tot ruim na de bloei (half mei) schoon van kiemende onkruiden.

Beregening winterklaar maken

De watergeefsystemen hebben het werk dit jaar gedaan en kunnen in de winterstand. Spoel de leidingen eerst goed door met salpeterzuur om verstoppingen voor volgend jaar te voorkomen. Dan binnenhalen en opbergen wat naar binnen kan en de buiteninstallatie aftappen.

Plannen

Het is naar het eind van het jaar ook altijd een goed moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Geen enkel jaar is hetzelfde, maar je weet wel de aandachtspunten voor het komende jaar. De gewasbeschermingsmonitor en een bemestingsplan zijn verplicht, maar belangrijker is om voor uzelf een plan van aanpak voor het komende jaar te hebben.

Naast visuele waarnemingen aan het gewas blijft een grondmonster het uitgangspunt voor de bemesting. Om de drie tot vijf jaar is het dan ook verstandig om een grondmonster te nemen. Aan de hand daarvan kan er bekeken worden wat er nodig is om bij te sturen en hoe je dat gaat invullen.

Tot volgend jaar!

Dit is voor 2026 het laatste Steenfruit nieuws.

Zoals altijd is het een bijzonder jaar met veel uitdagingen geweest. Ook volgend jaar zal weer een bijzonder jaar worden voor de teelt van steenfruit.

Namens van Iperen wensen wij u alvast het allerbeste voor het nieuwe seizoen en wij hopen u dan ook weer van dienst te zijn.

Voor vragen en antwoorden of een goed gesprek kunt u altijd terecht bij een van onze adviseurs.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/fruitteelt/teeltadvies-steenfruit-luizen-voeding-zwartstrookbeheer-en-plannen-voor-volgend-jaar/.