Teeltadvies | vruchtboomkanker, bladval bevordering en perenbladvlo

24 november 2026

In dit teeltadvies komen bladval en bescherming tegen perenbladvlo en vruchtboomkanker aan bod.

Vruchtboomkanker

De bladval bij peer is de laatste tijd snel verlopen en er zijn veel bladlittekens ontstaan die vatbaar zijn voor een vruchtboomkankerinfectie. Op appelpercelen zien we dat er nog redelijk wat blad aanwezig is. Met het koudere weer, dat komende tijd voorspeld wordt, zal ook dit blad sneller gaan vallen. Hier ontstaan verse bladlittekens die geïnfecteerd kunnen worden. Het is daarom verstandig om deze bladlittekens af te dekken met een fungicide.

Aan het begin van de bladval wordt vaak nog een koperbladvoeding gespoten om het kopergehalte in de boom te verhogen. Met deze bespuiting worden ook de bladlittekens afgedekt. Op momenten met een veel bladval, vochtige omstandigheden en veel verse wondjes kan Captan worden ingezet i.c.m. Folicur. Folicur heeft nog een curatieve werking op vruchtboomkanker als de infecties net zijn gestart.

- Captan 0,98 kg/ha (2 toepassingen na de oogst)
- Folicur SC 0,3 ltr/ha bij appel of 0,24 ltr/ha bij peer (2 toepassingen/12 mnd)
- Folicur WG 0,5 kg/ha bij appel of 0,4 kg/ha bij peer (2 toepassingen/12 mnd)



Bladval bevorderen met CUL900

Zoals hierboven vermeld, zijn er nog appelpercelen waar nog veel blad aan de bomen aanwezig is. De bladval op deze percelen kan versneld worden door CUL900 in te zetten. Als CUL900 wordt gespoten, zien we dat het blad sneller en in een kortere tijd van de boom valt. Dit betekent dat er eerder gesnoeid kan worden en/of gerichter tegen vruchtboomkanker gespoten kan worden. Voor een goede werking van CUL900 is het belangrijk om onderstaande punten in acht te nemen:

- Blad moet van nature beginnen af te leven
- Een aantal dagen mooi weer na de toepassing versterkt de werking
- 1-2% oplossing. Uitgaande van 800-1000 ltr/ha water (10 ltr/ha CUL900)
- Uitvloeier toevoegen, Gondor/WellPower 250 ml/ha in 1000 ltr water

Perenbladvlo

Uit onderzoeken van PCF in België is gebleken dat met de inzet van Surround in het najaar, de druk van perenbladvlo in het voorjaar met ruim 50 tot 70% verminderd kan worden. Door de inzet in het najaar op springers, zien we dat deze minder actief worden en minder eieren afzetten in het

voorjaar. Het werkingspercentage is afhankelijk van het moment van inzetten. Op dit moment wordt kou voorspeld, en moet even gewacht worden totdat de temperaturen weer wat gaan stijgen en de springers weer actiever gaan worden. Ze zijn dan beter te raken en te verzwakken. Volgende week lijkt hiervoor het beste moment te zijn. Afhankelijk van de druk en neerslag moet de bespuiting herhaald worden. Per seizoen mag er 5x gespoten worden met 20-30 kg/ha en in totaal 110 kg/ha/12 mnd.

- Surround 20-30 kg/ha







De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/fruitteelt/teeltadvies-vruchtboomkanker-bladval-bevordering-en-perenbladvlo/.