Advieslijst gewasbescherming chrysant

11 augustus 2026

Insecticiden en acariciden

Bladluis

Afinto

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 21 dagen.

Inter Peki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 21 dagen.

Teppeki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 21 dagen.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen. Mag alleen ingezet worden als het gewas gesloten is.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

FLiPPER Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500-1000 ml · Max. toepassing/ha: 16 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

NeemAzal-T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: _ · Dosering per 100 ltr: 1500 ml · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt, 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 10 dagen.

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 400-800 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

MRL

Pediment

Actieve stof: Pirimicarb · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Werkt niet tegen alle soorten luizen. Aflevertermijn: 14-09-2026 Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Pediment rookontwikkelaar

Actieve stof: Pirimicarb · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

1 rookontwikkelaar per 400 m2. Max. 25 stuks/ha. Werkt niet tegen alle soorten luizen. Aflevertermijn: 14-09-2026 Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 30 dagen.

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Spruzit HP

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Dosering is afhankelijk van planthoogte

SKAL

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 65 ml · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Gazelle

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Mineervlieg

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gram · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen. Mag alleen ingezet worden als het gewas gesloten is.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen per blok, 6 toepassingen per 12 maanden. Interval 28 dagen tussen 2 blokken.

SKAL

NeemAzal-T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt, 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 10 dagen.

SKAL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Milbeknock

Actieve stof: Milbemectin · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen per blok, 9 toepassingen per 12 maanden. Interval tussen de blokken min. 28 dagen.

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Rups

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

CoStar WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: Max. 200 gr · Max. toepassing/ha: 0,30-1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 36/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Delfin

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

DiPel DF

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100-200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden

-

SKAL, MRL

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Turex WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 36/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Turex spuitpoeder

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Xentari

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,20 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen. Mag alleen ingezet worden als het gewas gesloten is.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen per blok, 6 toepassingen per 12 maanden. Interval 28 dagen tussen 2 blokken.

NeemAzal-T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt, 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 10 dagen.

SKAL

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Proclaim

Actieve stof: Emamectin benzoaat · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Wants

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen. Mag alleen ingezet worden als het gewas gesloten is.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 26 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

NeemAzal T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt, 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 10 dagen.

SKAL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 2000 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 462 gr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 2000 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Gazelle

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Wittevlieg

Admiral

Actieve stof: Pyriproxyfen · Groep: 7c · Dosering per 100 ltr: 25 ml · Max. toepassing/ha: 0,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Afinto

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 21 dagen.

Applaud

Actieve stof: Buprofezin · Groep: 16 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

interval min. 22 dagen.

Botanigard Vloeibaar

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 125 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 25/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 5 dagen. Let op met fungicidenbehandeling.

SKAL, MRL

Botanigard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 25/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 5 dagen. Let op met fungicidenbehandeling.

MRL

Eradicoat Max

Actieve stof: Maltodextrine · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 60 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Inter Peki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 21 dagen.

Lalguard M52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 120 ml · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 24/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Let op met fungicidenbehandeling.

SKAL, MRL

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 300 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 5 dagen.

SKAL, MRL

Teppeki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 21 dagen.

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 5 dagen.

SKAL, MRL

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen. Mag alleen ingezet worden als het gewas gesloten is.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,20-0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

NeemAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1500 ml · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt, 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 10 dagen.

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 400-800 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

MRL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,20-0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25-50 gr · Max. toepassing/ha: 462 gr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 30 dagen.

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1500 ml · Max. toepassing/ha: 18 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Gazelle

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Trips

Botanigard Vloeibaar

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 125 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 25/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 5 dagen. Let op met fungicidenbehandeling.

SKAL, MRL

Botanigard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 25/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 5 dagen. Let op met fungicidenbehandeling.

MRL

Lalguard M52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 120 ml · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 24/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Let op met fungicidenbehandeling.

SKAL, MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 5 dagen.

SKAL, MRL

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen. Mag alleen ingezet worden als het gewas gesloten is.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen per blok, 6 toepassingen per 12 maanden. Interval 28 dagen tussen 2 blokken.

FLiPPER Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500-1000 ml · Max. toepassing/ha: 16 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

NeemAzal-T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1500 ml · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt, 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 10 dagen.

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 400-800 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

MRL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 14 dagen.

Spruzit HP

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Dosering is afhankelijk van planthoogte.

SKAL

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 65 ml · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Winner

Actieve stof: Formetanaat · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 30 gr · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

4 toepassingen per teelt, max. 20 toepassingen per 12 maanden.

Spint

Eradicoat Max

Actieve stof: Maltodextrine · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 60 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Floramite

Actieve stof: Bifenazaat · Groep: 20d · Dosering per 100 ltr: 40 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen per blok en 56 dagen interval tussen twee blokken.

Nissorun vlb.

Actieve stof: Hexythiazox · Groep: 10a · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Een blok bestaat uit max. twee toepassingen met een interval van 7 dagen.

Scelta

Actieve stof: Cyflumetofen · Groep: 25a · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Een blok bestaat uit max. twee toepassingen met een interval van 7 dagen.

Cantack

Actieve stof: Acequinocyl · Groep: 20b · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen per blok en 28 dagen interval tussen 2 blokken.

Magister

Actieve stof: Fenazaquin · Groep: 21A · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1500/2000 ml · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 400-800 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

MRL

Borneo

Actieve stof: Etoxazool · Groep: 10b · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Bij een teeltduur van 3 maanden of minder maximaal 1 toepassing per teelt.

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Carex 10SC

Actieve stof: Pyridaben · Groep: 21a · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,90 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Milbeknock

Actieve stof: Milbemectin · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Aaltjes (o.a. wortel- knobbel)

NEMguard DE

Actieve stof: Knoflook extract · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 40 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Wanneer de grond droog is, kan de werking afnemen.

SKAL, MRL

Fungiciden

Echte meeldauw

Alibi Flora

Actieve stof: Azoxystrobin, difenoconazool · Groep: 11 en 3 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 0,90 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Amylo x

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 150 gr · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

SKAL, MRL

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3 en 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Collis

Actieve stof: Boscalid, kresoxim-methyl · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Flint

Actieve stof: Trifloxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 12,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,125 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 0,96 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/jaar · Wachttijd in dagen: -

-

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 5,00 ltr · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 5 dagen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 5,00 ltr · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/teelt, 70/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 12 dagen.

Soriale

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,86 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Soriale is niet mengbaar met stikstofhoudende meststoffen. Soriale mag niet worden gemengd met minerale oliën of producten op basis van carbonaat, bicarbonaat.

MRL

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: N.v.t. · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 3 dagen.

SKAL, MRL

Takumi

Actieve stof: Cyflufenamid · Groep: U06 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,15 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50-2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Dosering is afhankelijk van ziektedruk.

SKAL, MRL

Japanse roest

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3 en 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Collis

Actieve stof: Boscalid, kresoxim-methyl · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Flint

Actieve stof: Trifloxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 12,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,125 gr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Kenbyo FL

Actieve stof: Kresoxim-methyl · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50-1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,96 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/jaar · Wachttijd in dagen: -

-

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 5,00 ltr · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 5,00 ltr · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 12 dagen.

Topaz 100 EC

Actieve stof: Penconazool · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/Teelt 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Phytophthora

Captosan 500 SC

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 10 dagen.

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28 en P07 · Dosering per 100 ltr: 3 ml/m2 · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 14 dagen.

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aflevertermijn: 25-09-2026, opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: N.v.t. · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Botrytis

Amylo x

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 150 gr · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden

SKAL, MRL

Captosan 500 SC

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 10 dagen.

Geoxe

Actieve stof: Fludioxonil · Groep: 12 · Dosering per 100 ltr: 40 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 10 dagen.

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 5,00 ltr · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 5,00 ltr · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 602 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/teelt, 70/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: 80 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 12 dagen.

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 9 en 12 · Dosering per 100 ltr: 80 gr · Max. toepassing/ha: 0,96 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: N.v.t. · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Teldor

Actieve stof: Fenhexamide · Groep: 17 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50-2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Dosering is afhankelijk van ziektedruk.

SKAL, MRL

Vintec

Actieve stof: Trichoderma atroviride · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 10-20 gr · Max. toepassing/ha: 0,20 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Pythium

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P07 · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden

Min. interval 56 dagen. Aangietbehandeling.

Asperello T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00-3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 60 dagen.

SKAL, MRL

Lalstop K61 WP (Mycostop)

Actieve stof: Steptomyces · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 0,10 tot 1,00 kg · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 21 dagen.

SKAL, MRL

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,96 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/jaar · Wachttijd in dagen: -

-

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28 en P07 · Dosering per 100 ltr: 3 ml/m2 · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 56 dagen.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 14 dagen.

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aflevertermijn: 25-09-2026, opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 5,00 ltr · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 10 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 601 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/teelt, 70/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: N.v.t. · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Trianum-G

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: Volvelds strooien · Max. toepassing/ha: 25-50 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Rhizoctonia

Amylo x

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 150 gr · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden

SKAL, MRL

Captosan 500 SC

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 10 dagen.

Monarch

Actieve stof: Flutolanil · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: n.v.t. · Max. toepassing/ha: 6,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

Rizolex

Actieve stof: Tolclofos-methyl · Groep: 14 · Dosering per 100 ltr: 3,20 ml/m2 · Max. toepassing/ha: 32 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling voor planten.

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 602 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/teelt, 70/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 12 dagen.

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: n.v.t. · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Slakken

Ironmax Pro

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 7,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

Metarex Inov

Actieve stof: Metaldehyde · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

Nemaslug 2.0

Actieve stof: Parasitaire aaltjes · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

Bodemtoepassing max. 300.000/m2.

Sluggo Pro

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sluxx HP

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 7,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Zorg dat de pH van de spuitvloeistof op het juiste niveau is, want bij een afwijkende pH kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderen. Raadpleeg uw adviseur voor de juiste pH per middel en meet de pH na bereiding van de spuitvloeistof.

Het interval tussen de toepassingen is 7 dagen, tenzij anders staat vermeld in de opmerkingen.

SKAL: staat op de Skal Inputlijst. MRL: vrijgesteld van MRL.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a: Carbamates	3: DMI-Fungicides
3a: Pyrethroids, Pyrethrins	4: PA-Fungicides
4a: Neonicotinoids	5: Amines
4c: Sulfoximines	7: SDHI
4d: Butenolides	8: Hydroxy-(2-amino-)Pyrimidines
5: Spinosyns	9: AP-Fungicides
6: Avermectins	11: Qol-Fungicides
7c: Pyriproxyfen	12: PP-Fungicides
10a: Hexythiazox	14: AH-Fungicides
10b: Etoxazole	17: KRI-Fungicides
11a: Bacillus Thuringiensis	21: Qil-Fungicides
16: Buprofezin	28: Carbamates
18: Diacylhydrazines	40: CAA-Fungicides
20b: Acequinocyl	44: Microbial Fungicides
20d: Bifenazate	50: Aryl-Phenyl-Ketones
21a: Meti Acaricides and Insecticides	BM02: Biologicals with multiple MoA
22b: Semicarbazones	M02: Inorganic
23: Tetronic, Tetramic	M04: Phthalimides
25a: Beta-Ketonitrile derivatives	NC: Unknown
28: Diamides	P01: Salicylate-related
29: Flonicamid	P04: Polysaccharide Elicitors
UN: Unknown or uncertain MoA	P07: Phosphonates
UNF: Fungal agents of unknown or uncertain MoA	U06: Phenylacetamide

- Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking.
- Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
- De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.
- Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.

De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/tuinbouw/advieslijst-gewasbescherming-chrysant/.