Advieslijst gewasbescherming gerbera

11 augustus 2026

Insecticiden en acariciden

Bladluis

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

4 toepassingen/blok, 42 dagen tussen de blokken.

SKAL

Inter Peki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 140 gr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 21 dagen.

NeemAzal-TS

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden (6 blokken van 3) · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen/blok, 1,5 maand tussen blokken.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 900 ml · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Doseren afhankelijk van jaargetijde en soort bespuiting.

MRL

Pediment

Actieve stof: Pirimicarb · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 500 gr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Geen werking tegen katoenluis en tabaksperzikluis. Hogere temperaturen tijdens toepassing zijn gunstig. Opgebruiktermijn 30-12-2026.

Pediment rookontwikkelaar

Actieve stof: Pirimicarb · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

1 rookontwikkelaar per 400 m2. Opgebruiktermijn 30-12-2026.

Teppeki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 140 gr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 21 dagen.

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 200 ml · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Werkzame stof kan verboden zijn in retail.

FLiPPER Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,00 ltr · Max. toepassing/ha: 15 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 200 ml · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Werkzame stof kan verboden zijn in retail. Proefbespuiting uitvoeren in wintermaanden.

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Is schadelijk voor Delphastus, lange nawerking. Vanaf 31-12-26 geldt W8, met max 2 toepassingen/12 mnd.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Gazelle

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Spruzit HP

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 0,90 ltr · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 7 dagen.

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 65 ml · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. actieve stof / ha, zie etiket. W19 aflevertermijn 22-01-2027, opgebruiktermijn 22-07-2027

Mineervlieg

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen/blok, 90 dagen tussen twee blokken. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

NeemAzal-TS

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen/blok, 1,5 maand tussen blokken.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 900 ml · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,25 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen/blok, opnameverbeteraar toevoegen.

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen/blok, 28 dagen tussen blokken. Zeer resistentiegevoelig. Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

SKAL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Milbeknock

Actieve stof: Milbemectin · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden

3 toepassingen/blok. 28 dagen tussen blokken.

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden

Max. actieve stof / ha, zie etiket. W19 aflevertermijn 22-01-2027, opgebruiktermijn 22-07-2027

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Rupsen

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen/blok, 90 dagen tussen twee blokken. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

CoStar WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 36/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Delfin

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

DiPel DF

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100-200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Lepinox Plus

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 75-150 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,25 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen/blok.

Turex WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 36/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

XenTari WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,20 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Capsanem

Actieve stof: Steinernema carpocapsae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 miljoen · Max. toepassing/ha: 3 miljard · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

Verwijder filters kleiner dan 0,3 mm (300 micron). Pompdruk max 20 bar/2000 kPa/290 psi. Spuitdop groter dan 0,5 mm (500 micron).

SKAL, MRL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen/blok, 28 dagen tussen blokken. Zeer resistentiegevoelig. Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

SKAL

Nemasys-C

Actieve stof: Steinernema carpocapsae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 miljoen · Max. toepassing/ha: 3 miljard · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

Verwijder filters kleiner dan 0,3 mm (300 micron). Pompdruk max 20 bar/2000 kPa/290 psi. Spuitdop groter dan 0,5 mm (500 micron).

SKAL, MRL

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Proclaim

Actieve stof: Emamectin benzoaat · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 75 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. actieve stof / ha, zie etiket. W19 aflevertermijn 22-01-2027, opgebruiktermijn 22-07-2027

Spint (+mijten)

Floramite 240 SC

Actieve stof: Bifenazaat · Groep: 20d · Dosering per 100 ltr: 40 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

7 dagen interval binnen blok en 56 tussen twee blokken.

Lalguard m52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 120 ml · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Verpakking na openen gekoeld max. 3 wkn houdbaar.

SKAL, MRL

Nissorun vloeibaar

Actieve stof: Hexythiazox · Groep: 10a · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen/blok. Trage aanvangswerking. Tussen blokken afwisselen met andere chemische groep(en).

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Dosering afhankelijk van jaargetijde en soort bespuiting.

MRL

Scelta

Actieve stof: Cyflumetofen · Groep: 25a · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen/blok. Trage aanvangswerking.

Cantack

Actieve stof: Acequinocyl · Groep: 20b · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen/blok. 28 dagen tussen blokken.

Magister

Actieve stof: Fenazaquin · Groep: 21A · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden

Proefbespuiting uitvoeren.

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Milbeknock

Actieve stof: Milbemectin · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Trips

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

4 toepassingen/blok, 42 dagen tussen de blokken.

SKAL

Botanigard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet toepassen onder sneldrogende omstandigheden, hogere RV positief op het effect. Min. interval 5 dagen.

MRL

Lalguard m52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 120 gr · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Verpakking na openen gekoeld max. 3 wkn houdbaar.

SKAL, MRL

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,25 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen/blok.

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 24/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Voeg hechter toe.

SKAL, MRL

Naturalis L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Werkt op larven en poppen van trips.

SKAL, MRL

NeemAzal-TS

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen/blok, 1,5 maand tussen blokken.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 900 ml · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Dosering afhankelijk van jaargetijde en soort bespuiting.

MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet toepassen onder sneldrogende omstandigheden, hogere RV positief op het effect. Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen/blok, 28 dagen tussen blokken. Zeer resistentiegevoelig. Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

SKAL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex Abamectine

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1,00 ltr · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Kans op schade in de winter. Geen nawerking. Min. interval 14 dagen.

SKAL

Spruzit HP

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 0,90 ltr · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 65 ml · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. actieve stof / ha, zie etiket. W19 aflevertermijn 22-01-2027, opgebruiktermijn 22-07-2027

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Winner

Actieve stof: Formetanaat · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 30 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Werkzame stof kan verboden zijn in retail.

Wittevlieg

Admiral

Actieve stof: Pyriproxyfen · Groep: 7c · Dosering per 100 ltr: 25 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Eerst proefbespuiting uitvoeren.

Applaud

Actieve stof: Buprofezin · Groep: 16 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 22 dagen.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

4 toepassingen/blok, 42 dagen tussen de blokken.

SKAL

Botanigard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 25/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet toepassen onder sneldrogende omstandigheden, hogere RV positief op het effect. Min. interval 5 dagen.

MRL

Eradicoat Max

Actieve stof: Maltodextrine · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 60 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Lalguard m52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 120 ml · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Verpakking na openen gekoeld max. 3 wkn houdbaar.

SKAL, MRL

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Voeg hechter toe.

SKAL, MRL

Naturalis L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 300 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Werkt alleen op ei en larve. Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

NeemAzal-TS

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen/blok, 1,5 maand tussen blokken.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 900 ml · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Doseren afhankelijk van jaargetijde en soort bespuiting.

MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet toepassen onder sneldrogende omstandigheden, hogere RV positief op het effect. Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 200 ml · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

26 ml/100 ltr bij 1 toepassing per jaar. Werkzame evt. verboden in retail.

FLiPPER Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,00 ltr · Max. toepassing/ha: 15 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

SKAL, MRL

Magister

Actieve stof: Fenazaquin · Groep: 21A · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Proefbespuiting uitvoeren.

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

SKAL, MRL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 200 ml · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

26 ml/100 ltr bij 1 toepassing per jaar. Werkzame evt. verboden in retail. Proefbespuiting in winter.

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 1,125 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Is schadelijk voor Delphastus, lange nawerking. Vanaf 31-12-26 geldt W8, met max 2 toepassingen/12 mnd.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Gazelle

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 18 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Kans op schade in de winter. Geen nawerking.

SKAL

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. actieve stof / ha, zie etiket. W19 aflevertermijn 22-01-2027, opgebruiktermijn 22-07-2027

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 65 ml · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Schild-, dop,- wolluis

Applaud

Actieve stof: Buprofezin · Groep: 16 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Eradicoat Max

Actieve stof: Maltodextrine · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 60 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

NeemAzal-TS

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen/blok, 1,5 maand tussen blokken.

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Dosering afhankelijk van jaargetijde en soort bespuiting.

MRL

Teppeki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 140 gr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 21 dagen.

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 1,125 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Is schadelijk voor Delphastus, lange nawerking. Vanaf 31-12-26 geldt W8, met max 2 toepassingen/12 mnd.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.Opgebruiktermijn 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Gazelle

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangegeven dosering is voor bladluis.

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangegeven dosering is voor bladluis.

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 24 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Kans op schade in de winter. Geen nawerking.

SKAL

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 65 ml · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Slakken

Metarex Inov

Actieve stof: Metaldehyde · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 5,00 kg · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sluxx HP

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 7,00 kg · Max. toepassing/ha: 7,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Weekhuid- mijt

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

MRL

Magister

Actieve stof: Fenazaquin · Groep: 21A · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Proefbespuiting uitvoeren.

Milbeknock

Actieve stof: Milbemectin · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Fungiciden

Botrytis

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-Al · Groep: 33 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden

Gewasbehandeling, min. interval 10 dagen.

Botector

Actieve stof: Aureobasidium pullulans · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

De spuitvloeistof roeren tijdens toepassing.

SKAL, MRL

Geoxe

Actieve stof: Fludioxonil · Groep: 12 · Dosering per 100 ltr: 40 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 10 dagen.

Hokonza

Actieve stof: Benzovindiflupyr · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Lalstop G46

Actieve stof: Clonostachys rosea stam J1446 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling, late middag of 's avonds toepassen i.v.m. UV.

SKAL, MRL

Luna privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Polyversum

Actieve stof: Pythium oligandrum · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 30 gr · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet te combineren met chemische pythium middelen.

SKAL, MRL

Romeo

Actieve stof: Cerevisaan · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 75 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 7,11 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 12 dagen.

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 9,12 · Dosering per 100 ltr: 80 gr · Max. toepassing/ha: 0,96 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Proefbespuiting uitvoeren.

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 37 gr · Max. toepassing/ha: 370 gr · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Teldor

Actieve stof: Fenhexamide · Groep: 17 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Vintec

Actieve stof: Trichoderma atroviride · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 10-20 gr · Max. toepassing/ha: 0,20 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Echte Meeldauw

Abir

Actieve stof: Bupirimaat · Groep: 8 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Proefbespuiting uitvoeren. Uitvloeier toevoegen.

Alibi Flora

Actieve stof: Azoxystrobin, difenoconazool · Groep: 11, 3 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen/blok. 21 dagen tussen twee blokken.

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-Al · Groep: 33 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden

Gewasbehandeling, min. interval 10 dagen.

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 150 gr · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3, 7 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 500 tot 1500 ltr water/ha. Tijdig, liefst preventief, toe te passen.

Collis

Actieve stof: Boscalid, kresoxim-methyl · Groep: 7, 11 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Fado

Actieve stof: COS-OGA · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 400 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt, 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Proefbespuiting uitvoeren.

SKAL, MRL

Frutogard

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 375 ml · Max. toepassing/ha: 4,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Fungaflash

Actieve stof: Imazalil · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Hogere dosering toegestaan, zie etiket voor toepassingsvoorwaarden.

GCA Penconazool

Actieve stof: Penconazool · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Karma

Actieve stof: Kalium waterstofcarbonaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 300 gr · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Proefbespuiting uitvoeren. Kan bij veelvuldig gebruik groeiremming veroorzaken.

SKAL, MRL

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling, 20 ml/1000 planten.

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 0,96 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet toepassen in winterperiode.

Ravibis

Actieve stof: Natriumbicarbonaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 330 gr-1,00 kg · Max. toepassing/ha: 3,00-5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 10 dagen.

MRL

Romeo

Actieve stof: Cerevisaan · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 75 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 ml · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling, het middel toepassen in 500- 2000 ltr water/ha. Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Serenade SC

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 ml · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling, het middel toepassen in 500- 2000 ltr water/ha. Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 70/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Continu roeren tijdens gebruik. Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Soriale

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 186 ml · Max. toepassing/ha: 1,86 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

MRL

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 37 gr · Max. toepassing/ha: 370 gr · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Takumi

Actieve stof: Cyflufenamid · Groep: U06 · Dosering per 100 ltr: 15 ml · Max. toepassing/ha: 0,15 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Topaz 100 EC

Actieve stof: Penconazool · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ml · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

VitiSan

Actieve stof: Kaliumwater- stofcarbonaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 300 gr · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Vitola

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3,7 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sclerotinia

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3, 7 · Dosering per 100 ltr: 200 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 500 tot 1500 ltr water/ha. Tijdig, liefst preventief, toe te passen.

Captosan 500 SC

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet toepasbaar met hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets). Min. interval 10 dagen.

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling

Merpan Flowable

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet toepasbaar met hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets). Min. interval 10 dagen.

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 7, 11 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 12 dagen.

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 37 gr · Max. toepassing/ha: 370 gr · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Vitola

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3,7 · Dosering per 100 ltr: 200 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Phytophthora

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-Al · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,75 kg/1000 m2 · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling, min. interval 56 dagen.

Asperello T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,30 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Middel zo snel mogelijk na planten preventief inzetten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden. Druppeltoepassing. Min. interval 60 dagen.

SKAL, MRL

Budget propamocarb-fosetyl

Actieve stof: Fosetyl, propamocarb · Groep: 28, P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling.

Captosan 500 SC

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet toepasbaar met hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets). Min. interval 10 dagen.

Lalstop G46

Actieve stof: Clonostachys rosea stam J1446 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 25 gr/1000 planten · Max. toepassing/ha: 25 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling.

SKAL, MRL

Merpan Flowable

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet toepasbaar met hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets). Min. interval 10 dagen.

Pergado V

Actieve stof: Mandipropamid · Groep: 40 · Dosering per 100 ltr: 60 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28, P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling. Min. 28 dagen tussen 2e en 3e druppeltoepassing.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling, 1,00-2,00 ltr middel per ha (20.000 planten).

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Ridomil Gold SL

Actieve stof: Metalaxyl-M · Groep: 4 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,125 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppeltoepassing. Min. interval 42 dagen.

Pythium

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-Al · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 0 · Max. toepassing/ha: 0,75 kg/1000 m2 · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling, min. interval 56 dagen.

Asperello T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,30 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Middel zo snel mogelijk na planten preventief inzetten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden. Druppeltoepassing. Min. interval 60 dagen.

SKAL, MRL

Lalstop G46

Actieve stof: Clonostachys rosea stam J1446 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 25 gr/1000 planten · Max. toepassing/ha: 25 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling.

SKAL, MRL

Lalstop K61 WP

Actieve stof: Steptomyces · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 10 gr per 1000 planten · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden. Min. interval 21 dagen.

SKAL, MRL

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28, P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling. Min 28 dagen tussen 2e en 3e druppeltoepassing.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling, 1,00-2,00 ltr middel per ha (20.000 planten).

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 ml · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Serenade SC

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 ml · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Trianum-P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 15-30 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Meteen na planten preventief inzetten. Eerste 30 g/1000 planten en daarna steeds 15 g/1000 planten. Min. interval 28 dagen.

SKAL, MRL

Fusarium

Asperello T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,30 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Middel zo snel mogelijk na planten preventief inzetten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden. Min. interval 60 dagen.

SKAL, MRL

Lalstop G46

Actieve stof: Clonostachys rosea stam J1446 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 25 gr/1000 planten · Max. toepassing/ha: 25 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling.

SKAL, MRL

Lalstop K61 WP

Actieve stof: Steptomyces · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 10 gr per 1000 planten · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden. Min. interval 21 dagen.n

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling. Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Serenade SC

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling. Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Trianum-P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 15-30 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Meteen na planten preventief inzetten. Eerste 30 g/1000 planten en daarna steeds 15 g/1000 planten. Min. interval 28 dagen.

SKAL, MRL

Zorg dat de pH van de spuitvloeistof op het juiste niveau is, want bij een afwijkende pH kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderen. Raadpleeg uw adviseur voor de juiste pH per middel en meet de pH na bereiding van de spuitvloeistof.

Het interval tussen de toepassingen is 7 dagen, tenzij anders staat vermeld in de opmerkingen.

SKAL: staat op de Skal Inputlijst. MRL: vrijgesteld van MRL.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a: Carbamates	3: DMI-Fungicides
3a: Pyrethroids, Pyrethrins	4: PA-Fungicides
4a: Neonicotinoids	5: Amines
4c: Sulfoximines	7: SDHI
4d: Butenolides	8: Hydroxy-(2-amino-)Pyrimidines
5: Spinosyns	9: AP-Fungicides
6: Avermectins	11: Qol-Fungicides
7c: Pyriproxyfen	12: PP-Fungicides
10a: Hexythiazox	14: AH-Fungicides
10b: Etoxazole	17: KRI-Fungicides
11a: Bacillus Thuringiensis	21: Qil-Fungicides
16: Buprofezin	28: Carbamates
18: Diacylhydrazines	40: CAA-Fungicides
20b: Acequinocyl	44: Microbial Fungicides
20d: Bifenazate	50: Aryl-Phenyl-Ketones
21a: Meti Acaricides and Insecticides	BM02: Biologicals with multiple MoA
22b: Semicarbazones	M02: Inorganic
23: Tetronic, Tetramic	M04: Phthalimides
25a: Beta-Ketonitrile derivatives	NC: Unknown
28: Diamides	P01: Salicylate-related
29: Flonicamid	P04: Polysaccharide Elicitors
UN: Unknown or uncertain MoA	P07: Phosphonates
UNF: Fungal agents of unknown or uncertain MoA	U06: Phenylacetamide

- Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking
- Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
- De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.

- Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden

---

De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/tuinbouw/advieslijst-gewasbescherming-gerbera/.