Advieslijst gewasbescherming komkommer

15 juni 2026

INSECTICIDEN EN ACARICIDEN

Bladluis

Afinto

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,16 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Benevia

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Toepassen in maximaal 1.500 ltr water/ha.

Inter Peki

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,16 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Teppeki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,16 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33 ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 825 ml · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Druppeltoepassing. Let op kruisresistentie met Altacor. Houd een interval van minimaal 60 dagen aan tussen twee blokken.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Flipper Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 2% · Max. toepassing/ha: 16 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 400-1.000 liter water/ha.

SKAL, MRL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,50% · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Pirimor

Actieve stof: Pirimicarb · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Werkt niet tegen alle luissoorten. Min. interval 10 dagen. Aflevertermijn: 15-9-2026, opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 60-75 ml · Max. toepassing/ha: 0,90-1,12 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen toepassen in een afgedragen gewas i.v.m. gewasreactie. Min. interval 10 dagen.

SPYRO

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Toepassen in 275 tot 600 ltr water/ha.

Decis

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,70 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Aflevertermijn: 30-12-2025, opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 1,17 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Mineervlieg

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,15 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

2 toepassingen per blok, interval tussen 2 blokken 90 dagen. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Benevia

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 40 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Toepassen in maximaal 1.500 ltr water/ha.

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33 ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 825 ml · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Druppeltoepassing. Let op kruisresistentie met Altacor. Houd een interval van minimaal 60 dagen aan tussen twee blokken.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Decis

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,70 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Aflevertermijn: 30-12-2025, opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 1,17 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Rups

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,15 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

2 toepassingen per blok, interval tussen 2 blokken 90 dagen. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Benevia

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Toepassen in maximaal 1.500 ltr water/ha.

Capsanem

Actieve stof: Steinernema carpocapsae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

Spuittoepassing 500.000 nematoden/m2.

MRL

CoStar WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: -

Max. 200 gr/100 ltr. Toepassen in 200-1000 ltr water/ha.

SKAL, MRL

Delfin

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

DiPel DF

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100-200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Nemasys C

Actieve stof: Steinernema carpocapsae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

Spuittoepassing 500.000 nematoden/m2.

MRL

Turex WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 80 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Turex spuitpoeder

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33 ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 825 ml · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Druppeltoepassing. Let op kruisresistentie met Altacor. Houd een interval van minimaal 60 dagen aan tussen twee blokken.

XenTari

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2-3 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Tracer

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Decis

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,70 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Aflevertermijn: 30-12-2025, opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 1,17 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Proclaim

Actieve stof: Emamectin benzoaat · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 125 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

Wants

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltrUN · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 26 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 26 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 60-75 ml · Max. toepassing/ha: 0,90-1,12 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen toepassen in een afgedragen gewas i.v.m. gewasreactie. Min. interval 10 dagen.

Decis

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,70 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Aflevertermijn: 30-12-2025, opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 1,17 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Witte vlieg

Admiral

Actieve stof: Pyriproxyfen · Groep: 7c · Dosering per 100 ltr: 25 ml · Max. toepassing/ha: 0,375 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Min. interval 10 dagen.

Benevia

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Toepassen in maximaal 1.500 ltr water/ha.

Botanigard vloeibaar

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 125 ml · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Botanigard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,90 kg · Max. aantal toepassingen: 10/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

MRL

ERII

Actieve stof: Maltodextrine · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 2,50 ltr · Max. toepassing/ha: 75 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

PreFeRal

Actieve stof: Isaria fumosorosea Apopka · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33 ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 825 ml · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Druppeltoepassing. Let op kruisresistentie met Altacor. Houd een interval van minimaal 60 dagen aan tussen twee blokken.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,20-0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Flipper Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 2% · Max. toepassing/ha: 16 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 400-1.000 liter water/ha.

SKAL, MRL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Trips

Benevia

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Toepassen in maximaal 1.500 ltr water/ha.

Botanigard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,90 kg · Max. aantal toepassingen: 10/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Min. interval 5 dagen.

MRL

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33 ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 825 ml · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Druppeltoepassing. Let op kruisresistentie met Altacor. Houd een interval van minimaal 60 dagen aan tussen twee blokken.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Tracer

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Decis

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,70 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Aflevertermijn: 30-12-2025, opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 1,17 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Winner

Actieve stof: Formetanaat · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 30-60 gr · Max. toepassing/ha: 0,30-0,60 kg · Max. aantal toepassingen: 1-4/teelt · Wachttijd in dagen: -

Aantal toepassingen afhankelijk van dosering. Max. teeltcycli is 3. Max. 0,6 kg/ha/12 maand. Gewasbehandeling alleen na oogst. Alleen toepassen met (semi)-automatische toepassingsapparatuur.

Spint

Cantack

Actieve stof: Acequinocyl · Groep: 20b · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

ERII

Actieve stof: Maltodextrine · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 2,50 ltr · Max. toepassing/ha: 75 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 150 ml/100 ltr · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Nissorun vlb.

Actieve stof: Hexythiazox · Groep: 10a · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 3

-

Scelta

Actieve stof: Cyflumetofen · Groep: 25a · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Flipper Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 2% · Max. toepassing/ha: 16 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 400-1.000 liter water/ha.

SKAL, MRL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,50% · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen

SKAL, MRL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Fungiciden

Echte meeldauw

Abir

Actieve stof: Bupirimaat · Groep: 8 · Dosering per 100 ltr: 200 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Max. 3 bespuitingen in een blok. Min. interval 10 dagen binnen een blok, 40 dagen tussen twee blokken.

Amylo-X

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3/7 · Dosering per 100 ltr: 40-60 · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Volgroeid gewas 60/100, onvolgroeid gewas 40/100 dosering. Middel niet mengen i.v.m. mogelijke gewasreactie.

Collis

Actieve stof: Boscalid, kresoxim-methyl · Groep: 7/11 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 3

-

Fado

Actieve stof: COS-OGA · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00-4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. 3x toepassen. Toepassen met min. 1000 ltr/ha.

SKAL, MRL

Fungaflash

Actieve stof: Imazalil · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Niet in winter op jong gewas. Min. interval 5 dagen.

Karma

Actieve stof: Kalium waterstofcarbonaat · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/teelt · Wachttijd in dagen: -

Toepassen met 500-1500 ltr/ha.

SKAL, MRL

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 40 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Toegestaan van 1 mei t/m 30 september.

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/jaar · Wachttijd in dagen: 1

Min. interval 10 dagen.

PROBLAD

Actieve stof: Extract van Lupinus albus · Groep: BM01 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

SKAL, MRL

Ravibis

Actieve stof: Natriumwaterstof-carbonaat · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: 0,33-1% · Max. toepassing/ha: 2,00-5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/teelt/maanden · Wachttijd in dagen: 1

Min. interval 10 dagen. Gewasbehandeling 300-600 liter water per hectare.

SKAL, MRL

Romeo

Actieve stof: Cerevisaan · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 18/teelt, 54/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 0,185-0,37 kg · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: 4 uren

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Takumi

Actieve stof: Cyflufenamid · Groep: U06 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,15 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 1

-

Topaz 100 EC

Actieve stof: Penconazool · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Min. interval 8 dagen.

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Vitisan

Actieve stof: Kalium waterstofcarbonaat · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: 0,50 kg · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Bij jong gewas 2,50 kg/ha toepassen.

SKAL, MRL

Vitola

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3/7 · Dosering per 100 ltr: 40-60 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Volgroeid gewas 60/100, onvolgroeid gewas 40/100 dosering. Middel niet mengen i.v.m. mogelijke gewasreactie.

Vivando

Actieve stof: Metrafenon · Groep: 50 · Dosering per 100 ltr: 10 ml · Max. toepassing/ha: 0,15 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 3

-

Mycos- phaerella

Collis

Actieve stof: Boscalid, kresoxim-methyl · Groep: 7/11 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 3

-

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3/7 · Dosering per 100 ltr: 40-60 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/jaar · Wachttijd in dagen: 3

Volgroeid gewas 60/100, onvolgroeid gewas 40/100 dosering. Middel niet mengen i.v.m. mogelijke gewasreactie.

Fungaflash

Actieve stof: Imazalil · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Niet in de winter op een jong gewas. Min. interval 5 dagen.

Lalstop G46 WG

Actieve stof: Clonostachys rosea stam J1446 · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 21 dagen.

SKAL, MRL

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 40 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Toegestaan van 1 mei t/m 30 september.

Prestop

Actieve stof: Clonostachys rosea stam J1446 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 gr · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. 10 ltr spuitoplossing per 500 planten. Min. interval 21 dagen.

SKAL, MRL

Topaz 100 EC

Actieve stof: Penconazool · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Min. interval 8 dagen.

Vitola

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3/7 · Dosering per 100 ltr: 40-60 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Volgroeid gewas 60/100, onvolgroeid gewas 40/100 dosering. Middel niet mengen i.v.m. mogelijke gewasreactie.

Botrytis

Amylo-X

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Botector

Actieve stof: Aureobasidium pullulans · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,00 kg · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Min. interval 0 dagen.

SKAL, MRL

Prestop

Actieve stof: Clonostachys rosea stam J1446 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 gr · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. 10 ltr spuitoplossing per 500 planten. Min. interval 21 dagen.

SKAL, MRL

Scala

Actieve stof: Pyrimethanil · Groep: 9 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Min. interval 10 dagen.

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 18/teelt, 54/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 12/9 · Dosering per 100 ltr: 80 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Min. interval 10 dagen.

Teldor

Actieve stof: Fenhexamide · Groep: 17 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Min. interval 8 dagen.

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Vintec

Actieve stof: Trichoderma atroviride · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 5-10 gr · Max. toepassing/ha: 0,15 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Roeren tijdens gebruik. Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Valse meeldauw

Pergado V

Actieve stof: Mandipropamid · Groep: 40 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28/P07 · Dosering per 100 ltr: 170 ml · Max. toepassing/ha: 2,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: 42 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Toepassen in 600-1200 ltr water/ha.

Soriale

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 125 ml · Max. toepassing/ha: 1,85 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

MRL

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Zampro Extra

Actieve stof: Ametoctradin, Kaliumfosfonaten · Groep: 45/P07 · Dosering per 100 ltr: 210 ml · Max. toepassing/ha: 3,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Pythium

ASPERELLO T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: Zie opmerking. · Max. toepassing/ha: 5 kg/ha/teelt · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Mengen door teeltmedium: 10 g/m^3 substraat.

SKAL, MRL

ASPERELLO T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: Zie opmerking. · Max. toepassing/ha: 5 kg/ha/teelt · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Bespuiting (zaadtrays en multipots) 10 g/m3 substraat of 0,5g/m2 (bij 5 cm diepte).

SKAL, MRL

ASPERELLO T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: Zie opmerking. · Max. toepassing/ha: 12 kg/teelt · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: -

Druppel of aangieten:10 g/m3 substraat 65-200 g/1000 planten. Min. interval 30 dagen.

SKAL, MRL

Lalstop K61 WP

Actieve stof: Steptomyces · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: N.v.t. · Max. toepassing/ha: 0,20-1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling (opkweek en na uitplanten). Min. Interval 21 dagen.

SKAL, MRL

Lalstop K61 WP

Actieve stof: Steptomyces · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 5-20 gr/1000 planten · Max. toepassing/ha: 20/gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: -

Druppeltoepassing. Min. interval 21 dagen.

SKAL, MRL

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28/P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00-2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen op kunstmatig substraat.

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling. Min. interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 20 dagen. Druppelbehandeling.

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling.

SKAL, MRL

Trianum-G

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 kg/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Strooien in of op het plantgat.

SKAL, MRL

Trianum-P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 15-30 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling. Min. interval 28 dagen.

SKAL, MRL

Zorg dat de pH van de spuitvloeistof op het juiste niveau is, want bij een afwijkende pH kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderen. Raadpleeg uw adviseur voor de juiste pH per middel en meet de pH na bereiding van de spuitvloeistof.

Het interval tussen de toepassingen is 7 dagen, tenzij anders staat vermeld in de opmerkingen.

SKAL: staat op de Skal Inputlijst. MRL: vrijgesteld van MRL.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a: Carbamates	3: DMI-Fungicides
3a: Pyrethroids, Pyrethrins	4: PA-Fungicides
4a: Neonicotinoids	5: Amines
4c: Sulfoximines	7: SDHI
4d: Butenolides	8: Hydroxy-(2-amino-)Pyrimidines
5: Spinosyns	9: AP-Fungicides
6: Avermectins	11: Qol-Fungicides
7c: Pyriproxyfen	12: PP-Fungicides
10a: Hexythiazox	14: AH-Fungicides
10b: Etoxazole	17: KRI-Fungicides
11a: Bacillus Thuringiensis	21: Qil-Fungicides
16: Buprofezin	28: Carbamates
18: Diacylhydrazines	40: CAA-Fungicides
20b: Acequinocyl	44: Microbial Fungicides
20d: Bifenazate	50: Aryl-Phenyl-Ketones
21a: Meti Acaricides and Insecticides	BM02: Biologicals with multiple MoA
22b: Semicarbazones	M02: Inorganic
23: Tetronic, Tetramic	M04: Phthalimides
25a: Beta-Ketonitrile derivatives	NC: Unknown
28: Diamides	P01: Salicylate-related
29: Flonicamid	P04: Polysaccharide Elicitors
UN: Unknown or uncertain MoA	P07: Phosphonates
UNF: Fungal agents of unknown or uncertain MoA	U06: Phenylacetamide

- Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking.
- Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
- De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.

- Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.

De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/tuinbouw/advieslijst-gewasbescherming-komkommer/.