Advieslijst gewasbescherming lelie

16 juni 2026

Insecticiden en Acariciden

Bladluis

Afinto

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Inter Peki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 24/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Teppeki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

FLiPPer Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,00-1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 75 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

In een dosatron puur toepassen, niet verdunnen.

SKAL, MRL

Pediment

Actieve stof: Pirimicarb · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Geen werking tegen katoenluis en tabaksperzikluis. Aflevertermijn: 15-9-2026, opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Decis

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Kans op gewasreactie, voer proefbespuiting uit.

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1,00 ltr · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Grondgebonden toepassing 1/12 maanden.

Spruzit HP

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Dosering is afhankelijk van planthoogte.

SKAL

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 65 ml · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. actieve stof / ha, zie etiket. W19 aflevertermijn 22-01-2027, opgebruiktermijn 22-07-2027

Trips

Botanigard Vlb

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 125 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 25/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

BIO 1020

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 0,50 kg/m3 · Max. toepassing/ha: 0,50 kg/m3 · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Botanigard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

MRL

Lalguard m52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52 · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 120 ml · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,25 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Alleen NIET grondgebonden.

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 24/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Nemasys F

Actieve stof: Steinernema feltiae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 250.000/m2 · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

42 dagen tussen blokken van 4 toepassingen.

SKAL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/blok, 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

28 dagen tussen blokken van 3 toepassingen.

SKAL

FLiPPer Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,00-1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 75 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

In een dosatron puur toepassen, niet verdunnen.

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 0,08 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt, 35/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Decis

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Gazelle

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1,00 ltr · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 65 ml · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. actieve stof / ha, zie etiket. W19 aflevertermijn 22-01-2027, opgebruiktermijn 22-07-2027

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Winner

Actieve stof: Formetanaat · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 30 gr · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt, 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Cicaden

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

In een dosatron puur toepassen, niet verdunnen.

SKAL, MRL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Decis

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Kans op gewasreactie, voer proefbespuiting uit.

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. actieve stof / ha, zie etiket. W19 aflevertermijn 22-01-2027, opgebruiktermijn 22-07-2027

Leliehaantje

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0.75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/blok, 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

28 dagen tussen blokken van 3 toepassingen.

SKAL

Decis

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Kans op gewasreactie, voer proefbespuiting uit.

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. actieve stof / ha, zie etiket. W19 aflevertermijn 22-01-2027, opgebruiktermijn 22-07-2027

Rups

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,25 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Costar WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 36/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Delfin

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

DiPel DF

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100-200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Lepinox Plus

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 75-150 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Turex WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis subsp. aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt

SKAL, MRL

Xentari

Actieve stof: Bacillus thuringiensis subsp. aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,20 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden

SKAL, MRL

Capsanem

Actieve stof: Steinernema carpocapsae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 miljoen · Max. toepassing/ha: 3 miljard · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

Verwijder filters kleiner dan 0,3 mm (300 micron). Pompdruk max 20 bar/2000 kPa/290 psi. Spuitdop groter dan 0,5 mm (500 micron).

SKAL, MRL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/blok, 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Nemasys-C

Actieve stof: Steinernema carpocapsae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 miljoen · Max. toepassing/ha: 3 miljard · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

Verwijder filters kleiner dan 0,3 mm (300 micron). Pompdruk max 20 bar/2000 kPa/290 psi. Spuitdop groter dan 0,5 mm (500 micron).

SKAL, MRL

Proclaim

Actieve stof: Emamectin benzoaat · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 1,50 kg · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Mollusciciden

Slakken

Sluxx HP

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 7,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Metarex Inov

Actieve stof: Metaldehyde · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Ironmax Pro

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 7,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Fungiciden

Botrytis

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

SKAL, MRL

Botector

Actieve stof: Aureobasidium pullulans · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Captosan

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

Collis

Actieve stof: Boscalid, kresoxim-methyl · Groep: 7 en 11 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Flint

Actieve stof: Trifloxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,40 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Geoxe

Actieve stof: Fludioxonil · Groep: 12 · Dosering per 100 ltr: 40 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Lalstop G46 WG

Actieve stof: Clonostachys rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 gr · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling

SKAL, MRL

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet mengen met andere fungiciden.

Polyversum

Actieve stof: Pythium oligandrum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet combineren met pythium middelen.

SKAL, MRL

Romeo

Actieve stof: Cerevisaan · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 1,60 ltr · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 1,60 ltr · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

Soriale

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 0,93 ltr · Max. toepassing/ha: 1,86 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

MRL

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 9 en 12 · Dosering per 100 ltr: 80 gr · Max. toepassing/ha: 0,96 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Teldor

Actieve stof: Fenhexamide · Groep: 17 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Vintec

Actieve stof: Trichoderma atroviride · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 10-20 gr · Max. toepassing/ha: 0,20 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Fusarium

Asperello

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 1,00-3,00 kg · Max. toepassing/ha: 19,8 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Captosan

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

Lalstop K61 WP

Actieve stof: Steptomyces · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 0,10-1,00 kg · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Lalstop G46 WG

Actieve stof: Clonostachys rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 gr · Max. toepassing/ha: 10 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Polyversum

Actieve stof: Pythium oligandrum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

SKAL, MRL

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 10 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Grondbehandeling.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

SKAL, MRL

Trianum-G

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 50 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Strooien.

SKAL, MRL

Trianum-P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 2,50-5,00 kg · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Phytophthora

Asperello

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 1,00-3,00 kg · Max. toepassing/ha: 19,8 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Captosan

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

Lalstop G46 WG

Actieve stof: Clonostachys rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 gr · Max. toepassing/ha: 10 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Pergado V

Actieve stof: Mandipropamid · Groep: 40 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28 en P07 · Dosering per 100 ltr: 3,00 ltr · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 5-10 ml in 3,00- 6,00 ltr water/m2 · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 35 ml · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Proceswaterbehandeling.

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Pythium

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: 33 · Dosering per 100 ltr: 600 gr · Max. toepassing/ha: 10 kg · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Dompelbehandeling

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: 33 · Dosering per 100 ltr: 7,5 kg/ha · Max. toepassing/ha: 7,5 kg/ha · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling

Asperello

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 1,00-3,00 kg · Max. toepassing/ha: 19,8 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling

SKAL, MRL

Frutogard

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 375 ml · Max. toepassing/ha: 4,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

MRL

Lalstop G46 WG

Actieve stof: Clonostachys rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 gr · Max. toepassing/ha: 10 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Lalstop K61 WP

Actieve stof: Steptomyces · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 0,10-1,00 kg · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28 en P07 · Dosering per 100 ltr: 3,00 ltr/1000 m2 · Max. toepassing/ha: 30 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28 en P07 · Dosering per 100 ltr: 40 ml · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Proceswaterbehandeling

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 5-10 ml in 3,00- 6,00 ltr water/m2 · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 35 ml · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Proceswaterbehandeling.

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Trianum-G

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 50 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Strooien.

SKAL, MRL

Trianum-P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 2,50 - 5,00 kg · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling

SKAL, MRL

Rhizoctonia

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Grondbehandeling.

SKAL, MRL

Captosan

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

Farao

Actieve stof: Flutolanil · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 6,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Lalstop G46 WG

Actieve stof: Clonostachys rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 500 gr · Max. toepassing/ha: 100 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling

SKAL, MRL

Monarch

Actieve stof: Flutolanil · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 6,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Rizolex

Actieve stof: Tolclofos-methyl · Groep: 14 · Dosering per 100 ltr: 3,20 ml/m2 · Max. toepassing/ha: 32 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 10 ltr · Max. toepassing/ha: 10 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Grondbehandeling.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

Trianum-G

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 50 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Strooien.

SKAL, MRL

Trianum-P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 2,50 - 5,00 kg · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Sclerotinia

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

SKAL, MRL

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3 en 4 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Captosan

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

Polyversum

Actieve stof: Pythium oligandrum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet combineren met pythium middelen.

SKAL, MRL

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

Zorg dat de pH van de spuitvloeistof op het juiste niveau is, want bij een afwijkende pH kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderen. Raadpleeg uw adviseur voor de juiste pH per middel en meet de pH na bereiding van de spuitvloeistof.

Het interval tussen de toepassingen is 7 dagen, tenzij anders staat vermeld in de opmerkingen.

SKAL: staat op de Skal Inputlijst. MRL: vrijgesteld van MRL.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a: Carbamates	3: DMI-Fungicides
3a: Pyrethroids, Pyrethrins	4: PA-Fungicides
4a: Neonicotinoids	5: Amines
4c: Sulfoximines	7: SDHI
4d: Butenolides	8: Hydroxy-(2-amino-)Pyrimidines
5: Spinosyns	9: AP-Fungicides
6: Avermectins	11: Qol-Fungicides
7c: Pyriproxyfen	12: PP-Fungicides
10a: Hexythiazox	14: AH-Fungicides
10b: Etoxazole	17: KRI-Fungicides
11a: Bacillus Thuringiensis	21: Qil-Fungicides
16: Buprofezin	28: Carbamates
18: Diacylhydrazines	40: CAA-Fungicides
20b: Acequinocyl	44: Microbial Fungicides
20d: Bifenazate	50: Aryl-Phenyl-Ketones
21a: Meti Acaricides and Insecticides	BM02: Biologicals with multiple MoA
22b: Semicarbazones	M02: Inorganic
23: Tetronic, Tetramic	M04: Phthalimides
25a: Beta-Ketonitrile derivatives	NC: Unknown
28: Diamides	P01: Salicylate-related
29: Flonicamid	P04: Polysaccharide Elicitors
UN: Unknown or uncertain MoA	P07: Phosphonates
UNF: Fungal agents of unknown or uncertain MoA	U06: Phenylacetamide

- Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking
- Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
- De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.
- Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden

---

De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/tuinbouw/advieslijst-gewasbescherming-lelie/.