Advieslijst gewasbescherming paprika

15 juni 2026

Insecticiden en acariciden

Bladluis

Afinto

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 120 gr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Inter Peki

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 120 gr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

Pirimor

Actieve stof: Pirimicarb · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

Werkt niet tegen alle soorten luizen. Aangescherpte gebruiksvoorwaarden m.b.t. lozing. Uitverkooptermijn: 15-9-2026, opgebruiktermijn 31-12-2026.

Teppeki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,12 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 825 ml · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

Druppeltoepassing. Let op kruisresistentie met Altacor. Houd een interval van minimaal 60 dagen aan tussen twee blokken.

Bloomazal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,5% · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Niet mengen met PH gevoelige middelen.

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

Siltac

Actieve stof: Siliconenpolymeren · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 70 ml · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Contactmiddel, toepassen onder snel drogende omstandigheden.

MRL

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 60-75 ml · Max. toepassing/ha: 0,90-1,12 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt. Etiketbeperking per 31-12-2026

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte teelt, toepassen in 275-600 liter water/ha.

Mineervlieg

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 150 gr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

Niet grondgebonden. 2x/blok. Interval tussen blokken 90 dagen. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Let op kruisresistentie met Verimark.

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 825 ml · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 ·

Toepassingsgebied: -

Druppeltoepassing. Let op kruisresistentie met Altacor. Houd een interval van minimaal 60 dagen aan tussen twee blokken.

Bloomazal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Abamectine Budget

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,70 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Uitverkooptermijn: 31-12-2025, opgebruiktermijn 31-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 1,17 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Rups

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,15 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

Niet grondgebonden. 2x/blok. Interval tussen blokken 90 dagen. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Let op kruisresistentie met Verimark.

Costar WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 30-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Delfin

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

DiPel DF

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100-200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Florbac

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,5 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Turex spuitpoeder

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Turex WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - ·

Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

XenTari

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 825 ml · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

Druppeltoepassing. Let op kruisresistentie met Altacor. Houd een interval van minimaal 60 dagen aan tussen twee blokken.

Bloomazal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Capsanem

Actieve stof: Steinernema carpocapsae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Gewasbespuiting, dosering 1 tot 3 miljoen/liter water. Niet veilig voor Orius.

SKAL, MRL

Nemasys C

Actieve stof: Steinernema carpocapsae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Gewasbespuiting, dosering 1 tot 3 miljoen/liter water. Niet veilig voor Orius.

SKAL, MRL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Tracer

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Tijdens toepassen schadelijk voor bijen en hommels. Uitverkooptermijn: 25-06-2026, opgebruiktermijn voor grondgebonden teelt: 31-12-2026.

SKAL

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,70 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Uitverkooptermijn: 31-12-2025, opgebruiktermijn 31-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 1,17 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Wittevlieg

Botanigard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,90 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

BotaniGard vloeibaar

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 125 ml · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

MRL

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

Alleen tegen larve. Voeg 250 ml Addit toe voor een betere werking.

SKAL, MRL

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 825 ml · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

Druppeltoepassing. Let op kruisresistentie met Altacor. Houd een interval van minimaal 60 dagen aan tussen twee blokken.

Bloomazal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,20-0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 1,50% · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Niet mengen met PH gevoelige middelen

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,20-0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

Siltac

Actieve stof: Siliconenpolymeren · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 70/100 · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Contactmiddel, toepassen onder snel drogende omstandigheden.

MRL

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,70 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Uitverkooptermijn: 31-12-2025, opgebruiktermijn 31-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 1,17 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 60-75 ml · Max. toepassing/ha: 0,90-1,12 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt. Etiketbeperking per 31-12-2026

Trips

Bloomazal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Tracer

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Tijdens toepassen schadelijk voor bijen en hommels. Uitverkooptermijn: 25-06-2026, opgebruiktermijn voor grondgebonden teelt: 31-12-2026.

SKAL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,70 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Uitverkooptermijn: 31-12-2025, opgebruiktermijn 31-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 1,17 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Wantsen

Bloomazal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,20-0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,20-0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,70 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Uitverkooptermijn: 31-12-2025, opgebruiktermijn 31-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3A · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 1,17 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 60-75 ml · Max. toepassing/ha: 0,90-1,12 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt. Etiketbeperking per 31-12-2026

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 65 ml · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

Spint

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Nissorun vlb.

Actieve stof: Hexythiazox · Groep: 10a · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Contactwerking. Tegen 1e larvenstadium en eieren.

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Slakken

Derrex

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 7,00 kg/ha · Max. toepassing/ha: 7,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Ironmax Pro

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 7,00 kg/ha · Max. toepassing/ha: 7,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Sluxx HP

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 7,00 kg/ha · Max. toepassing/ha: 7,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

0,70 gr/m2

SKAL, MRL

Fungiciden

Meeldauw

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 7 en 3 · Dosering per 100 ltr: 0,60 ltr/ha · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Alleen bedekte teelt, toepassen in 400-1500 ltr water/ha.

Fado

Actieve stof: COS-OGA · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00-4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: 0 · Toepassingsgebied: -

Uitsluitend preventief toepassen, min. 3x spuiten. Toepassen met min. 1000 ltr/ha.

SKAL, MRL

Karma

Actieve stof: Kalium waterstofcarbonaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

Toepassen met 500-1500 ltr/ha.

SKAL, MRL

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

Scherp! Niet toepassen op jong gewas.

Serenade SC

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 8,00 ltr/ha · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Altijd een uitvloeier meenemen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 8,00 ltr · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Altijd een uitvloeier meenemen.

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Bedekte, niet grondgebonden teelt.

Takumi

Actieve stof: Cyflufenamid · Groep: U06 · Dosering per 100 ltr: 0,15 ltr/ha · Max. toepassing/ha: 0,15 ltr/ha · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

Topaz 100 EC

Actieve stof: Penconazool · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Bedekte, niet grondgebonden teelt.

Vivando

Actieve stof: Metrafenon · Groep: 50 · Dosering per 100 ltr: 30 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets

Actieve stof: Zwavel · Groep: M02 · Dosering per 100 ltr: 1 zwavel- verdamper per 500m2 · Max. toepassing/ha: 0,064 kg · Max. aantal toepassingen: Zie opmerking. · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Voor toepassingsvoorwaarden, zie etiket.

SKAL, MRL

Phytophtora

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28 P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Toegelaten in bedekte substraatteelt.

Botrytis

Prestop

Actieve stof: Clonostachys rosea stam J1446 · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: 500 gr · Max. toepassing/ha: zie opmerking · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Max. 10 ltr spuitoplossing per 500 planten.

SKAL, MRL

Prolectus

Actieve stof: Fenpyrazamine · Groep: 17 · Dosering per 100 ltr: 80-120 gr · Max. toepassing/ha: 1,20 kg · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

Serenade SC

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 8,00 ltr/ha · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Altijd een uitvloeier meenemen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 8,00 ltr · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Altijd een uitvloeier meenemen.

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11 en 7 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Bedekte, niet grondgebonden teelt.

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 12 en 9 · Dosering per 100 ltr: 80 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

-

Teldor

Actieve stof: Fenhexamide · Groep: 17 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1 · Toepassingsgebied: -

-

Phytium

Asperello T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8 kg/teelt · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Druppelen of aangieten: 10 g/m^3 substraat, 10-200 gr./1000 planten.

SKAL, MRL

Lalstop K61 WP (Mycostop)

Actieve stof: Steptomyces · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 0,20-1,00 kg/ha · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Lalstop K61 WP (Mycostop)

Actieve stof: Steptomyces · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 5/20 gr/1000 planten · Max. toepassing/ha: 20 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Druppelbehandeling.

SKAL, MRL

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28 P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Toegelaten in bedekte substraatteelt.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00-2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 3 · Toepassingsgebied: -

Druppelbehandeling. Toepassen in 500-1000 ltr water/ha.

Trianum P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: 28 · Toepassingsgebied: -

Druppelbehandeling: 15-30 gram per 1000 planten.

SKAL, MRL

Trianum G

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Strooien op of in het plantgat: dosering 1 kg/1000 planten

SKAL, MRL

Zorg dat de pH van de spuitvloeistof op het juiste niveau is, want bij een afwijkende pH kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderen. Raadpleeg uw adviseur voor de juiste pH per middel en meet de pH na bereiding van de spuitvloeistof.

Het interval tussen de toepassingen is 7 dagen, tenzij anders staat vermeld in de opmerkingen.

SKAL: staat op de Skal Inputlijst. MRL: vrijgesteld van MRL.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a: Carbamates	3: DMI-Fungicides
3a: Pyrethroids, Pyrethrins	4: PA-Fungicides
4a: Neonicotinoids	5: Amines
4c: Sulfoximines	7: SDHI
4d: Butenolides	8: Hydroxy-(2-amino-)Pyrimidines
5: Spinosyns	9: AP-Fungicides
6: Avermectins	11: Qol-Fungicides
7c: Pyriproxyfen	12: PP-Fungicides
10a: Hexythiazox	14: AH-Fungicides
10b: Etoxazole	17: KRI-Fungicides
11a: Bacillus Thuringiensis	21: Qil-Fungicides
16: Buprofezin	28: Carbamates
18: Diacylhydrazines	40: CAA-Fungicides
20b: Acequinocyl	44: Microbial Fungicides
20d: Bifenazate	50: Aryl-Phenyl-Ketones
21a: Meti Acaricides and Insecticides	BM02: Biologicals with multiple MoA
22b: Semicarbazones	M02: Inorganic
23: Tetronic, Tetramic	M04: Phthalimides
25a: Beta-Ketonitrile derivatives	NC: Unknown
28: Diamides	P01: Salicylate-related
29: Flonicamid	P04: Polysaccharide Elicitors
UN: Unknown or uncertain MoA	P07: Phosphonates
UNF: Fungal agents of unknown or uncertain MoA	U06: Phenylacetamide

- Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking.
- Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
- De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.
- Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.

De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/tuinbouw/advieslijst-gewasbescherming-paprika/.