Advieslijst gewasbescherming potplanten

16 juni 2026

Insecticiden en acariciden

Bladluis

Afinto

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 21 dagen

Inter Peki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 21 dagen.

Teppeki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Minimum interval 21 dagen.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Flipper Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 0,50-1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 15 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Toepassingsgebied: -

SKAL, MRL

NeemAzal-TS

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 0,50-1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-120 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-800 ml · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 11/12 maanden · Toepassingsgebied: -

-

MRL

Pediment

Actieve stof: Pirimicarb · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Werkt niet tegen alle soorten luizen. Aflevertermijn: 15-9-26. opgebruiktermijn: 31-12-26.

Pediment rookontwikkelaar

Actieve stof: Pirimicarb · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,5 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Werkt niet tegen alle soorten luizen. Aflevertermijn: 15-9-26. opgebruiktermijn: 31-12-26.

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Gazelle

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 0,23 kg · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Grondgebonden 2/12 maanden.

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 0,23 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 30 dagen

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Dosering is afhankelijk van planthoogte. Boven de 25 °C niet toepassen. Min. interval van 7 dagen.

SKAL

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Max. 4,50 ltr/ha/12 maanden. Vanaf 31 december 2026 verandering in dosering/toepassingen m.b.t. W6.

Spruzit HP

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 600/1200 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr/ha · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Dosering is afhankelijk van planthoogte. Boven de 25 °C niet toepassen. Min. interval 7 dagen.

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Boven de 25 °C niet toepassen.

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Wol-, dop-, schildluis

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 0,50-1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 0,23 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 30 dagen.

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 2000 ml · Max. toepassing/ha: 24,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval min. 14 dagen.

SKAL

Mineervlieg

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

2 toepassingen per blok, 90 dagen tussen twee blokken.

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,12 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval tussen toepassingen is 7 dagen.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Opgebruiktermijn 31-12-2026.

SKAL

NeemAzal-TS

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-120 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Milbeknock

Actieve stof: Milbemectin · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Max. 3 blokken van 3 bespuitingen. Interval tussen blokken min. 28 dagen.

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, ruimtebehandeling mogelijk. Zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Rupsen

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

2 toepassingen per blok, 90 dagen tussen twee blokken.

Capsanem

Actieve stof: Steinernema carpocapsae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Spuittoepassing 500.000 nematoden/m2.

CoStar WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100-200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 36/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Delfin

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Dipel DF

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100-200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,12 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval tussen toepassingen is 7 dagen.

Turex spuitpoeder

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Turex WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

XenTari

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,20 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval min. 5 dagen.

SKAL, MRL

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Max. 2 blokbehandelingen van 3 toepassingen. Tussen blokken interval van 28 dagen. Opgebruiktermijn 31-12-2026.

SKAL

NeemAzal-TS

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-120 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Proclaim

Actieve stof: Emamectin benzoaat · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, ruimtebehandeling mogelijk. Zie etiket.

Wittevlieg

Admiral

Actieve stof: Pyriproxyfen · Groep: 7c · Dosering per 100 ltr: 25 ml · Max. toepassing/ha: 0,25 · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden.

Afinto

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 21 dagen.

Applaud 25 SC

Actieve stof: Buprofezin · Groep: 16 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 22 dagen.

BotaniGard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 25/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval min. 5 dagen. Let op met fungicidenbehandeling. Spuitvloeistof continue roeren. Zichtbaar residu mogelijk.

MRL

Futureco Nofly WP

Actieve stof: Paecilomyces fumosoroseus · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 200-250 gr · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Inter Peki

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 21 dagen.

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 24/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Let op met fungiciden. Interval fungicidenbehandeling min. 3 dagen.

SKAL, MRL

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 300 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval min. 5 dagen.

MRL

Teppeki WG

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: 14 gr · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 21 dagen.

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,20-0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

NeemAzal-TS

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 0,50-1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-120 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-800 ml · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 11/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

MRL

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Gazelle

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 0,462 kg · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Grondgebonden 2/12 maanden.

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25-50 gr · Max. toepassing/ha: 0,462 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1500 ml · Max. toepassing/ha: 18,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Dosering is afhankelijk van planthoogte. Boven de 25 °C niet toepassen. Min. interval van 7 dagen.

SKAL

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 1,125 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Max. 4,50 ltr/ha/12 maanden. Vanaf 31 december 2026 verandering in dosering/toepassingen m.b.t. W6.

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, ruimtebehandeling mogelijk. Zie etiket.

Trips

BotaniGard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval min. 5 dagen. Let op met fungicidenbehandeling. Spuitvloeistof continue roeren. Zichtbaar residu mogelijk.

MRL

Entonem

Actieve stof: Steinernema Feltiea · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Spuittoepassing 250.000 nematoden/m2 in 1250 ltr/ha.

SKAL, MRL

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,12 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval tussen toepassingen is 7 dagen.

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 24/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Let op met fungiciden. Interval fungicidenbehandeling min. 3 dagen.

SKAL, MRL

Nemasys F

Actieve stof: Steinernema Feltiea · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Spuiten 125-250 miljoen/1000 m2.

SKAL, MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

In 2 blokken toepassen, resistentiegevoelig. Opgebruiktermijn 31-12-2026.

SKAL

Flipper Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 0,50-1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 15 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Lalguard M52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 0,23 ltr · Max. toepassing/ha: 0,23 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling tegen tripspoppen.

SKAL, MRL

NeemAzal-T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 0,50-1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-120 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

SKAL

Budget Abamectine

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Dosering is afhankelijk van planthoogte. Boven de 25 °C niet toepassen. Min. interval van 14 dagen.

SKAL

Spruzit HP

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 600/1200 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Boven de 25 °C niet toepassen.

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, ruimtebehandeling mogelijk. Zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Winner

Actieve stof: Formetanaat · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 30 gr · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt, 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Spint

Floramite

Actieve stof: Bifenazaat · Groep: 20d · Dosering per 100 ltr: 40 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

2x per blok.

Nissorun vlb

Actieve stof: Hexythiazox · Groep: 10a · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

6 blokken van 2 toepassingen, werkt alleen op ei en larve.

Scelta

Actieve stof: Cyflumetofen · Groep: 25 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

2x per blok.

Cantack

Actieve stof: Acequinocyl · Groep: 20b · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 28 dagen tussen de blokken.

Flipper Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 0,50-1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 15 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 0,50-1,50 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: - ·

Toepassingsgebied: -

Interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Budget Abamectine

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Carex 10 SC

Actieve stof: Pyridaben · Groep: 21a · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,90 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Milbeknock

Actieve stof: Milbemectin · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Dosering is afhankelijk van planthoogte. Boven de 25 °C niet toepassen. Min. interval van 7 dagen.

SKAL

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Varen- rouwmug

Entonem

Actieve stof: Steinernema Feltiea · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Bodemtoepassing 500.000 nematoden/m2.

SKAL, MRL

Gnatrol SC

Actieve stof: Basillus thuringiensis subsp. Israeliensis · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 5-10 ml/m2 · Max. toepassing/ha: 3/teelt · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Het middel toepassen in ruim water 0,20-2,00 ltr water per m2 (2000-20000 ltr water/ha).

Nemasys F

Actieve stof: Steinernema Feltiea · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Bodemtoepassing, preventief 1 mljrd/2000 m2, curatief 1 mljrd/1000 m2.

SKAL, MRL

Lalguard M52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 0,23 ltr · Max. toepassing/ha: 0,23 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Opgebruiktermijn: 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Sumicidin Super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, ruimtebehandeling mogelijk. Zie etiket.

Aaltjes (o.a. wortel- knobbel)

NEMguard DE

Actieve stof: Knoflook extract · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 40 kg/ha · Max. toepassing/ha: 40 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL

Taxuskever

Nemasys L

Actieve stof: Steinernema kraussei · Groep: - · Dosering per 100 ltr: Aangieten · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Curatief 250 mlj/500 m2 bodemtoepassing.

SKAL, MRL

Lalguard M52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 0,23 ltr · Max. toepassing/ha: 0,23 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Bio 1020

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 7 dagen. Mengen tijdens zaaien of (her)planten.

SKAL, MRL

Slakken

Exhibitline PH

Actieve stof: Phasmarhabditis hermaphrodita · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Bodemtoepassing max. 300.000/m2.

Ironmax Pro

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 7,00 kg/ha · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 5 dagen.

Metarex Inov

Actieve stof: Metaldehyde · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 5,00 kg/ha · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 5 dagen.

Nemaslug 2.0

Actieve stof: Phasmarhabditis californica · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Bodemtoepassing max. 300.000/m2.

Sluggo Pro

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Sluxx HP

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 7,00 kg/ha · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Mijten

Magister

Actieve stof: Fenazaquin · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Fungiciden

Phytophthora

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,75 kg/1000m2 · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangiet/druppelbehandleing met minimum interval van 56 dagen.

Captosan 500 SC

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 10 dagen.

Frutogard

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 375 ml · Max. toepassing/ha: 4,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

MRL

Lalstop G46

Actieve stof: Clonostachys Rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 25 gr/1000 planten · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Gieten of druppelen.

SKAL, MRL

Lalstop G46

Actieve stof: Clonostachys Rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 50 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Spuiten.

SKAL, MRL

Merpan flow

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 10 dagen.

Pergado V

Actieve stof: Mandipropamid · Groep: 40 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Toepassingsgebied: -

Zie etiket voor diverse toepassingsmethoden/-doseringen.

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Opgebruiktermijn 31-12-2026.

Ridomil Gold SL

Actieve stof: Metalaxyl-M · Groep: 4 · Dosering per 100 ltr: Zie etiket. · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangieten/druppelen.

SKAL, MRL

Botrytis

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,5 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maande · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Gewasbehandeling met minimuminterval van 10 dagen.

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 54/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Captosan 500 SC

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 10 dagen.

Geoxe

Actieve stof: Fludioxonil · Groep: 12 · Dosering per 100 ltr: 40 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Minimum interval 10 dagen.

Lalstop G46 WG

Actieve stof: Clonostachys Rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 25 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied:

-

Gieten of druppelen.

SKAL, MRL

Lalstop G46 WG

Actieve stof: Clonostachys Rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 50 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Spuiten.

SKAL, MRL

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Merpan flow

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Polyversum

Actieve stof: Pythium oligandrum · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 6 dagen.

SKAL, MRL

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/teelt, 70/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11/7 · Dosering per 100 ltr: 100-150 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 12 dagen.

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 12/9 · Dosering per 100 ltr: 80 gr · Max. toepassing/ha: 0,96 kg · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Teldor

Actieve stof: Fenhexamide · Groep: 17 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50-2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Dosering afhankelijk van ziektedruk.

SKAL, MRL

Vintec

Actieve stof: Trichoderma atroviride · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 10-20 gr · Max. toepassing/ha: 0,20 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Valse Meeldauw

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,5 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Gewasbehandeling met minimuminterval van 10 dagen.

Frutogard

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 375 ml · Max. toepassing/ha: 4,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

MRL

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 0,96 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/jaar · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Pergado V

Actieve stof: Mandipropamid · Groep: 40 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28/P07 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Opgebruiktermijn 31-12-2026.

Roest

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3/7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Flint

Actieve stof: Trifloxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 12,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,125 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 0,96 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/jaar · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11/7 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Topaz 100 EC

Actieve stof: Penconazool · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt. 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Vitola

Actieve stof: Difenoconazool en Fluxapyroxad · Groep: 3 en 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Minimum interval tussen toepassingen is 7 dagen. Het middel toepassen in 500 tot 1500 liter water per ha.

Rhizoctonia

Captosan 500 SC

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 10 dagen.

Merpan flow

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 10 dagen.

Rizolex vloeibaar

Actieve stof: Tolclofos-methyl · Groep: 14 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 50 ltr/ha/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling en potgrondbehandeling.

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling. Interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling. Interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/teelt en 70/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11/7 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 12 dagen.

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangieten/druppelen.

SKAL, MRL

Trianum-G

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: Zie opmerkingen. · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 14 dagen. Eerste toepassing 0,75 kg/m3, volgende toepassingen 0,37 kg/m3.

SKAL, MRL

Trianum-P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00-5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 14 dagen. Zie etiket voor type toepassing.

SKAL, MRL

Sclerotinia

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 54/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Captosan 500 SC

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 10 dagen.

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Merpan flow

Actieve stof: Captan · Groep: M04 · Dosering per 100 ltr: 250-350 ml · Max. toepassing/ha: 4,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 10 dagen.

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11/7 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 12 dagen.

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/teelt, 70/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Gewasbehandeling. Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Pythium

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,75 kg/1000m2 · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangiet/druppelbehandleing met minimum interval van 56 dagen.

Asperello T34 Biocontrol

Actieve stof: Asperello T34 Biocontrole · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 10 g/m3 substraat of 0,5 g/m2 (bij 5 cm diepte) · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Frutogard

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 375 ml · Max. toepassing/ha: 4,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

MRL

Lalstop K61

Actieve stof: Streptomyces K61 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,10-1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Lalstop K61

Actieve stof: Streptomyces K61 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2-10 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Druppelbehandeling.

SKAL, MRL

Lalstop G46

Actieve stof: Clonostachys Rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 25 gr/1000 planten · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Gieten of druppelen.

SKAL, MRL

Lalstop G46

Actieve stof: Clonostachys Rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 50 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Spuiten.

SKAL, MRL

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28/P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 30,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling. Interval 56 dagen.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Zie etiket voor diverse toepassingsmethoden/-doseringen.

Ridomil Gold SL

Actieve stof: Metalaxyl-M · Groep: 4 · Dosering per 100 ltr: Zie etiket. · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling. Interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling. Interval 20 dagen.

SKAL, MRL

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangieten/druppelen.

SKAL, MRL

Trianum-G

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: Zie opmerkingen. · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 14 dagen. Eerste toepassing 0,75 kg/m3, volgende toepassingen 0,37 kg/m3

SKAL, MRL

Trianum-P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00-5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 14 dagen. Zie etiket voor type toepassing.

SKAL, MRL

Echte Meeldauw

Alibi Flora

Actieve stof: Azoxystrobin, difenoconazool · Groep: 11/3 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt,15/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,5 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Gewasbehandeling met minimuminterval van 10 dagen.

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 54/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3/7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Fado

Actieve stof: COS-OGA · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 300-400 ml · Max. toepassing/ha: 3,00-4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt, 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Mag niet worden toegepast bij eenjarige perkplanten, bolbloemen, knolbloemen, cactussen en succulenten.

SKAL

Flint

Actieve stof: Trifloxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 12,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,125 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Fungaflash

Actieve stof: Imazalil · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Frutogard

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 375 ml · Max. toepassing/ha: 4,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

MRL

Karma

Actieve stof: Kalium waterstofcarbonaat · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Kumulus S

Actieve stof: Zwavel · Groep: M02 · Dosering per 100 ltr: 400 gr · Max. toepassing/ha: 4,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 10 dagen.

SKAL

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 0,96 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/jaar · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Polyversum

Actieve stof: Pythium oligandrum · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Ravibis

Actieve stof: Natriumwaterstofcarbonaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00-5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/teelt, 70/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Soriale

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,86 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 5 dagen.

MRL

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Min. interval 3 dagen.

SKAL, MRL

Takumi

Actieve stof: Cyflufenamid · Groep: U06 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,15 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Topaz 100 EC

Actieve stof: Penconazool · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 12/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50-2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Dosering afhankelijk van ziektedruk.

SKAL, MRL

VitiSan

Actieve stof: Kalium waterstofcarbonaat · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: 0,3-0,5 kg · Max. toepassing/ha: 3 kg · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Minimum interval tussen toepassingen is 7 dagen.

SKAL

Vitola

Actieve stof: Difenoconazool en Fluxapyroxad · Groep: 3 en 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: - ·

Toepassingsgebied: -

Minimum interval tussen toepassingen is 7 dagen. Het middel toepassen in 500 tot 1500 liter water per ha.

Fusarium

Lalstop K61

Actieve stof: Streptomyces K61 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,10-1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Aangietbehandeling.

SKAL, MRL

Lalstop K61

Actieve stof: Streptomyces K61 · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2-10 gr/100 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

Druppelbehandeling.

SKAL, MRL

Lalstop G46

Actieve stof: Clonostachys Rosea · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 25 gr/1000 planten · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: - · Toepassingsgebied: -

-

SKAL, MRL

Zorg dat de pH van de spuitvloeistof op het juiste niveau is, want bij een afwijkende pH kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderen. Raadpleeg uw adviseur voor de juiste pH per middel en meet de pH na bereiding van de spuitvloeistof.

Het interval tussen de toepassingen is 7 dagen, tenzij anders staat vermeld in de opmerkingen.

SKAL: staat op de Skal Inputlijst. MRL: vrijgesteld van MRL.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a: Carbamates	3: DMI-Fungicides
3a: Pyrethroids, Pyrethrins	4: PA-Fungicides
4a: Neonicotinoids	5: Amines
4c: Sulfoximines	7: SDHI
4d: Butenolides	8: Hydroxy-(2-amino-)Pyrimidines
5: Spinosyns	9: AP-Fungicides
6: Avermectins	11: Qol-Fungicides
7c: Pyriproxyfen	12: PP-Fungicides
10a: Hexythiazox	14: AH-Fungicides
10b: Etoxazole	17: KRI-Fungicides
11a: Bacillus Thuringiensis	21: Qil-Fungicides
16: Buprofezin	28: Carbamates
18: Diacylhydrazines	40: CAA-Fungicides
20b: Acequinocyl	44: Microbial Fungicides
20d: Bifenazate	50: Aryl-Phenyl-Ketones
21a: Meti Acaricides and Insecticides	BM02: Biologicals with multiple MoA
22b: Semicarbazones	M02: Inorganic
23: Tetronic, Tetramic	M04: Phthalimides
25a: Beta-Ketonitrile derivatives	NC: Unknown
28: Diamides	P01: Salicylate-related
29: Flonicamid	P04: Polysaccharide Elicitors
UN: Unknown or uncertain MoA	P07: Phosphonates
UNF: Fungal agents of unknown or uncertain MoA	U06: Phenylacetamide

- Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking.
- Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
- De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.
- Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.

De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/tuinbouw/advieslijst-gewasbescherming-potplanten/.