Advieslijst gewasbescherming radijs

15 juni 2026

Insecticiden en acariciden

Koolvlieg

Alcator

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Tracer

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

-

SKAL

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket. Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Mineervlieg

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket. Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

Extra eisen m.b.t de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Rupsen

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,10 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

CoStar WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Dipel DF

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100-200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Lepinox Plus

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Turex Spuitpoeder

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Turex WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 3/teelt, 6/12maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

XenTari

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Tracer

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

-

SKAL

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket. Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Witte vlieg

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 300 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

FLiPPER Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500-1000 ml · Max. toepassing/ha: 10 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500-1000 ml · Max. toepassing/ha: 18 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 200-400 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

MRL

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket. Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Trips

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

FLiPPER Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500-1000 ml · Max. toepassing/ha: 10 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500 - 1000 ml · Max. toepassing/ha: 18 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 200-400 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

MRL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Decis EC

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket. Opgebruiktermijn: 31-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Stromijt

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 300 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Imex Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.

Aaltjes

NEMguard DE

Actieve stof: Knoflookextract · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 20 kg/ha · Max. toepassing/ha: 40 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Slakken

Ironmax Pro

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 7,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Nemaslug® 2.0

Actieve stof: Phasmarhabditis californica · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

Bodemtoepassing max. 300.000/m2.

SKAL, MRL

Sluxx HP

Actieve stof: IJzer(III)fosfaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 7,00 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Alleen naaktslakken.

SKAL, MRL

Ritnaald/ emelt

Entonem

Actieve stof: Steinernema feltiae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500.000/m2 · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Lalguard M52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 4 uur

-

SKAL, MRL

Nemasys F

Actieve stof: Steinernema feltiae · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500.000/m2 · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Fungiciden

Altenaria

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 48/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 21

-

Polyversum

Actieve stof: Pythium oligandrum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,3 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 48/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11/7 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: 14

-

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 12/9 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 14

Min. interval 14 dagen.

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: 4 uur

-

SKAL, MRL

Botrytis

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11/7 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: 14

-

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 12/9 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 14

Min. interval 14 dagen.

Valse meeldauw

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 21

-

Pergado V

Actieve stof: Mandipropamid · Groep: 40 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt, 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

-

Polyversum

Actieve stof: Pythium oligandrum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,3 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28/P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 14

Max. 2,50 ltr/ha/toepassing. Max. 25 ltr/ha/12 maanden. Interval min. 7 dagen.

Aliette WG

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,90 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt, 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

-

Pythium

ASPERELLO T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

10 gr/m3 substraat.

SKAL, MRL

Lalstop K61 WP

Actieve stof: Steptomyces · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Ook zaadbehandeling mogelijk.

SKAL, MRL

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 10,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Grondbehandeling.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 10,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Grondbehandeling.

SKAL, MRL

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: 4 uur

Grondbehandeling.

SKAL, MRL

Trianum-G

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 50 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Volvelds strooien.

SKAL, MRL

Trianum-P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Dosering afhankelijk van toepassingswijze.

SKAL, MRL

Rhizoctonia

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 10,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 10,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade Soil Active

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval 21 dagen

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11/7 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: 14

-

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 12/9 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 14

-

Sclerotinia

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 48/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Lalstop Contans WG

Actieve stof: Coniothyrium minitans · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 4,00 kg · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Grondbehandeling voor of tijdens het zaaien of planten.

SKAL, MRL

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewabehandeling

SKAL, MRL

Serenade Soil Active

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval 21 dagen

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11/7 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: 14

-

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 12/9 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 14

-

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: 4 uur

-

SKAL, MRL

Echte meeldauw

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/teelt, 48/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Fado

Actieve stof: COS-OGA · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt, 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Karma

Actieve stof: Kalium waterstofcarbonaat · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Kan schade veroorzaken, voer een proefbespuiting uit.

SKAL, MRL

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt, 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 21

-

Ravibis

Actieve stof: Natriumbicarbonaat · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: 200-500 gr · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

SKAL, MRL

Aliette WG

Actieve stof: Fosetyl-Aluminium · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,90 kg · Max. aantal toepassingen: 2/teelt, 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: 14

-

Hulpstoffen

Heliosol

Actieve stof: - · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 200-500 ml · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

-

Hi-Wett

Actieve stof: - · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

-

Zorg dat de pH van de spuitvloeistof op het juiste niveau is, want bij een afwijkende pH kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderen. Raadpleeg uw adviseur voor de juiste pH per middel en meet de pH na bereiding van de spuitvloeistof.

Het interval tussen de toepassingen is 7 dagen, tenzij anders staat vermeld in de opmerkingen.

SKAL: staat op de Skal Inputlijst. MRL: vrijgesteld van MRL.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a: Carbamates	3: DMI-Fungicides
3a: Pyrethroids, Pyrethrins	4: PA-Fungicides
4a: Neonicotinoids	5: Amines
4c: Sulfoximines	7: SDHI
4d: Butenolides	8: Hydroxy-(2-amino-)Pyrimidines
5: Spinosyns	9: AP-Fungicides
6: Avermectins	11: Qol-Fungicides
7c: Pyriproxyfen	12: PP-Fungicides
10a: Hexythiazox	14: AH-Fungicides
10b: Etoxazole	17: KRI-Fungicides
11a: Bacillus Thuringiensis	21: Qil-Fungicides
16: Buprofezin	28: Carbamates
18: Diacylhydrazines	40: CAA-Fungicides
20b: Acequinocyl	44: Microbial Fungicides
20d: Bifenazate	50: Aryl-Phenyl-Ketones
21a: Meti Acaricides and Insecticides	BM02: Biologicals with multiple MoA
22b: Semicarbazones	M02: Inorganic
23: Tetronic, Tetramic	M04: Phthalimides
25a: Beta-Ketonitrile derivatives	NC: Unknown
28: Diamides	P01: Salicylate-related
29: Flonicamid	P04: Polysaccharide Elicitors
UN: Unknown or uncertain MoA	P07: Phosphonates
UNF: Fungal agents of unknown or uncertain MoA	U06: Phenylacetamide

- Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking.
- Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
- De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.
- Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.

De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/tuinbouw/advieslijst-gewasbescherming-radijs/.