Advieslijst gewasbescherming roos

22 juni 2026

Insecticiden + acariciden

Bladluis

Afinto

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 21 dagen.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,68 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen. Mag alleen ingezet worden als het gewas gesloten is.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Inter Peki

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 21 dagen.

NeemAzal-T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden, 3/blok · Wachttijd in dagen: -

Interval 1,5 maand tussen 2 blokken.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 0,90 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Teppeki

Actieve stof: Flonicamid · Groep: 29 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,14 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 21 dagen.

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

FLiPPER Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500-1000 ml · Max. toepassing/ha: 15 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 400-800 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

MRL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Gazelle

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25 gr · Max. toepassing/ha: 230 gr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max 1L/ha/12 maanden

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/teelt of 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max 1,2L/ha/12 maanden, minimale interval van 14 dagen

Rups

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,10 kg/ha · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen per blok. Interval 7 dagen binnen één blok, 90 dagen tussen twee blokken.

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

CoStar WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 200 ml · Max. toepassing/ha: 0,30-1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 36/12 maanden, 6/teelt · Wachttijd in dagen: -

Max. 200 gr/100 ltr water.

SKAL, MRL

Delfin

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

DiPel DF

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100-200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Lepinox Plus

Actieve stof: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,75-1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 500-1500 ltr water/ha.

SKAL, MRL

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,25 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden, 2/blok · Wachttijd in dagen: -

Interval 7 dagen binnen één blok, 60 dagen tussen twee blokken.

NeemAzal-T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden, 3/blok · Wachttijd in dagen: -

Interval 1,5 maand tussen 2 blokken.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 0,90 ltr · Max. aantal toepassingen: 5x/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Turex spuitpoeder

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Turex WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50-100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 36/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

XenTari

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,20 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. 2,10 ltr deltamethrin/ha/12 maanden.

Proclaim

Actieve stof: Emamectin benzoaat · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max 1,2L/ha/12 maanden, minimale interval van 14 dagen

Wittevlieg

Admiral

Actieve stof: Pyriproxyfen · Groep: 7c · Dosering per 100 ltr: 25 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Applaud 25 SC

Actieve stof: Buprofezin · Groep: 16 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 22 dagen.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,68 ml · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen. Mag alleen ingezet worden als het gewas gesloten is.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Botanigard Vloeibaar

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 125 ml · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 25/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 5 dagen. Let op met fungicidenbehandeling.

SKAL, MRL

Botanigard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 62,5 gr · Max. toepassing/ha: 0,90 kg · Max. aantal toepassingen: 25/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Let op met fungicidenbehandeling.

MRL

Eradicoat Max

Actieve stof: Maltodextrine · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 60 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Lalguard M52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 120 ml · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 24/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Alleen tegen larve. 250 ml Addit toevoegen voor betere werking. Let op met fungicidenbehandeling.

SKAL, MRL

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 300 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 500-1000 liter water/ha. Max. 15 ltr. middel/ha/12 maanden. Let op met fungicidenbehandeling.

SKAL, MRL

NeemAzal-T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden, 3/blok · Wachttijd in dagen: -

Interval 1,5 maand tussen 2 blokken.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 0,90 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 400-800 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 100-300 ltr water/ha. Ook spint, trips, wol-, dop- en bladluis.

MRL

PreFeRal

Actieve stof: Isaria fumosorosea Apopka · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 25/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 26 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

FLiPPER Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500-1000 ml · Max. toepassing/ha: 15 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 26 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. 2,10 ltr deltamethrin/ha/12 maanden.

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 18 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Sumicidin super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. 1,2L/ha/12 maanden, minimale interval van 14 dagen

Inter Aprid SG

Actieve stof: Acetamiprid · Groep: 4a · Dosering per 100 ltr: 25-50 gr · Max. toepassing/ha: 462 gr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Trips

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,68 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 5 blokken van 4 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen een blok min. 42 dagen. Mag alleen ingezet worden als het gewas gesloten is.

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval tussen de blokken min. 1,5 maand.

SKAL

Botanigard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 62,5 gr · Max. toepassing/ha: 0,90 kg · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Bedekte teelt. Let op met fungicidenbehandeling.

MRL

Lalguard M52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 120 ml · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Mainspring

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,25 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden, 2/blok · Wachttijd in dagen: -

Interval 7 dagen binnen één blok, 60 dagen tussen twee blokken.

NeemAzal-T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden, 3/blok · Wachttijd in dagen: -

Interval 1,5 maand tussen 2 blokken.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 0,90 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Conserve

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen per blok. Interval 7 dagen binnen één blok, 28 dagen tussen twee blokken. Aflevertermijn 25-6-2026, opgebruiktermijn 31-12-2026.

SKAL

FLiPPER Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: - · Dosering per 100 ltr: 500-1000 ml · Max. toepassing/ha: 15 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 400-800 ml · Max. toepassing/ha: 4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

MRL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max 3,00 ltr abamectine/ha/12 maanden. Abamectine-producten mogen niet

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. 2,10 ltr deltamethrin/ha/12 maanden.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max 3,00 ltr abamectine/ha/12 maanden. Abamectine-producten mogen niet

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Interval min. 14 dagen.

Sumicidin super

Actieve stof: Esfenvaleraat · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max 1,2L/ha/12 maanden, minimale interval van 14 dagen

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. 3,00 ltr abamectine/ha/12 maanden. Abamectine-producten mogen niet

Winner

Actieve stof: Formetanaat · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 30 gr · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden, 4/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

Spint

Eradicoat Max

Actieve stof: Maltodextrine · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 60 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Floramite

Actieve stof: Bifenazaat · Groep: 20d · Dosering per 100 ltr: 40 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen per blok. Interval 7 dagen binnen één blok, 56 dagen tussen twee blokken.

Nissorun vlb

Actieve stof: Hexythiazox · Groep: 10a · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Scelta

Actieve stof: Cyflumetofen · Groep: 25a · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen per blok, interval 7 dagen binnen één blok. Tussen blokken min. twee toepassingen met middelen uit een andere chemische groep uitvoeren.

Cantack

Actieve stof: Acequinocyl · Groep: 20b · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

3 toepassingen per blok. Interval 7 dagen binnen één blok, 28 dagen tussen twee blokken.

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Budget Abamectine 18 EC

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max 3,00 ltr abamectine/ha/ 12 maanden. Abamectine-producten mogen niet

Carex 10SC

Actieve stof: Pyridaben · Groep: 21a · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 1,90 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max 3,00 ltr abamectine/ha/12 maanden. Abamectine-producten mogen niet

Magister

Actieve stof: Fenazaquin · Groep: 21a · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Milbeknock

Actieve stof: Milbemectin · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Raptol

Actieve stof: Pyrethrinen, koolzaadolie · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 1000 ml · Max. toepassing/ha: 12 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max 3,00 ltr abamectine/ha/12 maanden. Abamectine-producten mogen niet

Fungicide

Echte meeldauw

Abir

Actieve stof: Bupirimaat · Groep: 8 · Dosering per 100 ltr: 200 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

Alibi Flora

Actieve stof: Azoxystrobin, difenoconazool · Groep: 11/3 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

2 toepassingen per blok. Interval 7 dagen binnen één blok, 120 dagen tussen twee blokken.

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3/7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. 20 ltr. middel/ha/12 maanden. Toepassen in 500-1500 ltr water/ha.

Collis

Actieve stof: Boscalid, kresoxim-methyl · Groep: 11/7 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Fado

Actieve stof: COS-OGA · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00-4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Flint

Actieve stof: Trifloxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 12,5 gr · Max. toepassing/ha: 0,125 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Frutogard

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 375 ml · Max. toepassing/ha: 4,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

-

Fungaflash

Actieve stof: Imazalil · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 200 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

Karma

Actieve stof: Kalium waterstofcarbonaat · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 0,96 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Niet in lichtarme periode toepassen.

Ravibis

Actieve stof: Natriumwaterstofcarbonaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00-5,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aanbevolen concentratie: 0,33 - tot maximaal 1% afhankelijk van het watervolume.
Gewasbehandeling, toepassen in 300-600 ltr water/ha.

SKAL

Romeo

Actieve stof: Cerevisaan · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 100 - 1000 ltr water/ha.

SKAL, MRL

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 70/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Takumi

Actieve stof: Cyflufenamid · Groep: U06 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,15 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Topaz 100 EC

Actieve stof: Penconazool · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 25-50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Vitisan

Actieve stof: Kalium waterstofcarbonaat · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: 0,30-0,50 kg · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 600-100 ltr water/ha.

SKAL, MRL

Vitola

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3/7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Afepasa G Sulphur Tablets

Actieve stof: Zwavel · Groep: M02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,32 kg · Max. aantal toepassingen: - · Wachttijd in dagen: -

1 zwavelverdamper per 100 m2

SKAL, MRL

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

Roest

Collis

Actieve stof: Boscalid, kresoxim-methyl · Groep: 11/7 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Sclerotinia

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3/7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. 20 ltr. middel/ha/12 maanden. Toepassen in 500-1500 ltr water/ha.

Serenade

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

SKAL, MRL

Serenade Soil Activ

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1-2 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 21 · Toepassingsgebied: Druppelbehandeling

---

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: -

SKAL, MRL

Botrytis

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Botector

Actieve stof: Aureobasidium pullulans · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Frutogard

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 375 ml · Max. toepassing/ha: 4,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

-

Geoxe

Actieve stof: Fludioxonil · Groep: 12 · Dosering per 100 ltr: 40 gr · Max. toepassing/ha: 0,50 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Polyversum

Actieve stof: Pythium oligandrum · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,30 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 6

SKAL

Prolectus

Actieve stof: Fenpyrazamine · Groep: 17 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,20 kg · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: -

Opgebruiktermijn: 30-6-2026.

Romeo

Actieve stof: Cerevisaan · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Toepassen in 100 - 1000 ltr water/ha.

SKAL, MRL

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 12/9 · Dosering per 100 ltr: 80 gr · Max. toepassing/ha: 0,96 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden, 3/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,37 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Teldor

Actieve stof: Fenhexamide · Groep: 17 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling.

Vintec

Actieve stof: Trichoderma atroviride · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 10-20 gr · Max. toepassing/ha: 0,20 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

Valse meeldauw

Frutogard

Actieve stof: Kaliumfosfonaten · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: 375 ml · Max. toepassing/ha: 4,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 7

-

Pergado V

Actieve stof: Mandipropamid · Groep: 40 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28/P07 · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aflevertermijn 25-9-2026, opgebruiktermijn 31-12-2026.

Aliette

Actieve stof: Fosetyl · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Gewasbehandeling.

Phytopthora

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28/P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppel- of aangietbehandeling.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00-2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling.

Ridomil Gold SL

Actieve stof: Metalaxyl-M · Groep: 4 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,125 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling. Interval min. 42 dagen.

Pergado V

Actieve stof: Mandipropamid · Groep: 40 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Aflevertermijn 25-9-2026, opgebruiktermijn 31-12-2026.

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,75 kg/1000m2 · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppel- of aangietbehandeling.

Pythium

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28/P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppel- of aangietbehandeling.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 1,00-2,00 ltr · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling.

Aliette

Actieve stof: Fosetyl-aluminium · Groep: P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,75 kg/1000m2 · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Druppel- of aangietbehandeling.

Zorg dat de pH van de spuitvloeistof op het juiste niveau is, want bij een afwijkende pH kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderen. Raadpleeg uw adviseur voor de juiste pH per middel en meet de pH na bereiding van de spuitvloeistof.

Het interval tussen de toepassingen is 7 dagen, tenzij anders staat vermeld in de opmerkingen.

SKAL: staat op de Skal Inputlijst. MRL: vrijgesteld van MRL.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a: Carbamates	3: DMI-Fungicides
3a: Pyrethroids, Pyrethrins	4: PA-Fungicides
4a: Neonicotinoids	5: Amines
4c: Sulfoximines	7: SDHI
4d: Butenolides	8: Hydroxy-(2-amino-)Pyrimidines
5: Spinosyns	9: AP-Fungicides
6: Avermectins	11: Qol-Fungicides
7c: Pyriproxyfen	12: PP-Fungicides
10a: Hexythiazox	14: AH-Fungicides
10b: Etoxazole	17: KRI-Fungicides
11a: Bacillus Thuringiensis	21: Qil-Fungicides
16: Buprofezin	28: Carbamates
18: Diacylhydrazines	40: CAA-Fungicides
20b: Acequinocyl	44: Microbial Fungicides
20d: Bifenazate	50: Aryl-Phenyl-Ketones
21a: Meti Acaricides and Insecticides	BM02: Biologicals with multiple MoA
22b: Semicarbazones	M02: Inorganic
23: Tetronic, Tetramic	M04: Phthalimides
25a: Beta-Ketonitrile derivatives	NC: Unknown
28: Diamides	P01: Salicylate-related
29: Flonicamid	P04: Polysaccharide Elicitors
UN: Unknown or uncertain MoA	P07: Phosphonates
UNF: Fungal agents of unknown or uncertain MoA	U06: Phenylacetamide

- Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking.
- Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
- De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.
- Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.

De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/tuinbouw/advieslijst-gewasbescherming-roos/.