Advieslijst gewasbescherming tomaat

15 juni 2026

Insecticiden en acariciden

Bladluis

Benevia

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Pirimor

Actieve stof: Pirimicarb · Groep: 1a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 2/12 maand · Wachttijd in dagen: 1

Werkt niet tegen alle soorten luizen. Aangescherpte gebruiksvoorwaarden m.b.t. lozing. Aflevertermijn: 15-9-2026, opgebruiktermijn 31-12-2026.

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33 ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 3,30 ltr/12 maanden · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Flipper Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 1 ltr · Max. toepassing/ha: 16 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Max. 3 bespuitingen per blok.

SKAL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 1,5% (1,5 ltr/100 ltr water) · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13 ml · Max. toepassing/ha: 0,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Spyro

Actieve stof: Pyrethrinen · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,65 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Alleen bedekte teelt. Toepassen in 275 tot 600 ltr water/ha.

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 60-75 ml · Max. toepassing/ha: 0,90-1,12 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

Mineervlieg

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,15 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Niet grondgebonden. 2x/blok. Interval tussen blokken is 90 dagen. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Benevia

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 40 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33 ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 3,30 ltr/12 maanden · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Abamectine Budget

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Rups

Altacor

Actieve stof: Chlorantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 10 gr · Max. toepassing/ha: 0,15 kg · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Niet grondgebonden. 2x/blok. Interval tussen blokken is 90 dagen. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Benevia

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Costar WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Delfin

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 50 gr · Max. toepassing/ha: 0,75 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

DiPel DF

Actieve stof: Bacillus thuringiensis kurstaki · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100-200 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Turex WG

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Turex spuitpoeder

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33 ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 3,30 ltr/12 maanden · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

XenTari

Actieve stof: Bacillus thuringiensis aizawai · Groep: 11a · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Tracer

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Wittevlieg

Benevia

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 75 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

BotaniGard WP

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 62,50 gr · Max. toepassing/ha: 0,90 kg · Max. aantal toepassingen: 25/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Eradicoat Max

Actieve stof: Maltodextrine · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 2% (2 ltr/100 ltr water) · Max. toepassing/ha: 60 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/teelt, 60/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Mycotal

Actieve stof: Akanthomyces muscarius · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 2,00 kg · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Alleen tegen larve. Voeg 250 ml/100 ltr Addit toe voor een betere werking.

SKAL, MRL

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 300 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Nofly OD

Actieve stof: Paecilomyces fumosoroseus stam Fe9901 · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 125-250 ml · Max. toepassing/ha: 2,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Velifer

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 1,25 ltr · Max. aantal toepassingen: 73/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Verimark

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 33 ml/1000 planten · Max. toepassing/ha: 3,30 ltr/12 maanden · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Admiral

Actieve stof: Pyriproxyfen · Groep: 7c · Dosering per 100 ltr: 25 ml · Max. toepassing/ha: 0,375 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Werkt alleen tegen het ei- en larvestadium.

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Bloomazal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Flipper Plus

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 1,00 ltr · Max. toepassing/ha: 16 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Max. 3 bespuitingen per blok.

SKAL, MRL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 1,5% (1,5 ltr/100 ltr water) · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 400-800 ml · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

MRL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 60-75 ml · Max. toepassing/ha: 0,90-1,12 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

Carex 10SC

Actieve stof: Pyridaben · Groep: 21a · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

Decis

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket. Expiratiedatum 30-6-2025, aflevertermijn 30-12-2025, opgebruiktermijn 30-12-2026.

Decis Protech

Actieve stof: Deltamethrin · Groep: 3a · Dosering per 100 ltr: 83 ml · Max. toepassing/ha: 0,83 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Trips

Benevia

Actieve stof: Cyantraniliprole · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,20 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Lalguard M52 OD

Actieve stof: Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52 · Groep: UNF · Dosering per 100 ltr: 0,12% (0,12L/100L) · Max. toepassing/ha: 1,80 ltr · Max. aantal toepassingen: 10/12 maanden · Wachttijd in dagen: 4 uur

-

SKAL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Tracer

Actieve stof: Spinosad · Groep: 5 · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL

Abamectine

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Wantsen

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Closer

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 26 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Sequoia

Actieve stof: Sulfoxaflor · Groep: 4c · Dosering per 100 ltr: 13-26 ml · Max. toepassing/ha: 0,40 ltr · Max. aantal toepassingen: 1-2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Sivanto Prime

Actieve stof: Flupyradifuron · Groep: 4d · Dosering per 100 ltr: 60-75 ml · Max. toepassing/ha: 0,90-1,12 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

Spint

Cantack

Actieve stof: Acequinocyl · Groep: 20b · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

Eradicoat Max

Actieve stof: Maltodextrine · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 2,50 ltr · Max. toepassing/ha: 75 ltr · Max. aantal toepassingen: 20/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

SKAL, MRL

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: 0

-

SKAL, MRL

Nissorun vlb

Actieve stof: Hexythiazox · Groep: 10a · Dosering per 100 ltr: 20 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Contactwerking. Tegen 1e larvestadium en eieren.

Scelta

Actieve stof: Cyflumetofen · Groep: 25a · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Niet grondgebonden teelt.

Neudosan

Actieve stof: Vetzuren, kaliumzouten · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 1,5% (1,5 ltr/100 ltr water) · Max. toepassing/ha: 36 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Oroganic

Actieve stof: Sinaasappelolie · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 400-800 ml · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

MRL

Abamectine

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Carex 10SC

Actieve stof: Pyridaben · Groep: 21a · Dosering per 100 ltr: 140 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 1/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Tomaten- galmijt

Naturalis-L

Actieve stof: Beauveria bassiana · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 15/12 maanden · Wachttijd in dagen: 0

-

SKAL, MRL

Kumulus S

Actieve stof: Zwavel · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 200 gr · Max. toepassing/ha: 4,00 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

Abamectine

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Imex-Abamectine 2

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Vertimec Gold

Actieve stof: Abamectine · Groep: 6 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,75 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof per hectare, zie etiket.

Tuta absoluta

Isonet-T

Actieve stof: (E,Z)-3,8-tetradecadieen-1-yl acetaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

800-1000 dispensers/ha.

SKAL, MRL

Vynyty Tuta Press

Actieve stof: (E,Z)-3,8-tetradecadieen-1-yl acetaat · Groep: - · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

750 dispensers/ha.

SKAL

Azatin

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

SKAL

BloomAzal

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

NeemAzal - T/S

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 250 ml · Max. toepassing/ha: 2,00-3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 18/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

6 blokken van 3 wekelijkse bespuitingen. Interval tussen blokken minimaal 1,5 maand.

SKAL

Oikos

Actieve stof: Azadirachtin · Groep: UN · Dosering per 100 ltr: 100-150 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte, niet grondgebonden teelt.

SKAL

Fungiciden

Meeldauw

Abir

Actieve stof: Bupirimaat · Groep: 8 · Dosering per 100 ltr: 200 ml · Max. toepassing/ha: 2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Met uitzondering van mini, tros, pruim, cherry en cocktail tomaten. Toepassen bij 200-1000 ltr water.

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 1,50 kg/ha/toepassing · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Min. interval 7 dagen.

SKAL, MRL

Bifasto

Actieve stof: Difenoconazool, fluxapyroxad · Groep: 3-7 · Dosering per 100 ltr: 0,60 ltr/ha · Max. toepassing/ha: 0,60 ltr/ha · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Alleen bedekte teelt. Toepassen in 400 tot 1500 ltr water/ha.

Fado

Actieve stof: COS-OGA · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00-4,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 5/teelt · Wachttijd in dagen: 0

Uitsluitend preventief toepassen, min. 3x spuiten. Toepassen met min. 1000 ltr/ha.

SKAL, MRL

Fungaflash

Actieve stof: Imazalil · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 200 ml · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Niet in winter op jong gewas.

Karma

Actieve stof: Kalium waterstofcarbonaat · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 kg · Max. aantal toepassingen: 8/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Toepassen met 500-1500 ltr/ha.

SKAL, MRL

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Druppelen 40 ml/1000 planten.

Ortiva

Actieve stof: Azoxystrobin · Groep: 11 · Dosering per 100 ltr: 80 ml · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Niet toepassen voor 1 mei.

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 8,00 ltr · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade SC

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 8,00 ltr · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11-7 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Bedekte, niet grondgebonden teelt.

Taegro

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 0,185-0,37 kg · Max. toepassing/ha: 0,37 kg/ha · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: 4 uur

-

SKAL, MRL

Takumi

Actieve stof: Cyflufenamid · Groep: U06 · Dosering per 100 ltr: 0,15 ltr/ha · Max. toepassing/ha: 0,15 ltr/ha · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: 3

-

Topaz 100 EC

Actieve stof: Penconazool · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 50 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Bedekte, niet grondgebonden teelt.

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 21 ltr/ha/12 maanden · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 7 dagen.

SKAL, MRL

Vivando

Actieve stof: Metrafenon · Groep: 50 · Dosering per 100 ltr: 30 ml · Max. toepassing/ha: 0,30 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS

Actieve stof: Zwavel · Groep: M02 · Dosering per 100 ltr: 1 zwavel- verdamper per 500m2 · Max. toepassing/ha: 0,064 kg · Max. aantal toepassingen: Zie opmerking. · Wachttijd in dagen: -

Min. interval tussen een toepassing 0,5 dag. Eén toepassing staat gelijk aan 8 uur zwavelen, waarbij er 0,40 g zwavel per zwavelverdamper per uur vrijkomt. De verdampers kunnen elke nacht gebruikt worden, een aantal nachten achter elkaar of om de nacht.

SKAL, MRL

Phytophthora

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28-P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Toegelaten in bedekte substraatteelt.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00-2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Druppelbehandeling. Toepassen in 500-1500 ltr water/ha.

Ranman Top

Actieve stof: Cyazofamide · Groep: 21 · Dosering per 100 ltr: 42 ml · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

600-1200 ltr water/ha. Eerste behandeling vanaf 5e blad, na 7-10 dagen herhalen.

Botrytis

Amylo-X WG

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 1,50 kg/ha/toepassing · Max. toepassing/ha: 2,50 kg · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Min. interval 7 dagen.

SKAL, MRL

Luna Privilege

Actieve stof: Fluopyram · Groep: 7 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

Druppelen 40 ml/1000 planten.

Prestop

Actieve stof: Clonostachys rosea stam J1446 · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: 500 gr · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 6/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Max. 10 ltr spuitoplossing per 500 planten.

SKAL, MRL

Scala

Actieve stof: Pyrimethanil · Groep: 9 · Dosering per 100 ltr: 100 ml · Max. toepassing/ha: 1,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 2/teelt · Wachttijd in dagen: -

Stengelbehandeling.

Serenade Prime

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 8,00 ltr · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serenade SC

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 8,00 ltr · Max. toepassing/ha: 8,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 9/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

-

SKAL, MRL

Serifel

Actieve stof: Bacillus amyloliquefaciens · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 0,50 ltr · Max. aantal toepassingen: 6/teelt · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 5 dagen.

SKAL, MRL

Signum

Actieve stof: Pyraclostrobine, boscalid · Groep: 11-7 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/teelt · Wachttijd in dagen: 1

Bedekte, niet grondgebonden teelt.

Switch

Actieve stof: Cyprodinil, fludioxonil · Groep: 12-9 · Dosering per 100 ltr: 80 gr · Max. toepassing/ha: 1,00 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

-

Teldor

Actieve stof: Fenhexamide · Groep: 17 · Dosering per 100 ltr: 100 gr · Max. toepassing/ha: 1,50 kg · Max. aantal toepassingen: 3/12 maanden · Wachttijd in dagen: 1

-

Vacciplant

Actieve stof: Laminarin · Groep: P04 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 21 ltr/ha/12 maanden · Max. aantal toepassingen: 7/12 maanden · Wachttijd in dagen: -

Min. interval 7 dagen. 21 ltr/ha/12 maanden als extra toevoegen naast de huidige ltr/ha/toepassing.

SKAL, MRL

Pythium

ASPERELLO T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum stam T34 · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: Zie opmerking. · Max. toepassing/ha: 5 kg/ha/teelt · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Mengen door teeltmedium: 10 g/m^3 substraat.

SKAL, MRL

ASPERELLO T34 Biocontrol

Actieve stof: Trichoderma asperellum stam T34 · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: Zie opmerking. · Max. toepassing/ha: 5 kg/ha/teelt · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Bespuiting (zaadtrays en multipots) 10 g/m3 substraat of 0,5g/m2 (bij 5 cm diepte).

SKAL, MRL

ASPERELLO

Actieve stof: Trichoderma asperellum stam T34 · Groep: NC · Dosering per 100 ltr: Zie opmerking. · Max. toepassing/ha: 8 kg/ha · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: -

Druppel of aangieten: 10 g/m3 substraat 10-200 g/1000 planten.

SKAL, MRL

Previcur Energy

Actieve stof: Propamocarb, fosetyl · Groep: 28-P07 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 3,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/12 maanden · Wachttijd in dagen: 3

Toegelaten in bedekte substraatteelt.

Proplant

Actieve stof: Propamocarb hydrochloride · Groep: 28 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: 1,00-2,00 ltr · Max. aantal toepassingen: 4/teelt · Wachttijd in dagen: 3

Druppelbehandeling. Toepassen in 500-1500 ltr water/ha.

Trianum P

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: 15-30 gr/1000 planten · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 12/teelt · Wachttijd in dagen: -

Druppelbehandeling.

SKAL, MRL

Trianum G

Actieve stof: Trichoderma harzianum · Groep: BM02 · Dosering per 100 ltr: - · Max. toepassing/ha: - · Max. aantal toepassingen: 1/teelt · Wachttijd in dagen: -

Strooien op of in het plantgat: dosering 1 kg/1000 planten.

SKAL, MRL

Wond-behandeling

Scomrid Aerosol

Actieve stof: Imazalil · Groep: 3 · Dosering per 100 ltr: 0,50-1 seconde · Max. toepassing/ha: 56 spuitbussen · Max. aantal toepassingen: 2x per wond · Wachttijd in dagen: -

0,50-1 seconde op de wond spuiten, niet op het blad.

Zorg dat de pH van de spuitvloeistof op het juiste niveau is, want bij een afwijkende pH kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderen. Raadpleeg uw adviseur voor de juiste pH per middel en meet de pH na bereiding van de spuitvloeistof.

Het interval tussen de toepassingen is 7 dagen, tenzij anders staat vermeld in de opmerkingen.

SKAL: staat op de Skal Inputlijst. MRL: vrijgesteld van MRL.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a: Carbamates	3: DMI-Fungicides
3a: Pyrethroids, Pyrethrins	4: PA-Fungicides
4a: Neonicotinoids	5: Amines
4c: Sulfoximines	7: SDHI
4d: Butenolides	8: Hydroxy-(2-amino-)Pyrimidines
5: Spinosyns	9: AP-Fungicides
6: Avermectins	11: Qol-Fungicides
7c: Pyriproxyfen	12: PP-Fungicides
10a: Hexythiazox	14: AH-Fungicides
10b: Etoxazole	17: KRI-Fungicides
11a: Bacillus Thuringiensis	21: Qil-Fungicides
16: Buprofezin	28: Carbamates
18: Diacylhydrazines	40: CAA-Fungicides
20b: Acequinocyl	44: Microbial Fungicides
20d: Bifenazate	50: Aryl-Phenyl-Ketones
21a: Meti Acaricides and Insecticides	BM02: Biologicals with multiple MoA
22b: Semicarbazones	M02: Inorganic
23: Tetronic, Tetramic	M04: Phthalimides
25a: Beta-Ketonitrile derivatives	NC: Unknown
28: Diamides	P01: Salicylate-related
29: Flonicamid	P04: Polysaccharide Elicitors
UN: Unknown or uncertain MoA	P07: Phosphonates
UNF: Fungal agents of unknown or uncertain MoA	U06: Phenylacetamide

- Lees voor gebruik van het product altijd het etiket op de verpakking.
- Als er afwijkingen zijn tussen de informatie op deze lijst en de etiketten op de CTGB site, dan is het etiket op de CTGB site leidend.
- De informatie op deze spuitadvieslijst is bedoeld als advies. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met uw specialist.
- Omdat de toepassing buiten ons om gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.

- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.

De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/tuinbouw/advieslijst-gewasbescherming-tomaat/.