

Paprika spuitadvieslijst

Uitgave januari 2018

Plaa/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel.nr.	Groep	Spuiten /100 ltr.	Maximaal aantal toepassingen	Wachttijd in dagen	Opmerkingen
Insecticiden en acariciden								
Bladluis	Plenum 50 WG	Pymetrozine	12491N	9b	20 gr		1	Druppelbeh. op substr. 10 ml/1000 planten
	Calypso	Thiacloprid	12452 N	4	25 gr		1	Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Gazelle	Acetameprid	12809 N	4	25 gr		3	
	Pirimor	Pirimicarb	5794 N	1a	50 gr	2/jaar	1	Werkt niet tegen alle soorten luizen. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Pirimor SG	Pirimicarb	15083 N	1a		2/jaar	1	1 pot per 700 m ² , temp. > 22 °C, max. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Admire	Imidacloprid	11483 N	4	10 gr	2/teelt		Druppelbeh. op substr. 3,5 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Kohinor 700 WG	Imidacloprid	13831 N	4	10 gr	2/teelt		Druppelbeh. op substr. 3,5 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
Mineervlieg	Trigard	Cyromazine	12014 N	17	100 ml	3/teelt	1	Tegen larvestadium, trage aanvangswerking. Maximaal 1,5 ltr per toepassing per ha
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/teelt	3	Interval 7 dagen, max. 1400 l/ha. Maximaal 700 ml middel per toepassing per ha
Rups	Altacor	Chlorantraniliprole	13643 N	28	10 gr	6/jaar	1	Per toepassing min. 50 gr. --> max. 150 gr/ha.
	Nocturn	Pyridalyl	13359N	UN	100 ml	2/teelt	3	
	Runner	Methoxyfenozide	12696 N	18	40 ml		1	
	Turex 50 WP	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	11702 N	11	50-100 gr	6/jaar		7 dagen interval. Maximaal 1 kg per toepassing per ha
	Xentari	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	12437 N	11	100 gr	8/jaar		5 dagen interval. Maximaal 1,5 kg per toepassing per ha
	DiPel DF	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	14674 N	11	100-200 gr	8/jaar		7 dagen interval
	Delfin	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	10944 N	11	50 gr	3/teelt		Maximaal 0,75 kg/ha per toepassing, interval min. 7 dagen Let op pH gevoelig!
	Steward	Indoxacarb	12371 N	22	12,5 gr	6/jaar	1	
	Nomolt	Teflubenzuron	9914 N	15	100 ml	3/teelt	3	Maximaal 1,5 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/teelt	3	Interval 7 dagen, max. 1400 ltr/ha. Maximaal 700 ml middel per toepassing per ha
	Wittevlieg	Admiral	Pyriproxyfen	11828 N	7	25 ml	2/teelt	3
Botanigard WP		Beauveria bassiana	12612 N	\	62,5 gr	6/teelt	n.v.o.	Maximaal per toepassing 0,9 kg/ha
Botanigard vib		Beauveria bassiana	12611N	\	125 ml	6/teelt	n.v.o.	
Plenum 50 WG		Pymetrozine	12491N	9b	60 gr		1	Druppelbeh. op substr. 15 ml/1000 planten
Mycotal		Lecanicillium muscarium	10980 N	\	100 gr			Alleen tegen larve. Voeg 250 ml Addit toe voor een betere werking.
ERII		Maltodextrine	15175 N	-	2,5 l	20/jaar	n.v.o.	Max. 75 liter per ha per toepassing
Oberon		Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	2/teelt	n.v.o.	Gebruik van 1 maart tot 1 september wordt afgeraden.
Calypso		Thiacloprid	12452 N	4	25 gr		1	Druppelbeh. op substr. na 1 maart 20 ml/1000 planten. Wachttijd 3 dagen. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
Nomolt		Teflubenzuron	9914 N	15	50 ml	3/teelt	3	Werkt alleen tegen het larvestadium. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
Admire		Imidacloprid	11483 N	4		2/teelt	1	Druppelbeh. op substr. 14 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
Kohinor 700 WG		Imidacloprid	13831 N	4		2/teelt	1	Druppelbeh. op substr. 14 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
Decis EC		Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/teelt	3	Interval 7 dagen, max. 1400 ltr/ha. Maximaal 700 ml middel per toepassing per ha
Trips		Mycotal	Lecanicillium muscarium	10980 N	\	100 gr		
	Tracer	Spinosad	12567 N	5	20 ml	5/jaar	3	Maximaal 0,3 ltr per toepassing per ha
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/teelt	3	Interval 7 dagen, max. 1400 ltr/ha. Maximaal 700 ml middel per toepassing per ha
Spint	Floramite	Bifenazaat	12421 N	un	40 ml	4/jaar	1	Maximaal 2x per blok. Maximaal 0,6 ltr per toepassing per ha
	Nissorun vib.	Hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	2/teelt	3	Werkt alleen op ei- en nimfenstadia. Maximaal 0,3 ltr per toepassing per ha
	Oberon	Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	2/teelt	n.v.o.	Gebruik van 1 maart tot 1 september wordt afgeraden.
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	25 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	25 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
Slakken	Sluix slakkenkorrels	IJzer(III)fosfaat	13316 N	\	7 kg/ha			0,7 gr/m ²
Fungiciden								
Meeldauw	Flint	Trifloxystrobin	12289 N	11	12,5 gr	3/teelt	1	
	Ortiva	Azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	3/teelt	1	
	Serenada SC	Bacillus subtilis	14536 N			9/jaar		8 liter/ ha Altijd een uitvloier meenemen. Na 5 dagen herhalen.
	Fado	COS-OGA	14921 N			5/teelt		3-4 liter/ha
	Signum	Pyraclostrobin / Boscalid	12630 N	11/7	100 gr	3/teelt	3	
	Vivando	Metrafenon	14231 N	U8	30 ml	2/teelt of 2/jaar	3	Maximaal 0,3 ltr per toepassing per ha
Phytophthora	AAterra ME	Etridiazol	8766 N	14		2/teelt	1	0,4 - 0,8 ltr/ha druppelen
Botrytis	Rovral Aquaflo	Iprodion	8928 N	2	50 ml	5/teelt	3	Opgebruiktermijn 5-6-2018
	Prestop	Glucocladium catenulatum	13413 N	\	500 gr			Preventieve werking op Botrytis, spuitbehandeling elke 4 weken herhalen.
	Prolectus	Fenpyrazamine	14453 N	17	80-120 gr	3/teelt	1	Maximaal 1,2 kg per toepassing per ha
	Teldor	Fenhexamide	12130 N	17	100 gr		1	
	Signum	Pyraclostrobin / Boscalid	12630 N	11/7	100 gr	3/teelt	3	
	Thiram Granuflo	Thiram	10172 N	M3				Plek op stengel of poot insmeren met papje 200 gr/1 ltr.
	Switch	Fludioxonil / Cyprodinil	12819 N	9/12	80 gr		3	Maximaal 1 kg per toepassing per ha
Sclerotinia	Rovral Aquaflo	Iprodion	8928 N	2	50 ml	5/teelt	3	Opgebruiktermijn 5-6-2018
Pythium	AAterra ME	Etridiazol	8766 N	14		2/teelt	1	0,4 - 0,8 ltr/ha druppelen
	Mycostop	Streptomyces griseoviridis	11708 N	\				In de opkweekfase is de dosering 2 gr/1.000 planten
	Previcor Energy	Propamocarb / Fosetyl	13221 N	28/33			3	10-20 gr/1000 pl. Kleine plant 1,5 ltr/ha grote plant 3 ltr/ha
	Proplant	Propamocarb hydrochloride	12918 N	28			3	Max. 3x herf. interval 7-15 dagen. 1 - 2 ltr/ha
Rhizoctonia	Rovral Aquaflo	Iprodion	8928 N	2	50 ml	5/teelt	3	Opgebruiktermijn 5-6-2018

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

n.v.o. = niet op de dag voor de oogst




Indeling insecticiden (IRAC)

- 1a) carbamaten
- 3) pyrethroiden
- 4) neonicotinen
- 5) spinosyns
- 6) avermectinen
- 7) pyriproxyfen
- 9) pymetrozine
- 10) thiazolidines
- 11) bacillus thuringiensis
- 12) org. tinverbindingen
- 15) pyrazoolverbindingen
- 16) buprofezin
- 17) cyromazine
- 18) diacylhydrozinen
- 21) pyridazine verbindingen
- 22) indoxacarb
- 23) ketoenolen
- 28) phthalic acid diamides
- UN) diverse

Indeling fungiciden (FRAC)

- 1) MBC - fungiciden
- 2) dicarboximides
- 3) DMI - fungiciden
- 4) PA - fungiciden
- 5) amines
- 7) SDHI
- 8) hydroxy-(2-amino)-pyrimidines
- 9) AP - fungiciden
- 11) Ool - fungiciden
- 12) PP - fungiciden
- 14) aromatic hydrocarbons + heteroaromatics
- 17) hydroxyanilides
- 28) carbamates
- 33) phosphonates
- 40) CAA - fungiciden
- M2) inorganic
- M3) dithiocarbates and relatives
- M4) phthalimides
- M5) chloronitrils
- NC) diverse
- U8) benzophenonen

Neveneffect op natuurlijke bestrijders

-  Inzetbaar in geïntegreerde teelt
-  Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders
-  Niet te combineren met natuurlijke bestrijders

Voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming:

- * Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking.
- * Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies.
- * Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.
- * Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- * Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen BV deze lijst of gegevens uit deze lijst te vernieuwvuldigen of verspreiden.