

Tomaat spuitadvieslijst

Uitgave januari 2018

Plaa/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel.nr.	Groep	Sputen /100 ltr.	Maximaal aantal toepassingen	Wachttijd in dagen	Opmerkingen	
Insecticiden en acariciden									
Bladluis	Plenum 50 WG	Pymetrozine	12491 N	9b	20 gr	2/jaar	1	Nu ook druppelen toegestaan (10 gr/1000 planten).	
	Pirimor	Pirimicarb	5794 N	1a	50 gr	2/jaar	1	Werk niet tegen alle soorten luizen. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Pirimor SG	Pirimicarb	15083 N	1a		2/jaar	1	1 rookontwikkelaar per 700 m ³ . Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Flipper Plus	Vetzuren, kaliumzouten	\	\	1-2%			Interval min. 7dgn, max. 3 bespuitingen per blok, pH water min. 7 of hoger	
	Calypso	Thiacloprid	12452 N	4	25 ml	2/jaar	1	Druppelen op substraat vanaf 1 maart: 20 ml/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Gazelle	Acetameprid	12809 N	4	25 gr		3	Niet toepassen in een jong gewas gedurende de periode van 1 november tot 1 april in verband met mogelijke nadelige gewasreacties	
	Kohinor 700 WG	Imidacloprid	13831 N	4		1/jaar	n.v.o.	Druppelbeh. op substr. 3,5 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Admire	Imidacloprid	11483 N	4		2/teelt	n.v.o.	Druppelbeh. op substr. 3,5 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
Mineervlieg	Trigard	Cyromazin	12014 N	17	100 ml		1	Werk alleen tegen larvestadium, trage aanvangswerking.	
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/jaar	3	Interval 7 dagen. Max 1400 ltr/ha.	
Rups	Altacor	Chlorantraniliprole	13643 N	28	10 gr	4/jaar	1	Per toepassing min. 50 gr en max. 150 gr/ha.	
	Nocturn	Pyridalyl	13359 N	un	100 ml	2/teelt	3	snelle aanvangswerking, bestrijdt alle larvale stadia	
	Runner	Methoxyfenoxide	12696 N	18	40 ml		1		
	Turex 50 WP	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	11702 N	11	50 - 100 gr	6/jaar	n.v.o.	Maximaal 1 kg/ha. Het middel is pH gevoelig	
	DiPel DF	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	14674 N	11	100-200 gr	8/jaar		Maximaal 1 kg/ha. Het middel is pH gevoelig	
	XenTari	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	12437 N	11	100 gr	8/jaar	n.v.o.	Maximaal 1 kg/ha. Het middel is pH gevoelig	
	Delfin	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	10944 N	11	50 gr	3/teelt		Maximaal 0,75 kg/ha per toepassing, interval min. 7 dagen. Let op pH gevoelig!	
	Steward	Indoxacarb	12371 N	22	12,5 gr	6/jaar	1	Heeft een nawerking op cicaden en wantsen	
	Nomolt	Teflubenzuron	9914 N	15	100 ml	3/teelt	3	Alleen in bedekte niet bodemgebonden teelt toegestaan.	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/teelt	3	Interval 7 dagen. Max 1400 ltr/ha. Maximaal 0,5 l middel per ha per keer	
	Wittevlieg	Admiral	Pyriproxyfen	11828 N	7	25 ml	2/teelt	3	Werk alleen tegen het ei- en larvestadium.
		Plenum 50 WG	Pymetrozine	12491 N	9b	60 gr	3/jaar	1	Druppelen 15 gr/1000 planten.
PreFeRal		Paeclomyces fumosoroseus	12694 N	-	100 gr	3/teelt	n.v.o.	Insecticide op basis van schimmelsporen. Max. 3 kg per toepassing per ha.	
Botanigard WP		Beauveria bassiana	12612 N	-	62,5 gr	25/teelt	1	Insecticide op basis van schimmelsporen.	
Naturalis-L		Beauveria bassiana	13857 N	-	300 ml	5/teelt	n.v.o.	Max. 3 ltr/ha per toepassing. Insecticide op basis van schimmelsporen.	
ERII		Maltodextrine	15175 N	-	2,5 l	20/jaar	n.v.o.	Max. 75 liter per ha per toepassing	
Flipper Plus		Vetzuren, kaliumzouten	\	\	1-2%			Interval min. 7dgn, max. 3 bespuitingen per blok, pH water min. 7 of hoger	
Mycotal		Lecanicillium muscarium	10980 N	-	100 gr	12/teelt		Insecticide op basis van schimmelsporen. Max. 2 kg per toepassing per ha.	
Oberon		Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	2/teelt	n.v.o.	Aan Oberon geen hechters/uitvloeiers toevoegen, ook niet mengen met andere middelen	
Nomolt		Teflubenzuron	9914 N	15	50 ml	3/teelt	3	Werk alleen tegen het larvestadium. Max 1,5/ha per toepassing	
Decis EC		Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/teelt	3	Interval 7 dagen. Max. 1400 ltr/ha.	
Admire		Imidacloprid	11483 N	4		2/teelt	n.v.o.	Druppelbeh. op substr. 14 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
Kohinor 700 WG		Imidacloprid	13831 N	4		2/teelt	n.v.o.	Druppelbeh. op substr. 14 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
Trips		Tracer	Spinosad	12567 N	5	20 ml	5/jaar	1	Tijdens toepassen schadelijk voor bijen en hommels.
		Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/teelt	3	Maximaal 1400 ltr/ha per toepassing	
	Spint	Bifenazaat	12421 N	un	40 ml	4/jaar	1	Middel heeft contactwerking en werkt tegen spint en ei. pH gevoelig! pH spuitoplossing tussen 5,5 en 6	
Tomatengalmijt	Nissorun vib	Hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	2/teelt	3	Contactwerking. Tegen 1e larvestadium en eieren	
	Apollo	Chlofentazin	8794 N	10a	30 ml		3	Toepassen met 1500 ltr/ha opgebruiken voor 1-5-2018	
	Flipper Plus	Vetzuren, kaliumzouten	\	\	1-2%			Interval min. 7dgn, max. 3 bespuitingen per blok, pH water min. 7 of hoger	
	Borneo	Etoxaazol	13227 N	10b	50 ml	1/jaar	3	werkt op de eieren larve en nimfen	
	Oberon	Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	2/teelt	n.v.o.	Aan Oberon geen hechters/uitvloeiers toevoegen, ook niet mengen met andere middelen	
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	3/jaar	3	Maximaal 0,75 ltr per toepassing per ha. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Oberon	Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	2/teelt	n.v.o.	Aan Oberon geen hechters/uitvloeiers toevoegen, ook niet mengen met andere middelen	
	Kumulus S	Zwavel	6147 N		200 gr	6/teelt		Maximaal 4 kg per ha per toepassing	
	Fungiciden								
Meeldauw	Flint	Trifloxystrobin	12289 N	11	12,5 gr	3/teelt	1	Eerst proefbespuiting, na 7-10 dagen herhalen.	
	Fado	COS- OGA	14921 N	NC		5/jaar	0	3-4 ltr/ha uitsluitend preventief toe passen, minimaal 3x spuiten	
	Fungaflassh	Imazalil	7119 N	3	200 ml	3/teelt	1	Niet in winter op jong gewas. Maximaal 3 ltr per toepassing per hectare	
	Abir	Buperimaat	6834 N	8	200 ml	6/teelt	3	Maximaal 3 bespuitingen in een blok	
	Reflect	Isopyrazam	15125 N	7	100 ml	2/jaar	1	Maximaal 1 l/ha toepassing Na 7-10 dagen herhalen	
	Ortiva	Azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	3/teelt	1	Scherp! Niet toepassen op jong gewas	
	Rocket EC	Triflumizool	13378 N	3	100 ml	5/jaar	1	Scherp! Niet voor 1 mei toepassen	
	Serenada SC	Bacillus subtilis	14536 N			9/jaar		8 liter/ ha Altijd een uitvloeier meenemen. Na 5 dagen herhalen.	
	Signum	Pyraclostrobin / Boscalid	12630 N	11	100 ml	3/teelt	1	Breedwerkende fungicide	
	Vivando	Metrafenone	14231 N	U8	30 ml	2/jaar	3	Max. 0,45 ltr/ha per toepassing.	
	Phytophthora	AAterra ME	Etridiazool	8766 N	14		2/jaar		400-800 ml/ha. In oogst gewas of na april i.v.m. scherpte
		Ranman Top	Cyrazofamide	13467 N		42 gr	6/jaar	3	600-1.200 l water per ha, eerste behandeling vanaf 5e blad, na 7-10 dagen herhalen
Previcur Energy		Propamocarb / Fosetyl	13221 N	28/33			3	Alleen op kunstmatig substraat, 3 ltr/ha.	
Botrytis	Hermosan 80 WG	Thiram	11609 N	M3				Plek op stengel of poot insmeren met papje 200 gr/1 ltr.	
	Luna Privilege	Fluopyram	13832 N	7		4/jaar	1	Druppelen 40 ml/1000 planten. Max. 1 ltr/ha. Nevenwerking op meeldauw.	
	Prestop	Gliocladium catenulatum	13413 N	NC	100 gr			Preventief toepassen, 1 kg/1000 ltr/ha. Voor- en najaar: blok van 3 toepassingen. Interval 2 weken. Stengelbehandeling.	
	Scala	Pyrimethanil	11555 N	9	100 ml	2/teelt	1	Stengelbehandeling.	
	Signum	Pyraclostrobin / Boscalid	12630 N	11	100 gr	3/teelt	1		
	Switch	Fludioxonil / Cyprodinil	12819 N	12/9	80 gr	3/jaar	3	Stengelbehandeling. Max. 1 kg/ha/toepassing.	
	Rovral aquaflo	Iprodion	8928 N	2	50 ml	5/teelt	3	Opgebruiktermijn 5-6-2018	
	Teldor	Fenhexamide	12130 N	17	100 gr		1		
	Prolectus	Fenpyrazamine	14453 N	17	80-120 gr	3/teelt	1	Interval min. 10 dagen. Preventief toepassen. Maximaal 1,2 kg per toepassing per hectare	
	Thiram Granulfo	Thiram	10172 N	M3				Plek op stengel of poot insmeren met papje 200 gr/1 ltr.	
Sclerotinia	Rovral aquaflo	Iprodion	8928 N	2	50 ml	5/teelt	3	Opgebruiktermijn 5-6-2018	
Rhizoctonia	Rovral aquaflo	Iprodion	8928 N	2	50 ml	5/teelt	3	Opgebruiktermijn 5-6-2018	
Pythium	AAterra ME	Etridiazool	8766 N	14	50 ml			400-800 ml/ha. In oogst gewas of na april i.v.m. scherpte	
	Previcur Energy	Propamocarb / Fosetyl	13221 N	28/33			3	Alleen op kunstmatig substraat, 3 ltr/ha.	
	Proplant	Propamocarb-hydrochloride	12918 N	28			3	Alleen op kunstmatig substraat, 1-2 ltr/ha.	
Wondbehandeling	Scania vital silica							Wond uitsnijden en ruim insmeren.	
	Scomid Aerosol	Imazalil	13284 N	3				0,5 tot 1 seconde op de wond spuiten, niet op blad.	
	Thiram Granulfo	Thiram	10172 N	M3				Plek op stengel of poot insmeren met papje 200 gr/1 ltr.	

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

n.v.o. = niet op de dag voor de oogst

Indeling insecticiden (IRAC)

- 1) carbamaten
- 3) pyrethroiden
- 4) neonicotinen
- 5) spinosyns
- 6) avermectinen
- 7) pyriproxyfen
- 9) pymetrozine
- 10) thiazolidines
- 11) bacillus thuringiensis
- 12) org. tinverbindingen
- 15) pyrazoolverbindingen
- 16) buprofezin
- 17) cyromazine
- 18) diacylhydrozinen
- 21) pyridazine verbindingen
- 22) indoxacarb
- 23) ketoenolen
- 28) phthalic acid diamides
- UN) diverse

Indeling fungiciden (FRAC)

- 1) MBC - fungicides
- 2) dicarboximides
- 3) DMI - fungicides
- 4) PA - fungicides
- 5) amines
- 7) SDHI
- 8) hydroxy-(2-amino)-pyrimidines
- 9) AP - fungicides
- 11) Ool - fungicides
- 12) PP - fungicides
- 14) aromatic hydrocarbons + heteroaromatics
- 17) hydroxyanilides
- 28) carbamates
- 33) phosphonates
- 40) CAA - fungicides
- M2) inorganic
- M3) dithiocarbates and relatives
- M4) phthalimides
- M5) chloronitilides
- NC) diverse
- UB) benzophenonen

Neveneffect op natuurlijke bestrijders



- Inzetbaar in geïntegreerde teelt
- Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders
- Niet te combineren met natuurlijke bestrijders

Voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming:



* Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking.
* Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies.

* Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.
* Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.

* Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen BV deze lijst of gegevens uit deze lijst te verspreiden.