

## Zwartvruchtrot/schurft

Ook afgelopen dagen is er weer veel regen gevallen. Met het oog op de schurftbestrijding is het nu belangrijk om percelen met schurftdruk goed te blijven behandelen. Dit betreft met name de gevoelige appelrassen, op peren zonder aanwezige schurftsymptomen is er in principe weinig infectierisico. Zorg dat het gewas bedekt blijft met Captan en pak op percelen met druk terug met Score.

Wat zwartvruchtrot betreft zitten we momenteel nog steeds in de meest gevoelige periode. Met de relatief hoge temperaturen en de aanwezigheid van vocht zijn de risico's op infectie aanwezig. Zorg dat het gewas op de kritieke momenten goed bedekt is met een sterk fungicide. Op percelen met druk uit het verleden kan Switch of Bellis worden ingezet. In verband met overschrijding van het aantal residuen moet nu goed gekeken worden welke middelen nog ingezet kunnen worden, Luna Privilege kan deze week nog worden ingezet. Zie ook ons Themabericht Veiligheidstermijnen en residuen van 17 juni 2016.

<b>Bellis</b>	<b>0,80 kg/ha</b>	<b>Score</b>	<b>0,20 ltr/ha</b>
<b>Switch</b>	<b>0,80 kg/ha</b>	<b>Captan</b>	<b>1,80 kg/ha</b>
<b>Luna Privilege</b>	<b>0,15 kg/ha</b>		

## Meeldauw

De groei begint er op sommige percelen uit te gaan, wat resulteert in het afsluiten van de scheuten. Voer daarom op percelen met meeldauwdruk nu nog een bespuiting uit tegen meeldauw met een sterk middel zoals Nissodium, Topaz of Nimrod. Zo wordt al een basis gelegd voor het voorkomen van meeldauw voor volgend jaar.

<b>Topaz</b>	<b>0,25 ltr/ha</b>
<b>Nissodium</b>	<b>0,50 ltr/ha</b>
<b>Nimrod</b>	<b>0,50 ltr/ha (alleen toegelaten in appel)</b>

## Perenbladvlo

Waar het nodig was is op de meeste percelen de tweede behandeling met Movento uitgevoerd. Door de regen die de afgelopen tijd gevallen is, valt het niet altijd mee om te beoordelen hoe dit heeft uitgepakt. Nu er richting eind van de week hogere temperaturen en droger weer wordt voorspeld kunnen we dit beter gaan beoordelen. Feit is dat er op veel percelen toch wat plak is doorgekomen. Door de inzet van een uitvloeier of een hoge dosering Bitterzout kan de plak worden bestreden. Waar nog veel eitjes voorkomen kan nu gekozen worden voor een behandeling met Mancozeb, dit heeft een uitdrogend effect op zowel eitjes als jonge larven.

<b>Pronet Alfa</b>	<b>1,00 ltr/ha</b>
<b>Tridex/Dithane</b>	<b>2,00 kg/ha</b>
<b>Bitterzout</b>	<b>10 – 15 kg/ha</b>

## Fruitmot

Met het oog op de vangsten van de afgelopen tijd is het advies om in appelpercelen uiterlijk deze week de eerste keer Coragen in te zetten tegen fruitmot. Op perenpercelen (Conference) kan nog circa twee weken worden gewacht. Houd ook bij Coragen rekening met de aanwezigheid van residu tijdens de oogst.

Waar feromoonverwarring is aangebracht hoeven er bij percelen met een lage historie nog geen aanvullende bespuitingen te worden uitgevoerd.

**Coragen 0,175 ltr/ha**

## Bladbemesting

Zorg voor voldoende aanvoer van de verschillende elementen, zeker nu het gewas nog groeit en er nog actieve opname is.

Element	Merksnaam	Dosering*		Merksnaam	Dosering*
Stikstof	Ureum	3,00 – 5,00 kg			
IJzer	DCM Olega Fer	1,00 – 2,00 ltr			
Magnesium	Bitterzout	3,00 – 5,00 kg	of	Mag 500	4,00 ltr
Mangaan	Mangaan 500	0,50 ltr	of	Mangaannittraat	0,50 ltr
Calcium	Calcimax	4,00 ltr	of	AMX Ca	2,50 ltr

*\*alle gegeven doseringen zijn per hectare boomgaard*

## Onkruidbestrijding

Indien nodig kan deze week nog een ronde worden gemaakt met glyfosaat om het aanwezige onkruid te bestrijden. Rondom de langste dag keert de sapstroom in de boom zich om, vanaf dat moment is het beter om weg te blijven met glyfosaat. Voeg een groeistof toe aan deze bespuiting om een zo breed mogelijk effect te behalen. Houd er rekening mee dat van vrijwel alle merken glyfosaat en groeistoffen tegenwoordig nog maar één toepassing per jaar is toegestaan.

**Glyfosaat 3,00 ltr/ha**

**2 – 4 D 2,00 ltr/ha**

**M.C.P.A. 1,80 ltr/ha**

## Overbemesting

We gaan nu richting het moment waarop een overbemesting kan worden toegepast. Zeker doordat de bodem nu voldoende vochtig is, kan ervoor gekozen worden om dit deze week te doen. Lees ons Themabericht Bemesting van 11 februari 2016 nog eens door voor de diverse mogelijkheden. Om te zien hoe de aanwezigheid van de verschillende elementen in de boom nu is kan een bladmonster worden geplukt, informeer hiernaar bij uw adviseur.

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltadviseur: Ronald Damme (06 - 41 74 79 79), Frank Eerland (06 - 51 25 80 78) of Hans de Man (06 - 53 86 57 48).

Onze gebruikadviezen zowel mondeling als schriftelijk, berusten op uitgebreide proefwaarnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het etiket. Copyright © Het is niet toegestaan dit bericht zonder toestemming van de onderstaande uitgevers te verveelvoudigen.