

## Perenbladvlo

Op sommige percelen zien we dat er weer jonge larven tevoorschijn komen die zorgen voor plak. Wanneer dit seizoen nog geen Vertimec Gold is ingezet, adviseren wij dit nu alsnog te doen. Voor percelen waar nog fruit hangt, moet u rekening houden met de veiligheidstermijn van 28 dagen tot de oogst. De vrijstelling van Vertimec loopt nog tot 23 oktober 2016. Vorig jaar is er na de pluk op een aantal percelen nog een zware aantasting van perenbladvlo ontstaan, wat in sommige gevallen dit jaar voor minder opbrengst heeft gezorgd. Probeer dit te voorkomen. Wanneer geen Vertimec meer kan worden ingezet, kunt u kiezen voor een bespuiting met Mancozeb of Bitterzout en uitvloeier.

<b>Mancozeb</b>	<b>2,00 kg/ha</b>
<b>Bitterzout</b>	<b>10 – 15 kg/ha</b>
<b>Pronet Alfa</b>	<b>1,00 – 1,50 ltr/ha</b>
<b>Vertimec Gold</b>	<b>0,50 ltr/ha</b> (Houd rekening met de beperkingen op het etiket!)

## Perenknopkever

De perenknopkever komt rond de tweede/derde week van september tevoorschijn om eieren te leggen in de knoppen. De kever is het best te bestrijden op warme, zonnige momenten. Wanneer u in het verleden schade heeft ondervonden van de perenknopkever, adviseren wij hier een bestrijding tegen uit te voeren. Eventueel kan een klopmonster worden genomen om te zien of de kevers aanwezig zijn.

<b>Calypso</b>	<b>0,30 ltr/ha (peer) + uitvloeier</b>
<b>Gazelle</b>	<b>0,25 kg/ha + uitvloeier</b>
<b>Admire</b>	<b>0,12 kg/ha (peer) + uitvloeier</b> (Houd rekening met de beperkingen op het etiket!)

Let op: Admire, Calypso en Gazelle hebben een veiligheidstermijn van 14 dagen en kunnen een extra residu geven op fruit wat nog aan de boom hangt.

## Afspuitschema

Wanneer u nog moet afspruiten tegen bewaarziekten, kunt u nu nog kiezen voor Safir of Serenade. Safir heeft een veiligheidstermijn van 3 dagen en mag twee keer worden ingezet.

Serenade kan het beste tussendoor of in combinatie met Safir worden ingezet om het gewas bedekt te houden. Serenade geeft geen extra residu en heeft een wachttijd van 0 dagen.

<b>Safir</b>	<b>0,45 kg/ha</b>
<b>Serenade</b>	<b>5,00 ltr/ha</b> (als toevoeging aan Safir 3,00 à 4,00 ltr/ha)

## Na oogst

Op dit moment zijn of worden de eerste percelen leeggeplukt. Na de oogst kan er gebruik gemaakt worden van de toelating van Captan tegen vruchtboomkanker (Nectria). Dit betreft twee toepassingen met een dosering van 2,50 kg per keer, minimum interval is 7 dagen. Tevens worden met deze toepassingen de plukwondjes afgedekt. Op percelen die gevoelig zijn voor Nectria kunt u ook kiezen voor een behandeling met Folicur.

<b>Captan</b>	<b>2,50 kg/ha</b>
<b>Folicur</b>	<b>Appel: 0,30 ltr/ha</b>
	<b>Peer: 0,24 ltr/ha</b>

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltadviseur: Andries Goeree (06 - 12 17 28 17), Frank Eerland (06 - 51 25 80 78) of Hans de Man (06 - 53 86 57 48).

*Onze gebruiksaanwijzingen zowel mondeling als schriftelijk, berusten op uitgebreide proefwaarnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het etiket. Copyright © Het is niet toegestaan dit bericht zonder toestemming van de onderstaande uitgevers te verveelvoudigen.*

Pagina 2 van 2