

Vertimec Gold/Perenbladvlo

Deze week is de laatste week dat Vertimec Gold nog ingezet mag worden tegen perenbladvlo, de vrijstelling vervalt per 23 oktober 2016. Wanneer nodig kunt u dus deze week nog Vertimec Gold in te zetten, maar alleen indien er dit seizoen nog geen gebruik van is gemaakt en er nu aantasting voorkomt van met name jonge larven. Blijf de percelen goed controleren op de aanwezigheid van perenbladvlo. We hebben de afgelopen dagen gezien dat er op verschillende plaatsen in een korte tijd toch nog behoorlijk wat aantasting tevoorschijn is gekomen. Met de huidige lagere temperaturen kan in plaats van uitvloeier ook gekozen worden voor het toevoegen van olie aan de Vertimec Gold bespuiting. Wanneer geen Vertimec Gold meer kan worden ingezet, kan nu nog een behandeling worden uitgevoerd met Mancozeb gecombineerd met een hoge dosering Zwavel.

Vertimec Gold	0,50 ltr/ha (let op de beperkingen op het etiket!)
Mancozeb (Tridex/Dithane)	2,00 kg/ha
Zwavel (Kumulus/Thiovit)	6,00 kg/ha

Na-oogstbespuitingen

Nu er nog behoorlijk wat blad aan de bomen zit en het nog niet te nat is om te rijden, kan de conditie van de boom en knoppen worden verbeterd door het toedienen van bladvoeding. Het advies is om Ureum 3,00 tot 5,00 kg te combineren met een zink- en boriumbladmeststof ter versterking van de knoppen. Om doorschieten van de knoppen te voorkomen is het (zeker op sterk groeiende percelen) niet verstandig om een hogere dosering Ureum te gebruiken. Voeg voor het afdekken van de plukwondjes ook Captan toe aan deze bespuiting. Op Nectria-gevoelige percelen adviseren wij Captan met Folicur toe te passen.

Ureum	3,00 – 5,00 kg/ha
Zink FL	0,50 – 1,00 ltr/ha
Borium 150	0,50 – 1,00 ltr/ha
Captan	2,50 kg/ha
Folicur	0,30 ltr/ha (appel)
	0,24 ltr/ha (peer)

Onkruid

Nu we te maken hebben met lagere temperaturen kan onkruidbestrijding plaatsvinden door middel van een toepassing met Amitrol, dat tot 30 september 2017 nog mag worden toegepast. Deze bespuiting moet bij voorkeur plaatsvinden bij een temperatuur onder de 12 graden. Het middel wordt dan goed door de plant getransporteerd waardoor deze volledig afsterft. Bij aanwezigheid van verschillende grassen kunt u er Basta of Finale 0,50 ltr aan toevoegen. Onkruidolie verbetert de opname van Amitrol.

Bij aanwezigheid van met name grassen is het middel Kerb een goed alternatief als na-oogstonkruidbestrijding. Echter kan hiermee beter nog gewacht worden tot de temperatuur ruim onder de 10 graden is gedaald.

Per ha boomgaard

Amitrol	5,00 – 8,00 ltr/ha
Kerb	1,00 kg/ha
Basta	0,50 ltr/ha (1,275 ltr/ha volle dosering)
Olie 850	0,50 – 1,00 ltr/ha

Volvels per ha zwartstrook

Amitrol	10 – 16 ltr/ha
Kerb	2,00 kg/ha
Basta	1,00 ltr/ha (3,75 ltr/ha volle dosering)
Olie 850	1,00 – 2,00 ltr/ha

Overige werkzaamheden

De boomgaard is nog goed berijdbaar. Daarom kunnen werkzaamheden als het uitrijden van champost/compost, aanaarden van (jonge) bomen en wortelsnoei in deze periode goed worden uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltadviseur: Andries Goeree (06 - 12 17 28 17), Frank Eerland (06 - 51 25 80 78) of Hans de Man (06 - 53 86 57 48).

Onze gebruiksaanwijzingen zowel mondeling als schriftelijk, berusten op uitgebreide proefwaarnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het etiket. Copyright © Het is niet toegestaan dit bericht zonder toestemming van de onderstaande uitgevers te verveelvoudigen.