

Ontwikkeling

Sinds eind vorige week zijn de weersomstandigheden veranderd, de temperatuur is omhoog gegaan. Ook de komende dagen wordt warmer weer voorspeld met temperaturen tussen de 12 en 15 graden. Deze hogere temperaturen in combinatie met zonneschijn heeft sterke invloed op de ontwikkeling van de knoppen. We zien dat ze nu volop in beweging zijn, met op veel plaatsen al de eerste zichtbare groene delen. Met deze weersomstandigheden wordt ook de berijdbaarheid van de boomgaard snel beter. Zorg ervoor dat zodra er gereden kan worden u ook de bemestingsronde uitvoert. Ook de eerste bespuiting moet deze week uitgevoerd worden, dit betreft de bestrijding van perenpok, perenbladvlo en de appelbloesemkever.

Perengalmijt

Wanneer de knoppen gaan schuiven wordt de perengalmijt actief. Dit is het moment dat u zwavel moet inzetten. Wanneer de perengalmijt niet of te laat wordt bestreden kan dit aantasting van perenpok veroorzaken. Kies een moment uit waarop de temperatuur relatief hoog is, dan is de perengalmijt het meest actief. Nu we wat warmere dagen achter elkaar krijgen is het belangrijk een goed zonnig moment uit te kiezen. Herhaal de bespuiting voor een optimale bestrijding.

**Kumulus 3,00 kg/ha met veel water op een warme dag (+ uitvloeier)
6,00 kg/ha met veel water op een koude dag**

Perenbladvlo

De afgelopen weken hebben we op diverse percelen al behoorlijk wat eitjes gezien van de perenbladvlo. Met de hogere temperaturen zal de ontwikkeling sneller doorgaan. Kijk dus goed hoe de situatie in uw boomgaard is, zodat u tijdig een eerste bespuiting in kunt plannen. Wanneer de druk in het afgelopen jaar hoog was kan gekozen worden voor het inzetten van Surround. Dit middel zorgt ervoor dat er geen of minder eieren gelegd worden. Surround werkt het beste als het weer niet al te wisselvallig is, zodat het middel niet te snel afspoelt.

Voor een optimale bestrijding met Surround is het belangrijk dat de bestrijding herhaald wordt, voer de bespuiting minimaal 3 keer uit.

Surround 1e keer 30 kg/ha, daarna twee of drie keer herhalen met 20 kg/ha

Een andere manier om al vroeg een bestrijding tegen perenbladvlo uit te voeren is door middel van het inzetten van minerale olie. De werking van olie berust op het feit dat door het bedekken van de eitjes de ei-uitkomst wordt voorkomen. Laat de dosering van olie afhangen van de druk in het afgelopen jaar en de hoeveelheid eitjes die momenteel aanwezig zijn. Wanneer er groene delen zijn, kan er wat schade ontstaan door deze bespuiting met olie, houd hier rekening mee.

Minerale olie 30 ltr/ha, toepassen met veel water

Schurft

De eerste schurftsporen zijn intussen gevangen. De verwachting is dat met de eerst volgende regenbui een eerste echte sporenuitstoot plaatsvindt. Er zijn inmiddels infecteerbare groene delen. Deze moeten bedekt zijn met fungicide voor de eerstvolgende regen. Op de schurftbestrijding zullen we in de volgende berichten terugkomen.

Verre bestemmingen

Afgelopen week hebben onze adviseurs deelgenomen aan een voorlichtingssessie over export van Nederlands fruit naar verre bestemmingen. Dit betreft onder andere China, Brazilië en Vietnam. Wanneer u besluit om dit jaar voor een van deze bestemmingen te telen kunnen wij u hierin begeleiden gedurende het seizoen, onze adviseurs zijn hiervoor bevoegd en staan voor u klaar!

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltadviseur: Andries Goeree (06 - 12 17 28 17), Frank Eerland (06 - 51 25 80 78) of Ronald Damme (06 - 41 74 79 79).

Onze gebruikadviezen zowel mondeling als schriftelijk, berusten op uitgebreide proefwaarnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het etiket. Copyright © Het is niet toegestaan dit bericht zonder toestemming van de onderstaande uitgevers te verveelvoudigen.