

Vruchtboomkanker/Nectria

Afgelopen weekend heeft het stevig gewaaid, hierdoor zijn er veel bladeren van de bomen gewaaid. De afgewaaid bladeren laten een wondje na, wat een invalspoort kan zijn voor Nectria. Zorg ervoor dat de nieuw ontstane wondjes tijdig worden afgedekt om de infectiekansen zo klein mogelijk te houden. Bedek de wondjes met een preventieve fungicide zoals Captan en/of Folicur. Ook van reeds toegepaste koperbladmeststoffen mag een preventieve werking worden verwacht, behalve van het ontbladeringsmiddel Cul-900. Daarnaast kunt u beregenen met Neccal.

Van oudsher is er de regel om bij 10%, 50% en 90% bladval het gewas preventief af te dekken met een fungicide. Bekijk voor actuele infectiekansen en sporenvorradaad het Neonectria-model op:

[http://www.dewitteagro.nl/weerpalen-\(modellen\)#inloggen](http://www.dewitteagro.nl/weerpalen-(modellen)#inloggen) onder het tabblad Vruchtboomkanker.

Wanneer u wonden heeft gemaakt of oude kankers heeft weg gefreesd kunt u de verse wond afstrijken met BlocCade. Dit middel legt een dunne filmlaag over de wond, waardoor de Nectria-schimmel zich niet kan vestigen.

Advies:

Captan	2,50 kg/ha	(max. 2 maal per seizoen, interval 7 dagen)
Folicur	Appel: 0,30 ltr/ha Peer: 0,24 ltr/ha	
Cuforte	2,00 – 3,00 ltr/ha	(vanaf deze dosering een goede nevenwerking)
Koperoxychloride	3,00 – 5,00 kg/ha	(vanaf deze dosering een goede nevenwerking)
Neccal	150 ltr/ha	(oplossen in min. 500 ltr water)
BlocCade	10%	(oplossing voor smeertoepassing)

Onkruid

De komende week wordt er droog weer voorspeld. Deze mogelijkheid kan benut worden om bijvoorbeeld onkruid te bestrijden. Deze bespuiting moet bij voorkeur plaatsvinden bij een temperatuur onder de 12 graden, het middel wordt dan goed door de plant getransporteerd waardoor deze volledig afsterft. Bij aanwezigheid van verschillende grassen kunt u er 0,50 ltr Basta of Finale aan toevoegen. Onkruidolie verbetert de opname van Amitrol.

Bij aanwezigheid van met name grassen is het middel Kerb een goed alternatief als naooft onkruidbestrijding. Echter kunt u hiermee beter wachten tot de temperatuur ruim onder de 10 graden is gedaald.

Advies per hectare boomgaard:

Amitrol	5,00 – 8,00 ltr/ha	
Kerb	1,00 kg/ha	
Basta	0,50 ltr/ha	(1,275 ltr/ha volle dosering)
Olie 850	0,50 – 1,00 ltr/ha	

Advies Volvelds per hectare zwartstrook:

Amitrol	10 – 16 ltr/ha	
Kerb	2,00 kg/ha	
Basta	1,00 ltr/ha	(3,75 ltr/ha volle dosering)
Olie 850	1,00 – 2,00 ltr/ha	

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltadviseur: Andries Goeree (06 - 12 17 28 17), Frank Eerland (06 - 51 25 80 78) of Hans de Man (06 - 53 86 57 48).

Onze gebruikadviezen zowel mondeling als schriftelijk, berusten op uitgebreide proefwaarnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het etiket. Copyright © Het is niet toegestaan dit bericht zonder toestemming van de onderstaande uitgevers te verveelvoudigen.