



Spruitkoolbericht

13 oktober 2016, nr. 23

Op de meeste percelen spruitkool zijn de spruiten de afgelopen weken weinig gegroeid. Door de droge herfst zijn veel percelen in groei geremd en hangen aan de spruitstammen fijnere spruiten dan normaal rond dit tijdstip. Op dit moment worden nog vooral Steadia, Neptuno en Martinus getopt om toch nog wat te forceren om eerder grovere spruitkool te krijgen. Overbemesting is per situatie verschillend, dit hangt af van het toppen en het moment waarop er bladval ontstaat of gele blaadjes beginnen te ontwikkelen.

Insectendruk

We zien op dit moment weinig activiteit meer van insecten. Gezien de daling van de temperatuur, is het nu doorgaans niet meer nodig om nog een insectenbestrijding uit te voeren. De koolmotdruk is nu voorbij en de tripsituatie is op de meeste percelen redelijk onder controle. Tripsen die nu nog aanwezig zijn in een perceel zitten goed verstopt onder de lobbladeren van het spruitje. De inzet van een insecticide zal dan ook weinig effect meer hebben, omdat de tripsen niet geraakt worden. De druk van de koolvlieg is ook minder geworden: alleen na veel waterval/beregenen zagen we de afgelopen twee weken soms een kleine opleving. U kunt eventueel een pyrethroïde toepassen om de koolvlieg te reduceren, maar op de meeste percelen is dit niet meer van toepassing.

Een uitzondering op de lage insectendruk is luis/witte vlieg. Op een aantal percelen vinden we perzikluis op de spruit of wat melige koolluis in de kop aangevuld met soms ook witte vlieg. Gebruik in deze gevallen nog Calypso. Het toevoegen van Decis aan de bespuiting met Calypso zorgt voor een betere uitvloeiing. Advies (indien nodig):

Calypso 0,25 ltr/ha + Decis 0,30 ltr/ha

- Calypso etiket: maximaal twee keer per teelt en veiligheidstermijn zeven dagen.
- Decis etiket: maximaal drie keer per teelt en veiligheidstermijn zeven dagen.

In plaats van Decis kunt u ook kiezen voor Karate Zeon/Sumicidin Super. Als het de laatste bespuiting is, heeft Decis de voorkeur ter voorkoming van residu.

Schimmelbestrijding

Op dit moment is de schimmeldruk in spruitkool normaal. We zien met name wat echte meeldauw en een verdwaalde stip Light Leaf Spot (LLS). Houd in oktober nog wel het spuitschema gesloten, zeker om de uitbreiding van LLS te voorkomen. We vinden al geruime tijd LLS in de vroege plantingen, maar door de droge weersomstandigheden in combinatie met gerichte inzet van fungiciden lijkt de situatie beter onder controle dan afgelopen seizoen. Houd het spuitinterval in oktober op drie weken, en richt de bestrijding op LLS plus echte meeldauw, alternaria en mycosphaerella. Gebruik hiervoor Rudis of gebruik als alternatief Signum.

De druk van de oömyceetschimmels, valse meeldauw en witte roest is ook laag. Probeer de laatste inzet van Folio Gold richting eind oktober toe te passen.



Slakken

De druk van slakken is de gehele nazomer stabiel. Dit komt door het relatief droge weer, wat ongunstig is voor slakken. Begin oktober is in veel gebieden regen gevallen, wat zorgt voor een vochtige ondergrond. Controleer uw percelen op slakken, zeker nu de omstandigheden voor slakken weer gunstiger worden. Strooi indien nodig slakkenkorrels. Advies:

Sluxx 7,00 kg/ha

Dit spuitkoolbericht is een gezamenlijke uitgaven van Van Iperen en Mol Agrocom. Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.