

Chrysant spuitadvieslijst



Uitgave oktober 2018

Plaaig/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toef.nr.	Groep	Spuiten /100 ltr.	Maximaal aantal toepassingen	Opmerkingen	
Insecticiden en acariciden								
Bladluis	Tepeki	Fonicamid	12757 N	9c	14 gr	3/jaar	Maximaal 2x per teelt i.v.m. resistentie, interval min. 21 dgn	
	Plenum 50 WG	Pymetrozine	12491 N	9b	20 gr		Resistentieontwikkeling mogelijk, interval min. 7 dgn. Opgebruikstermijn W2 1-7-2019	
	NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	26	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval min. 7 dgn binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op; advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
	Movento OD	Spirotetramat	13404 N	23	0,5 ltr/ha	2/jaar	2 toep. per teeltcyclus of per jaar, max. 0,5L/ha per toepassing, interval min. 14 dgn.	
	Raptol	Pyrethrinen	13230 N	4	1000 ml		Interval min. 7 dgn	
	Calypso	Thiacloprid	12452 N	4	25 gr	3/jaar	Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Maximaal 0,25 lha/keer. Interval min. 7 dgn tussen de behandelingen.	
	Gazelle	Acetameprid	12809 N	4	25 gr		Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
	Pirimor sp.k.	Pirimicarb	5794 N	1a	50 gr	2/jaar	Opgebruikstermijn W4 1-7-2019	
	Pirimor 3G	Pirimicarb	15083 N	1a			Werkt niet tegen alle soorten luizen, maximaal 0,5 kg/ha. Interval min. 7 dgn. Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
	Actara	Thiamethoxam	12679 N	4	10 gr	2/jaar	Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
	Admire	Imidacloprid	11483 N	4	10 gr	5/jaar	Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Opgebruikstermijn W6 1-7-2019 . Zo nodig na 7-10 dgn herhalen.	
	Kohinor 700 WG	Imidacloprid	13831 N	4	10 gr	5/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval min. 7 dgn, druppelen 3,5gr/1.000planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/heel	Maximaal 0,10 kg/ha, interval min. 7 dgn, druppelen 3,5gr/1.000planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
Sumicidin Super	Esenvalerat	10211 N	3	50 ml		Interval 7 dgn. Maximaal 0,5 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha Foggen 100ml/1.000m². Opgebruikstermijn W15 & W16 1-7-2019		
Mineervlieg	NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	26	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval min. 7 dgn binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op; advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
	Raptol	Pyrethrinen	13230 N	4	1500 ml		Interval min. 7 dgn	
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,5 ltr/ha, interval min. 7 dgn, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,5 ltr/ha, interval min. 7 dgn, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
	Milbeknock	Milbecine	12364 N	6	100 ml	9/jaar	Maximaal 3 blokken van 3 besputtingen, interval tussen besputting min. 7 dgn, interval tussen blokken min. 28dgn	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/heel	Interval 7 dgn. Maximaal 0,5 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha, foggen 50ml/1.000m²	
	Sumicidin Super	Esenvalerat	10211 N	3	50 ml		Foggen 100ml/1.000m². Opgebruikstermijn W15 & W16 1-7-2019	
Rups	Runner	Methoxyfenozide	12696 N	18	40 ml			
	Deffly	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	10944 N	11	50-62,5 gr	3/jaar	Maximaal 0,75 kg/ha per toepassing, interval min. 7 dagen. Let op pH gevoelig!	
	DiPel DF	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	14674 N	11	100-200 gr	8/jaar	Maximaal 1 kg/ha per toepassing, interval min. 7 dgn, sterk in combinatie met Noctum	
	Turex 50 WP	Bacillus thuringiensis	11702 N	11	50-100 gr	6/jaar	Maximaal 1 kg/ha per toepassing, interval min. 7 dgn. Let op pH gevoelig!	
	Xantari	Bacillus thuringiensis	12437 N	11	100 gr	8/jaar	Maximaal 1,2 kg/ha per toepassing, interval min. 5dgn. Let op pH gevoelig! Opgebruikstermijn W1 1-5-2018	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/heel	Interval 7 dgn. Maximaal 0,5 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha, foggen 50ml/1.000m²	
	Sumicidin Super	Esenvalerat	10211 N	3	50 ml		Foggen 100ml/1.000m². Opgebruikstermijn W15 & W16 31-12-2018	
	Wittevlieg	Admiral	Pyriproxyfen	11829 N	7	25 ml	5/jaar	Maximaal 1x per teeltcyclus en maximaal 5x per jaar. Maximaal 0,25 ltr/ha
Botanigard WP	Beauveria bassiana	12612 N	1	62,5 gr	25/jaar	Interval min. 5 dgn, maximaal 0,75 kg/ha, in blokken van 3-4 besputtingen. Let op met Fungiciden -> interval fungicidenbehandeling min. 7 dagen!		
Botanigard vib	Beauveria bassiana	12611 N	1	125 ml	25/jaar	Interval min. 5 dgn, maximaal 1,5 l/ha, in blokken van 3-4 besputtingen. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling min. 7 dagen!		
PreFaRa	Paeclomyces fumosoroseus	12694 N	1	100 gr		Insecticide op basis van schimmelsporen. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling min. 7 dagen! Opgebruikstermijn W0 1-7-2019		
Mycotal	Lecanicillium muscarium	10980 N	1	100 gr	24/jaar	Maximaal 2 kg/ha per toepassing, interval min. 7dgn. Alleen tegen larven Addit (250ml) toevoegen voor betere werking. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling min. 3 dagen!		
NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	26	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval min. 7 dgn binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op; advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.		
Match	Lufenuron	12821 N	15	150 ml	4/jaar	2x van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,2 ltr/ha, interval tussen besputting min 14 dgn		
Plenum 50 WG	Pymetrozine	12491 N	9b	60 gr		2x van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,5 ltr/ha, interval tussen besputting min 14 dgn		
Raptol	Pyrethrinen	13230 N	4	1500 ml		Resistentieontwikkeling mogelijk, interval min. 7 dgn		
Calypso	Thiacloprid	12452 N	4	25 gr	3/jaar	Interval min. 7 dgn		
Gazelle	Acetameprid	12809 N	4	25-50 gr		Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Maximaal 0,25 lha/keer. Interval min. 7 dgn tussen de behandelingen.		
Actara	Thiamethoxam	12679 N	4	40 gr		Let op verscherpte lozingsvoorschriften!		
Admire	Imidacloprid	11483 N	4	10 gr	5/jaar	Opgebruikstermijn W6 1-7-2019 , Zo nodig na 7-10 dgn herhalen.		
Kohinor 700 WG	Imidacloprid	13831 N	4	10 gr	5/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval min. 7 dgn, druppelen 14gr/1.000planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden.		
Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/heel	Maximaal 0,10 kg/ha, interval min. 7 dgn, druppelen 14gr/1.000planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden.		
Sumicidin Super	Esenvalerat	10211 N	3	50 ml		Let op verscherpte lozingsvoorschriften!		
Trips	Nemasys F	Steinernema feltiae	1	1	1		Interval 7 dgn. Maximaal 0,5 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha, foggen 50ml/1.000m² Foggen 100ml/1.000m². Opgebruikstermijn W15 & W16 1-7-2019	
Mycotal	Lecanicillium muscarium	10980 N	1	100 gr	24/jaar	Spuiten: 125-250 miljoen/1.000m². Voor meer informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur.		
NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	26	250 ml	18/jaar	Maximaal 2 kg/ha per toepassing, interval min. 7dgn. Alleen tegen larven Addit (250ml) toevoegen voor betere werking. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling min. 3 dagen!		
Azatin	Azadirachtine a.	14936 N	26	140 ml	20/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval min. 7 dgn binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op; advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.		
Botanigard WP	Beauveria bassiana	12612 N	1	62,5 gr	25/jaar	Maximaal 1,4 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken, interval tussen besputting min. 7dgn, interval tussen een blok min. 42 dgn. Let op pH tussen 5 en 7		
Match	Lufenuron	12821 N	15	150 ml	4/jaar	Interval min. 5 dgn, maximaal 0,75 kg/ha, in blokken van 3-4 besputtingen. Let op met Fungiciden -> interval fungicidenbehandeling min. 7 dagen!		
Movento OD	Spirotetramat	13404 N	23	0,5 ltr/ha	2/jaar	2x van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,2 ltr/ha, interval tussen besputting min 14 dgn		
Raptol	Pyrethrinen	13230 N	4	1000 ml		2x van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,5 ltr/ha, interval tussen besputting min. 14 dgn		
Fipper	Vetzuren, kaliumzouten	1	1	1-2%		2 toep. per teeltcyclus of per jaar, max. 0,5L/ha per toepassing, interval min. 14 dgn.		
Conserve	Spinosad	12363 N	5	75 ml	6/jaar	Interval min. 7 dgn		
Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	8/jaar	Interval min. 7dgn, max. 3 besputtingen per blok, pH water min. 7 of hoger		
Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	8/jaar	Resistentievoelig, in blok besputting van 2-3 toepassingen met een interval tussen besputting min. 7 dgn		
Winner	Formetanfaat	14958 N	1a	30 gr	20/jaar	Maximaal 0,5 ltr/ha, interval min. 7 dgn, zie etiket voor toepassingvoorwaarden		
Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/heel	Maximaal 0,3 kg per toepassing per hectare. Maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus. Let op pH tussen 5-6, zie etiket voor toepassingvoorwaarden		
Sumicidin Super	Esenvalerat	10211 N	3	50 ml		Interval 7 dgn. Maximaal 0,5 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha, foggen 50ml/1.000m² Foggen 100ml/1.000m². Opgebruikstermijn W15 & W16 31-12-2018		
Spint	Apollo	Chlofentezin	8794 N	10a	30 ml		Minimaal 450 ml/ha gebruiken, werkt alleen tegen ei en jonge larve. Resistentievoelig. Opgebruikstermijn W7 1-5-2018	
	Cantack	Acequinocyl	12939 N	20b	100 ml		Maximaal 3 blokken van 3 besputtingen	
	Floramite	Bifenazaat	12421 N	un	40 ml	4/jaar	2x per blok, maximaal 0,6 ltr/ha. Let op pH gevoelig tussen 5-6!	
	NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	26	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval min. 7 dgn binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op; advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
	Nissorun vib.	Haxythiazox	10379 N	10a	20 ml	12/jaar	Maximaal 1,4 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken, interval tussen besputting min. 7dgn, interval tussen een blok min. 42 dgn. Let op pH tussen 5 en 7	
	Movento OD	Spirotetramat	13404 N	23	0,5 ltr/ha	2/jaar	Interval min. 5 dgn, maximaal 0,75 kg/ha, in blokken van 3-4 besputtingen. Let op met Fungiciden -> interval fungicidenbehandeling min. 7 dagen!	
	Scelta	Cyflumetofen	13440 N	25	100 ml	4/jaar	2x van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,2 ltr/ha, interval tussen besputting min 14 dgn	
	Raptol	Pyrethrinen	13230 N	4	1000 ml		2x van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,5 ltr/ha, interval tussen besputting min. 14 dgn	
	Envirdor	Spirodiclofen	12477 N	23	40 ml	2/heel	2 toep. per teeltcyclus of per jaar, max. 0,5L/ha per toepassing, interval min. 14 dgn.	
	Borneo	Etoxazole	13227 N	10b	50 ml	1/heel - 4/jaar	Interval min. 7 dgn	
	Oberon	Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	2/heel	Let op pH 5-7! 2x per blok	
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	25 ml	8/jaar	Geen uitvoeler toevoegen of andere hulpstoffen. Niet mengen met andere middelen. In de zomerperiode (snelle droging) kans op schade	
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	25 ml	8/jaar	Maximaal 0,5 ltr/ha, interval min. 7 dgn, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
	Milbeknock	Milbecine	12364 N	6	50 ml		Maximaal 0,5 ltr/ha, interval min. 7 dgn, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
	Carex 10 SC	Pyridaben	14836 N	21	140 ml	1/jaar	Maximaal 3 blokken van 3 besputtingen, interval tussen besputting min. 7 dgn, interval tussen blokken min. 28dgn	
	Fungiciden						Max. 1,9L/ha per toepassing	
	Meeldauw	Flint	Trifloxystrobin	12289 N	11	12,5 gr	3/heel	Interval 7-10 dgn. Maximaal 33% van de besputtingen indien gespoten als solo product of maximaal 50% van de besputtingen indien gespoten in combinatie met een ander fungicide (geen strobilurine)
		Ortiva	Azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	4/heel	Maximaal 3 blokken van 3 besputtingen
Luna Privilege		Fluopyram	13832 N	7	50 ml	2/jaar	2x per blok, maximaal 0,6 ltr/ha. Let op pH gevoelig tussen 5-6!	
Japane roest	Flint	Trifloxystrobin	12289 N	11	12,5 gr	3/heel	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval min. 7 dgn binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op; advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
	Kenbyo	Kresoxim-methyl	11841 N	11	100 ml		6 blokken van 2 toepassingen, werkt alleen op ei en larve. Max 0,2 ltr per toepassing per ha.	
	Ortiva	Azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	4/heel	2 toep. per teeltcyclus of per jaar, max. 0,5L/ha per toepassing, interval min. 14 dgn.	
	Collis	Kresoxim-methyl / boscalid	12504 N	11/7	150 ml	5/jaar	2x per blok, interval min. 7 dgn. Maximaal 1 ltr per toepassing per hectare	
	Inssimo	Acbenzolar-S-methyl	14882 N	P1	5 gr	6/jaar	Interval min. 7 dgn	
	Daconil 500 vib.	Chlorothalonil	7827 N	M5	300 ml	2/jaar	Let op pH 5-7! 2x per blok	
	TriDex DG	Miancozeb	10560 N	M3	300 gr		Geen uitvoeler toevoegen of andere hulpstoffen. Niet mengen met andere middelen. In de zomerperiode (snelle droging) kans op schade	
	Penoxozab SC	Miancozeb	10274 N	M3	480 ml		Maximaal 0,5 ltr/ha, interval min. 7 dgn, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
	Vondac DG	Miancozeb	10602 N	M3	300 gr		Maximaal 0,5 ltr/ha, interval min. 7 dgn, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
	Ridomil Gold	Metaxyl-M	12281 N	4			Maximaal 3 blokken van 3 besputtingen, interval tussen besputting min. 7 dgn, interval tussen blokken min. 28dgn	
Phytophthora	Rovral Aquaflor	Iprodion	8928 N	2	100 ml		Maximaal 3 ltr per toepassing per hectare, toepassen in maximaal 1000 l spuitvoelstof/ha. Via proefbesputting vaststellen of het middel gewasveilig is.	
	Switch	Fludioxonil / cyprodinil	12819 N	9/12	80 gr		Maximaal 3 ltr per toepassing per hectare, toepassen in maximaal 1000 l spuitvoelstof/ha. Via proefbesputting vaststellen of het middel gewasveilig is.	
	Signum	Pyraclostrobin/ Boscalid	12630 N	11/7	100 gr		Maximaal 3 ltr per toepassing per hectare, toepassen in maximaal 1000 l spuitvoelstof/ha. Via proefbesputting vaststellen of het middel gewasveilig is.	
	Tekdor	Fenhexamide	12130 N	17	100 gr		Maximaal 1,5 kg/ha	
	Frupica SC	Mepanipyrim	12229 N	9	90 ml	2/heel	Maximaal 0,9 ltr/ha (advies gebruik uitvoeler). Wanneer een uitvoeler toegevoegd wordt via proefbesputting vaststellen of het middel gewasveilig is.	
	Topasin M Ultra	Thiofanat-methyl	7211 N	1	140 ml	2/heel	Besputting zonodig na 10-14 dgn 1x herhalen	
	Phythium	Fenamidone / Fosetyl-aluminium	12824 N	11/33	3 gr/m2		Bedeekte teelt met drainage en recirculatie, direct na planten 1x 3 gr of 3x 1 gr/m2	
	Ridomil Gold	Metaxyl-M	12281 N	4	1,9 ltr/ha		Licht naregenen, resistentie gevoelig. Maximaal 2 keer per jaar toepassen.	
Rhizoctonia	Rovral Aquaflor	Iprodion	8928 N	2	200 ml	2/heel	Opgebruikstermijn 5-6-2018	
	Signum	Pyraclostrobin/ Boscalid	12630 N	11/7	100 gr	2/heel	Maximaal 1,5 kg/ha	
	Montego	Pencycuron	14926 N	20	10 ltr/ha	1/jaar	Aangietbehandeling	
	Rizolex	Tolclofos-methyl	11098 N	14	3,2 ml/m2		Grondbehandeling voor planten.	

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1a) carbamaten	1) MBC - fungicides
1b) org. fosforverbindingen	2) dicarbonylides
3) pyrethroiden	3) DMI - fungicides
4) neonicotinen	4) PA - fungicides
5) spinosyns	5) amines
6) avermectinen	7) SDHI
7) pyriproxyfen	8) hydroxy-(2-amino)-pyrimidines
9) pymetrozine	9) AP - fungicides
10) thiazolidines	11) Ool - fungicides
11) bacillus thuringiensis	12) PP - fungicides
12) org. tinverbindingen	14) aromatic hydrocarbons + heteroaromatics
	17) hydroxanilides
	28) carbamates
	33) phosphonates
	40) CAA - fungicides
	M2) inorganic
	M3) dithiocarbates and relatives
	M4) phthalimides
	M5) chloronitris
	NC) diverse

Neveneffect op natuurlijke bestrijders

 </
--