

# Potplanten spuitadvieslijst

Uitgave januari 2019

Plag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel.nr.	Groep	Spuiten per 100 ltr	Max aantal toepassingen	Opmerkingen	
<b>Insecticiden en acariciden</b>								
Bladluis	Teppeki	Flonacimid	12757 N	9c	14 gr	3/jaar	Maximaal 2x per teelt i.v.m. resistentie. Interval minimaal 21 dagen	
	Tafari	Pymetrozine	15583 N	9c	20 gr	2/jaar	Maximaal 0,24 kg/ha/toepassing. Maximaal 2,16 kg/ha/jaar	
	Plenum WG50	Pymetrozine	12491 N	9b	20 g		Resistenteontwikkeling mogelijk. Interval minimaal 7 dagen. <b>Opgebruikstermijn W.2 1-7-2019.</b>	
	NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12445 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputingen. Interval minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.	
	Azatin	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 gr	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen besputing minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen.	
	Okos	Azadirachtin	15729 N	UN	100 - 120 ml	5/jaar	Maximaal 1,2 ltr/ha/toepassing. Interval minimaal 7 dagen	
	Raptol	Pyrethrinen	13230 N	3	1000 ml		Interval minimaal 7 dagen	
	Sivanto Prime	Flupyradifuron	15598 N	4d	50 ml	6/jaar	Maximaal 0,75 ltr/ha/toepassing. Maximaal 4,50 ltr/ha/jaar	
	Closer	Sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	2/jaar	Maximaal 0,20 ltr/ha/toepassing. Maximaal 0,40 ltr/ha/jaar. Interval minimaal 7 dagen.	
	Calypso	Thiacloprid	12452 N	4a	25 ml	3/jaar	Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Maximaal 0,25 ltr/ha/keer. Interval minimaal 7 dagen tussen de behandelingen. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
	Batavia	Spirotramat	15615 N	23	75 ml	6/jaar	Maximaal 0,90 ltr/ha/toepassing. Interval minimaal 14 dagen.	
	Gazelle	Acetamiprid	12809 N	4a	25 gr		<b>Opgebruikstermijn W.4 1-7-2019</b>	
	Pediment	Primicarb	15584 N	1a	50 gr	2/jaar	Maximaal 0,50 kg/ha/toepassing. Werk niet tegen alle soorten luizen.	
	Primor	Primicarb	5794 N	1a	50 gr	2/jaar	Werk niet tegen alle soorten luizen. Maximaal 0,50 kg/ha. Interval minimaal 7 dagen. Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften! <b>Alleen W.8 etiket roe te gebruiken tot 23-8-2019. Vervolgens Pediment aan gebruiken.</b>	
	Pediment Rookontwikkelaar	Primicarb	5793 N	1a		2/jaar	1 rookontw. per 400 m <sup>2</sup> . temp. > 22 C, maximaal 25 st/ha, interval minimaal 10 dagen, werkt niet tegen alle soorten luizen. Opgebruikstermijn W.6 etiket 23-9-2019	
Actara	Thiamethoxam	12679 N	4a	10 gr	3/jaar	<b>Opgebruikstermijn W.6 1-7-2019.</b> Zo nodig na 7-10 dagen herhalen.		
Admir	Imidacloprid	11483 N	4a	10 gr	5/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval min. 7 dagen, druppelen 3,5gr/1.000planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!		
Kohlor	Imidacloprid	13831 N	4a	10 gr	2/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval minimaal 7 dagen. Druppelen 3,50 gr/1.000 planten. Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!		
Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	3/teelt	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha.		
Sumicidin Super	Esveneraleraat	10211 N	3a	50 ml		Ruimtebehandeling 100 ml/1000 m <sup>2</sup> . <b>Opgebruikstermijn W.15 &amp; W.16 1-7-2019</b>		
Wol-, dop-, schildluis	Admir	Imidacloprid	11483 N	4a	10 gr	5/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval minimaal 7 dagen. Druppelen 3,50 gr/1.000 planten. Bij spuiten uitvoeier toevoegen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
	Kohlor	Imidacloprid	13831 N	4a	10 gr	2/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval minimaal 7 dagen. Druppelen 3,50 gr/1.000 planten. Bij spuiten uitvoeier toevoegen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	3/teelt	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha, ruimtebehandeling 50ml/1.000m <sup>2</sup>	
	Envidor	Spirodiclofen	12477 N	23	40 ml	2/teelt	Maximaal 0,40 ltr/ha/toepassing	
	Gazelle	Acetamiprid	12809 N	4a	50 gr		<b>Opgebruikstermijn W.4 1-7-2019</b>	
Mineervlieg	Trigard 100 SL	Cyromazine	12014 N	17	100 ml	3/teelt	Maximaal 1,50 ltr/ha/toepassing. Werk alleen tegen larvestadium, trane aanvangswerking. Interval minimaal 7 dagen.	
	Mainspring	Cyrantranilprole	15651 N	28	10 gr	2/teelt	Maximaal 0,12 kg/ha/toepassing, maximaal 4 toepassingen per jaar. Interval minimaal 7 dagen. 125 ml suikeroplossing per 100 ltr water toevoegen.	
	Vintec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden.	
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden.	
	Milbeknock	Milbectin	12364 N	6	100 ml	9/jaar	Maximaal 3 blokken van 3 besputingen. Interval tussen besputing minimaal 7 dagen. Interval tussen blokken minimaal 28 dagen	
Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	3/teelt	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha.		
Sumicidin Super	Esveneraleraat	10211 N	3a	100 ml		Ruimtebehandeling 100 ml/1000 m <sup>2</sup> . <b>Opgebruikstermijn W.15 &amp; W.16 1-7-2019</b>		
Rupsen	Runner	Methoxyfenozide	12696 N	18	40 ml		Maximaal 0,80 ltr/ha per toepassing, 2 toepassingen per jaar	
	Nomolt	Teflubenzuron	9914 N	15	100 ml	3/jaar	Maximaal 1,20 ltr/toepassing/ha, alleen in bedekte niet grondgebonden teelt toegestaan. Maximaal 3,60 ltr/ha/jaar. Interval minimaal 7 dagen. Max. bij deze dosering niet toegepast worden tussen 1 januari en 1 april.	
	Conserv	Spirosad	12363 N	5	75 ml	6/jaar	Blokbehandeling van 2 a 3 toepassingen. Interval minimaal 7 dagen. Tussen blokken 28 dagen. Wachtijd voor inzetten encarsia formosa 14-21 dagen, wachtijd andere biologische bestrijders minimaal 7 dagen (W.1 etiket)	
	Dipel DF	Bacillus thuringiensis subsp kurstaki	14674 N	11a	100 - 200 gr	8/jaar	Maximaal 1,00 kg/toepassing/ha. Interval minimaal 7 dagen, let op pH gevoelig. Sterk in combinatie met Nocturn	
	Turex Spultpoeder	Bacillus thuringiensis kurstaki x aizawai	11702 N	11a	50 - 100 gr	6/jaar	Maximaal 1,00 kg/ha/toepassing. Interval minimaal 7 dagen, let op pH gevoelig.	
	XenTari	Bacillus thuringiensis aizawai	12437 N	11a	100 gr	8/jaar	Maximaal 1,20 kg/ha/toepassing. Interval minimaal 5 dagen, let op pH gevoelig.	
	Delfin	Bacillus thuringiensis subsp kurstaki	10944 N	11a	50 - 62,5 gr	3/jaar	Maximaal 0,75 kg/ha/toepassing. Interval minimaal 7 dagen, let op pH gevoelig.	
	Mainspring	Cyrantranilprole	15651 N	28	10 gr	2/teelt	Maximaal 0,12 kg/ha/toepassing. Maximaal 4 toepassingen per jaar. Interval minimaal 7 dagen	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	3/teelt	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha.	
	Sumicidin super	Esveneraleraat	10211 N	3a	50 ml		Ruimtebehandeling 100 ml/1000 m <sup>2</sup> . <b>Opgebruikstermijn W.15 &amp; W.16 1-7-2019</b>	
	Wittevlieg	Admiral	Pyriproxyfen	11828 N	7c	25 ml	2/jaar	Maximaal 1 keer per teeltcyclus en maximaal 5 keer per jaar. Maximaal 0,25 ltr/ha
		Nomolt	Teflubenzuron	9914 N	15	50 ml	3/jaar	Maximaal 0,60 ltr/toepassing/ha. Alleen in bedekte niet grondgebonden teelt toegestaan. Maximaal 3,60 ltr/ha/jaar. Interval minimaal 7 dagen
		Plenum 50 WG	Pymetrozine	12491 N	9b	60 gr	3/jaar	Resistenteontwikkeling mogelijk, interval minimaal 7 dagen. <b>Opgebruikstermijn W.2 1-7-2019</b>
		Tafari	Pymetrozine	15583 N	9c	60 gr	3/jaar	Maximaal 0,72 kg/ha/toepassing, maximaal 2,16 kg/ha/jaar
		Oberon	Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	2/teelt	Proefbesputing! In enkele potplantsoorten niet gebruiken (zie etiket). Geen hechter of uitvoeier toevoegen, niet mengen. Interval 7-10 dagen.
Botanigard vloeibaar		Beauveria bassiana	12611 N	-	125 ml	25/jaar	Interval minimaal 5 dagen. Maximaal 1,50 ltr/ha. In blokken van 3-4 besputingen. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling minimaal 7 dagen! Zichtbaar residu mogelijk.	
Botanigard WP		Beauveria bassiana	12612 N	-	62,5 gr	25/jaar	Interval minimaal 5 dagen. Maximaal 0,75 kg/ha, in blokken van 3-4 besputingen. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling minimaal 7 dagen! Spuitvoelstof continue roeren. Zichtbaar residu mogelijk.	
PreFeRal		Paeclomyces fumosoroseus	12694 N	-	100 gr		Insecticide op basis van schimmelsporen. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling minimaal 7 dagen! <b>Opgebruikstermijn W.1 1-7-2019.</b> Zie etiket voor spuitoplossing bereiden.	
Mycotal		Verticillium muscarium	10980 N	-	100 gr	24/jaar	Maximaal 2 kg/ha per toepassing. Interval minimaal 7 dagen. Alleen tegen larven Addit (250ml) toevoegen voor betere werking. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling minimaal 3 dagen!	
Naturalis-L		Beauveria bassiana	13857 N	-	300 ml	5/teelt	Interval minimaal 5 dagen, maximaal 3,00 ltr/ha/toepassing.	
Raptol		Pyrethrinen	13230 N	3	1500 ml		Interval minimaal 7 dagen	
Batavia		Spirotramat	15615 N	23	75 ml	6/jaar	Maximaal 0,90 ltr/ha/toepassing. Interval minimaal 14 dagen	
Closer		Sulfoxaflor	15631 N	4c	13 - 26 ml		Maximaal 0,20 - 0,40 ltr/ha/toepassing. Maximaal 0,40 ltr/ha/jaar. Interval minimaal 7 dagen.	
Calypso		Thiacloprid	12452 N	4a	25 ml	3/jaar	Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Maximaal 0,25 ltr/ha/keer. Interval minimaal 7 dagen tussen de behandelingen. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
Actara		Thiamethoxam	12679 N	4a	40 gr	2/teelt	<b>Opgebruikstermijn W.6 1-7-2019.</b> Zo nodig na 7-10 dagen herhalen	
Sivanto Prime		Flupyradifuron	15598 N	4d	75 ml	4/jaar	Maximaal 0,75 ltr/ha/toepassing. Maximaal 4,50 ltr/ha/jaar	
Gazelle		Acetamiprid	12809 N	4	25 - 50 gr	6/jaar	Maximaal 462 gr/ha/toepassing, Maximaal 2772 gr/ha/jaar. <b>Opgebruikstermijn W.4 1-7-2019</b>	
Admir		Imidacloprid	11483 N	4a	10 gr	5/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval minimaal 7 dagen. Druppelen 3,50 gr/1.000 planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. <b>Opgebruikstermijn W.19 1-11-2018.</b> Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
Kohlor 700 WG		Imidacloprid	13831 N	4	10 gr	2/jaar	Maximaal 0,12 kg/ha, interval minimaal 7 dagen. Druppelen 3,50 gr/1.000 planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
Decis EC		Deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	3/jaar	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha.	
Sumicidin super		Esveneraleraat	10211 N	3a	50 ml		Ruimtebehandeling 100 ml/1000 m <sup>2</sup> . <b>Opgebruikstermijn W.15 &amp; W.16 1-7-2019</b>	
Trips		Nemasy f	Steinernema Feltae	-	-	-	-	Spuiten: 125-250 miljoen/1.000m <sup>2</sup> Voor meer informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur.
		Mycotal	Verticillium lecanii	10980 N	-	100 gr	24/jaar	Maximaal 2,00 kg/ha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Alleen tegen larven Addit (250ml) toevoegen voor betere werking. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling minimaal 3 dagen!
		Botanigard vloeibaar	Beauveria bassiana	12611 N	-	125 ml	25/jaar	Interval minimaal 5 dagen, maximaal 1,50 ltr/ha, in blokken van 3-4 besputingen. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling minimaal 7 dagen! Zichtbaar residu mogelijk.
		Botanigard WP	Beauveria bassiana	12612 N	-	62,5 gr	25/jaar	Interval minimaal 5 dagen, maximaal 0,75 kg/ha, in blokken van 3-4 besputingen. Let op met Fungiciden-> interval fungicidenbehandeling minimaal 7 dagen! Spuitvoelstof continue roeren. Zichtbaar residu mogelijk.
	NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
	Azatin	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 gr	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken, interval tussen besputing minimaal 7 dagen, interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7	
	Okos	Azadirachtin	15729 N	UN	100 - 120 ml	5/jaar	Maximaal 1,20 ltr/ha/toepassing, interval min. 7 dagen	
	Match	Lufenuron	12821 N	15	150 ml	4/jaar	2x van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,20 ltr/ha, interval tussen besputing minimaal 14 dagen	
	Nocturn	Pyridaïl	13359 N	-	150 ml	4/jaar	2x van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,50 ltr/ha, interval tussen besputing minimaal 14 dagen	
	Raptol	Pyrethrinen	13230 N	3	1000 ml		Maximaal 1,50 ltr/ha/toepassing, 2 blokken van 2 toepassingen, interval min. 7 dagen. Interval tussen blokken minimaal 28 dagen	
	Mainspring	Cyrantranilprole	15651 N	28	10 gr	2/teelt	Maximaal 0,12 kg/ha/toepassing, maximaal 4 toepassingen per jaar. Interval minimaal 7 dagen. 125 ml suikeroplossing per 100 ltr water toevoegen.	
	Sivanto Prime	Flupyradifuron	15598 N	4d	75 ml	4/jaar	Maximaal 0,75 ltr/ha/toepassing, maximaal 4,50 ltr/ha/jaar	
	Conserv	Spirosad	12363 N	5	75 ml	6/jaar	Maximaal 0,75 ltr/ha/toepassing, maximaal 4,50 ltr/ha/jaar	
	Flipper	Vezuren, kaliumzouten	12679 N	4a	40 gr	2/teelt	In twee blokken toepassen, resistentiegevoelig, goede werking echinotrips, nevenwerking rups.	
	Actara	Thiamethoxam	12679 N	4a	40 gr	2/teelt	Interval minimaal 7 dagen, maximaal 3 besputingen per blok, pH water minimaal 7 of hoger, proefbesputing uitvoeren	
	Vintec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	8/jaar	<b>Opgebruikstermijn W.6 1-7-2019.</b> Zo nodig na 7-10 dagen herhalen	
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	3/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
	Winner	Formetanfaat	14958 N	1a	30 gr	20/jaar	Maximaal 0,30 kg/toepassing/ha. Maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus. Let op pH tussen 5-6.	
	Sumicidin super	Esveneraleraat	10211 N	3a	50 ml		Zie etiket voor toepassingvoorwaarden Ruimtebehandeling 100 ml/1000 m <sup>2</sup> . <b>Opgebruikstermijn W.15 &amp; W.16 1-7-2019</b>	
	Spint	Apollo	Clofentozin	8794 N	10a	30 ml	1/teelt	Werk op eieren en larven. Nieuw etiket (W.8) maximaal 0,39 ltr/ha/toepassing.
		Cantack	Acequinozyl	12939 N	20b	100 ml	9/jaar	Maximaal 1,20 ltr/ha/toepassing, minimaal interval 7 dagen, interval 28 dagen tussen de blokken.
		Floramate	Bifenazaat	12421 N	UN	40 ml	4/jaar	2 keer per blok, maximaal 0,60 ltr/ha. Let op pH gevoelig tussen 5-6!
		Nissoran vtb	Hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	12/jaar	6 blokken van 2 toepassingen, werkt alleen op ei en larve. Maximaal 0,20 ltr/toepassing/ha.
		NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.
Azatin		Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 gr	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken, interval tussen besputing minimaal 7 dagen, interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7	
Scelta		Cyflumetofen	13440 N	25	100 ml	4/jaar	2x per blok, interval minimaal 7 dagen. Maximaal 1,00 ltr/toepassing/ha	
Raptol		Pyrethrinen	13230 N	3	1000 ml		Interval minimaal 7 dagen	
Envidor		Spirodiclofen	12477 N	23	40 ml	2/teelt	Niet toepassen in roos.	
Borneo		Etoxazole	13227 N	10b	50 ml	1/teelt - 4/jaar	Let op pH 5-7! 2x per blok	
Oberon		Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	2/teelt	Gewas bij besputing aan alle zijden goed raken, in eenzaadlobbigen niet gebruiken, ook in andere potplanten soorten gewasreactie mogelijk. Gebruik tussen 1 maart en 1 september wordt afgeraden i.v.m. oewasveiligheid, zie etiket. Geen uitvoeier of hechter	
Vintec Gold		Abamectine	13087 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/toepassing/ha. Zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
Abamectine		Abamectine	13190 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/toepassing/ha. Zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
Milbeknock		Milbectin	12364 N	6	50 ml		Maximaal 3 blokken van 3 besputingen, interval tussen besputing minimaal 7 dagen, interval tussen blokken minimaal 28 dagen	
Carex 10SC		Pyridaben	14836 N	21	140 ml	1/jaar	Maximaal 1,90 ltr/ha per toepassing.	
Varenrouwmug	Nemasy f	Steinernema Feltae	-	-	-	-	Bodemtoepassing, preventief 1 ml/rd/2000m <sup>2</sup> , curatief 1 ml/rd/1000m <sup>2</sup>	
	Sumicidin super	Esveneraleraat	10211 N	3a	50 ml		Ruimtebehandeling 100 ml/1000 m <sup>2</sup> . <b>Opgebruikstermijn W.15 &amp; W.16 1-7-2019 interval 5-7 dagen</b>	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3a	50 ml	3/jaar	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1000 ltr/ha.	
Aaltjes (o.a. wortelknobbel)	Vydate 10G	Oxamyl	12409 N	1a		1/teelt	Potgrondbehandeling direct voor oppotten: 40 gr/m <sup>2</sup> potgrond	
	Taxuskever	Heterorhabditis bacteriophora	-	-	aangieten	-	Curatief 250 ml/500 m <sup>2</sup> bodemtoepassing, zie voor verdere informatie het etiket of raadpleeg uw adviseur	
Slakken	Nemasya L	Steinernema Kraussei	-	-	aangieten	-	Curatief 250 ml/500 m <sup>2</sup> bodemtoepassing, zie voor verdere informatie het etiket of raadpleeg uw adviseur	
	BIO 1020	Metharhizium anisoplae	12589 N	-	-	2/jaar	Mengen door potgrond voor planten: 0,50 kg/m <sup>2</sup> potgrond.	
Fungiciden	Metarex Inov	Metaldihyde	14872 N	-	5 kg/ha	3/jaar	Minimaal interval 5 dagen	
	Sluxx HP	Fenflisaat	13316 N	-	7 kg/ha	4/jaar	Minimaal interval 7 dagen, alleen naaktslakken	
Phytophthora	Fenomenal	Fenamidone / fosetyl-aluminium	12824 N	11/33	150 gr		10% van potvolume aanjieten. Na toepassen direct innemen. Alleen preventieve werking. <b>Opgebruikstermijn t/m 14-11-2019</b>	
	M							

Pythium	Metalexyl-M SL	Metalexyl-M	13244 N	4	10 ml		Potgrondbeh.: 12,5-18,75 ml verspuiten in 5-10 ltr water. Aangieten (10% van het potvolume) na stekken, verspenen of oppotten, preventief 6,25-9,375 ml/100 ltr water, curatief 9,375-12,5 ml/100ltr water. Na toepassen direct inregenen.
	Proplant	Propamocarb-hydrochloride	12918 N	28	150 ml		Toepassingen: potgrondbehandeling, behandeling direct na zaaien, stekken, verspenen, oppotten, of aangieten per pot, voor doserinoen zie etiket. Na behandeling wel direct naregenen.
	Ridomil Gold	Metalexyl-M	12281 N	4	10 ml		Potgrondbeh.: 12,5-18,75 ml verspuiten in 5-10 ltr water. Aangieten (10% van het potvolume) na stekken, verspenen of oppotten, preventief 6,25-9,375 ml/100 ltr water, curatief 9,375-12,5 ml/100ltr water. Na toepassen direct inregenen.
Echte Meeldauw	Flint	Trifloxystrobin	12289 N	11	12,5 gr	3/teelt	Eerst proefbespuiting uitvoeren
	Fado	COS-OGA	14921 N	-	300 - 400 ml	5/teelt	Maximaal 15 toepassingen per jaar, minimum interval 7 dagen. Niet toepassen in direct zonlicht, in het bijzonder bij hoge temperaturen. Mag niet worden toegepast bij eenjarige perkplanten, bolbloemen, knolbloemen, cactussen en succulenten.
	Frupica SC	Mepanipyrim	12229 N	9	90 ml	2/teelt	Maximaal 0,90 ltr/ha. Neveneffect op Botrytis.
	Kumulus S	Zwavel	6147 N	M2	400 gr	6/jaar	Maximaal 4,00 kg/ha/toepassing. Minimaal interval 10 dagen
	Luna Privilege	Fluopyram	13832 N	7	50 ml	6/teelt	Maximaal 0,75 ltr/toepassing/ha. Minimaal interval 7 dagen
	Ortiva	Azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	4/teelt	Niet in lichtarme periode toepassen, proefbespuiting uitvoeren. I.v.m. kans op schade niet op Saintpaulia's toepassen.
	Rocket EC	Triflumizool	13378 N	3	100 ml	6/jaar	Alleen Begonia, Gerbera, Kalanchoe, Saintpaulia, en roos. 2 blokken van 3 bespuitingen, tussen de blokken minimaal 2 bespuitingen met een fungicide met een ander werkingsmechanisme.
	Tilt 250EC	Propiconazool	8627 N	3	50 - 100 ml		Zie etiket voor restricties. Geeft groeiremning. Proefbespuiting uitvoeren.

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

#### Indeling insecticiden (IRAC)

- 1a) carbamaten
- 3 ) pyrethroiden
- 4 ) neonicotinen
- 5 ) spinosyns
- 6 ) avermectinen
- 7 ) pyriproxyfen
- 9 ) pymetrozine
- 10 ) thiazolidines
- 11 ) bacillus thuringiensis
- 15 ) pyrazoolverbindingen
- 17 ) cyromazine
- 18 ) diacylhydrazinen
- 20 ) acequincyl
- 21 ) pyridazine verbindingen
- 23 ) ketoenolen
- 28 ) phthalic acid diamides
- UN) diverse

#### Indeling fungiciden (FRAC)

- 1 ) MBC - fungicides
- 2 ) dicarboximides
- 3 ) DMI - fungicides
- 4 ) PA - fungicides
- 7 ) SDHI
- 9 ) AP - fungicides
- 11 ) Ool - fungicides
- 12 ) PP - fungicides
- 14 ) aromatic hydrocarbons + heteroaromatics
- 17 ) hydroxanilides
- 28 ) carbamates
- 33 ) phosphonates
- 40 ) CAA - fungicides
- M3) dithiocarbates and relatives
- M4) phthalimides
- M5) chloronitrils
- NC) diverse

#### n.v.o. = niet op de dag voor de oogst

#### Neveneffect op natuurlijke bestrijders

- Inzetbaar in geïntegreerde teelt
- Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders
- Niet te combineren met natuurlijke bestrijders

Voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming:



- \* Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking.
- \* Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies.
- \* Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen.
- \* Wij aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- \* Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen BV deze lijst of gegevens uit deze lijst te vermenigvuldigen of verspreiden.