

# Chrysanit spuitadvieslijst



Uitgave januari 2019

Plantziekte	Middel	Werkzame stof	Totaal nr.	Groep	Spuiten /100 ltr.	Maximaal aantal toepassingen	Opmerkingen
<b>Insecticiden en acariciden</b>							
<b>Bladluis</b>	<b>Teppak</b>	Flonicamid	12757 N	9c	14 gr	3/jaar	Maximaal 2x per teelt i.v.m. resistentie, interval minimaal 21 dagen
	<b>Tafari</b>	Pyrethrine	15583 N	9b	20 gr	2/jaar	Maximaal 0,24 ltr/ha toepassing, maximaal 2,16 kg/ha/jaar. <b>Oogbruikstermijn 30-1-2020</b>
	<b>Plenum 50 WG</b>	Pyrethroïne	12491 N	9b	20 gr	2/jaar	Resistentiewerking mogelijk, interval minimaal 7 dagen. <b>Oogbruikstermijn W. 2-1-2019 W. 3-23-2019. Verzorging: Tallen laten gebuiken</b>
	<b>NeemAzal-T/S</b>	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.
	<b>Azatin</b>	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen bespuiting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.
	<b>Oikos</b>	Azadirachtine a.	15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen
	<b>Movento OD</b>	Spirotetramat	13404 N	23	0,50 ltr/ha	2/jaar	2 toepassingen per jaar. Max. 0,50 ltr/ha per toepassing, interval minimaal 14 dagen.
	<b>Rapitol</b>	Pyrethine+kalzoadaolie	15230 N	4	1000 ml	4/jaar	Interval minimaal 7 dagen
	<b>Insect-off</b>	Kalzoeten van organische zetzuren	-	-	-	-	Bespuiting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen.
	<b>Calypso</b>	Thiaclopid	12452 N	4	25 ml	3/jaar	Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Maximaal 0,25 ltr/ha/keer. Interval minimaal 7 dagen tussen de behandelingen. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!
	<b>Closer</b>	Sulfoxaflor	15631 N	4c	13-26 ml	1/jaar	Maximaal 0,20 ltr/ha toepassing. Maximaal 0,40 ltr/ha/keer. Interval minimaal 7 dagen.
	<b>Batavia</b>	Spirotetramat	15615 N	23	75 ml	2/jaar	Maximaal 0,90 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 14 dagen.
	<b>Gaasle</b>	Azoxystrobin	12809 N	4	25 gr	3/jaar	<b>Oogbruikstermijn W. 4-1-2019</b>
	<b>Pediment</b>	Trimefthoorn	15584 N	1a	20 gr	2/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha toepassing. Werkt niet tegen alle soorten luisen. <b>Oogbruikstermijn 30-1-2020</b>
	<b>Primar sp.k.</b>	Primicarb	5794 N	1a	50 gr	2/jaar	Werk niet tegen alle soorten luisen, maximaal 0,50 kg/ha. Interval minimaal 7 dagen. Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. <b>Oogbruikstermijn W. 8-23-2018. Verzorging: Pediment daar gebruiken</b>
	<b>Pediment rookontwikelaar</b>	Primicarb	15083 N	1a	20 gr	2/jaar	1 rookontwikelaar per 400 m <sup>2</sup> teelt, max. 22 C, max. 25 st/ha, interval minimaal 10 dagen, werkt niet tegen alle soorten luisen. <b>Oogbruikstermijn W. 8-23-9-2019</b>
	<b>Actara</b>	Thiamethoxam	12879 N	4	10 gr	3/jaar	Zo nodig na 7-10 dagen herhalen. <b>Oogbruikstermijn W. 8-30-10-2020</b>
	<b>Admira</b>	Imidacloprid	11483 N	4	10 gr	3/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval minimaal 7 dagen, druppelen 3,50 gr/1.000 planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!
	<b>Kohinar 700 WG</b>	Imidacloprid	13831 N	4	10 gr	2/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval minimaal 7 dagen, druppelen 3,50 gr/1.000 planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!
	<b>Decis EC</b>	Deltamethin	7774 N	3	50 ml	3/heel	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.
	<b>Sunickidin Super</b>	Ecyvaldekloor	10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. <b>Oogbruikstermijn W. 16-1-2019</b>
<b>Minervoing</b>	<b>NeemAzal-T/S</b>	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.
	<b>Azatin</b>	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen bespuiting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.
	<b>Oikos</b>	Azadirachtine a.	15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen
	<b>Rapitol</b>	Pyrethine+kalzoadaolie	15230 N	4	1000 ml	4/jaar	Interval minimaal 7 dagen
	<b>Vertimec Gold</b>	Abamectine	13087 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden
	<b>Abamectine</b>	Abamectine	13190 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 3 blokken van 3 bespuitingen, interval tussen bespuiting minimaal 7 dagen, interval tussen blokken minimaal 28 dagen
	<b>Miteknock</b>	Milbectine	12364 N	6	100 ml	9/jaar	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.
	<b>Decis EC</b>	Deltamethin	7774 N	3	50 ml	3/heel	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.
	<b>Sunickidin Super</b>	Ecyvaldekloor	10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. <b>Oogbruikstermijn W. 16-1-2019</b>
<b>Rups</b>	<b>Runner</b>	Methidathion	12869 N	18	40 ml	2/jaar	<b>Oogbruikstermijn W. 8-1-2019</b>
	<b>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</b>	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	10944 N	11	50-62,50 gr	3/jaar	Maximaal 0,75 kg/ha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Let op pH gevoelig!
	<b>DiPel DF</b>	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	14874 N	11	100-200 gr	8/jaar	Maximaal 1 kg/ha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Let op pH gevoelig!
	<b>Turex 50 WP</b>	Bacillus thuringiensis	11702 N	11	50-100 gr	8/jaar	Maximaal 1 kg/ha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Let op pH gevoelig!
	<b>Xentari</b>	Bacillus thuringiensis	12437 N	11	100 gr	8/jaar	Maximaal 1,20 kg/ha per toepassing, interval minimaal 5 dagen. Let op pH gevoelig!
	<b>Nocturn</b>	Pyridalyl	13359 N	-	150 ml	4/jaar	Maximaal 1,50 ltr/ha toepassing, 2 blokken van 2 toepassingen, interval minimaal 7 dagen. Interval tussen blokken minimaal 28 dagen
	<b>Misch</b>	Lufenuron	12821 N	15	150 ml	4/jaar	Zv van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,20 ltr/ha, interval tussen bespuiting minimaal 14 dagen. Zv van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,50 ltr/ha, interval tussen bespuitingen minimaal 14 dagen.
	<b>Conserve</b>	Spiromesfen	12363 N	5	75 ml	6/jaar	Resistentiegevoelig, in blok bespuiting van 2-3 toepassingen met een interval tussen bespuiting minimaal 7 dagen
	<b>Decis EC</b>	Deltamethin	7774 N	3	50 ml	3/heel	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.
	<b>Sunickidin Super</b>	Ecyvaldekloor	10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. <b>Oogbruikstermijn W. 16-1-2019</b>
<b>Wittevlieg</b>	<b>Admiral</b>	Pyrifosfaten	11828 N	7	25 ml	5/jaar	Maximaal 1x per teeltcyclus en maximaal 5x per jaar. Maximaal 0,25 ltr/ha
	<b>Botanigard WP</b>	Beauveria bassiana	12612 N	-	62,50 gr	25/jaar	Interval minimaal 5 dagen, maximaal 1,50 ltr/ha, in blokken van 3-4 bespuitingen. Let op met Fungiciden -> interval fungicidenbehandeling minimaal 7 dagen!
	<b>Botanigard vlb</b>	Beauveria bassiana	12611 N	-	125 ml	25/jaar	Interval minimaal 5 dagen, maximaal 1,50 ltr/ha, in blokken van 3-4 bespuitingen. Let op met Fungiciden -> interval fungicidenbehandeling minimaal 7 dagen!
	<b>PrefFall</b>	Paeclomyces fumosoroseus	12694 N	-	100 gr	3/heel	Insecticide op basis van schimmelsporen. Let op met Fungiciden -> interval fungicidenbehandeling minimaal 7 dagen! <b>Oogbruikstermijn W. 0-1-5-2019</b>
	<b>Mycotal</b>	Lecanilium muscarum	10980 N	-	100 gr	24/jaar	Maximaal 2 kg/ha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Alleen tegen larven Addx (250ml) toevoegen voor betere werking. Let op met Fungiciden -> interval fungicidenbehandeling minimaal 3 dagen!
	<b>NeemAzal-T/S</b>	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.
	<b>Azatin</b>	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen bespuiting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.
	<b>Oikos</b>	Azadirachtine a.	15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen
	<b>Misch</b>	Lufenuron	12821 N	15	150 ml	4/jaar	Zv van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,20 ltr/ha, interval tussen bespuiting minimaal 14 dagen. Zv van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,50 ltr/ha, interval tussen bespuitingen minimaal 14 dagen.
	<b>Tafari</b>	Pyrethrine	15583 N	9b	20 gr	3/jaar	Maximaal 0,24 ltr/ha toepassing. Maximaal 2,16 kg/ha/jaar. <b>Oogbruikstermijn 30-1-2020</b>
	<b>Plenum 50 WG</b>	Pyrethroïne	12491 N	9b	20 gr	3/jaar	Resistentiewerking mogelijk, interval minimaal 7 dagen. <b>Oogbruikstermijn W. 2-1-2019 W. 3-23-2019. Verzorging: Tallen laten gebuiken</b>
	<b>Rapitol</b>	Pyrethine+kalzoadaolie	15230 N	4	1000 ml	4/jaar	Interval minimaal 7 dagen
	<b>Insect-off</b>	Kalzoeten van organische zetzuren	-	-	-	-	Bespuiting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen.
	<b>Batavia</b>	Spirotetramat	15615 N	23	75 ml	2/jaar	Maximaal 0,90 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 14 dagen.
	<b>Calypso</b>	Thiaclopid	12452 N	4	25 ml	3/jaar	Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Maximaal 0,25 ltr/ha/keer. Interval minimaal 7 dagen tussen de behandelingen. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!
	<b>Closer</b>	Sulfoxaflor	15631 N	4c	13-26 ml	1/jaar	Maximaal 0,20 ltr/ha toepassing. Maximaal 0,40 ltr/ha/keer. Interval minimaal 7 dagen.
	<b>Gaasle</b>	Azoxystrobin	12809 N	4	25 gr	3/jaar	<b>Oogbruikstermijn W. 4-1-2019</b>
	<b>Actara</b>	Thiamethoxam	12879 N	4	10 gr	3/jaar	Zo nodig na 7-10 dagen herhalen. <b>Oogbruikstermijn W. 8-30-10-2020</b>
	<b>Admira</b>	Imidacloprid	11483 N	4	10 gr	3/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval minimaal 7 dagen, druppelen 3,50 gr/1.000 planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!
	<b>Kohinar 700 WG</b>	Imidacloprid	13831 N	4	10 gr	2/jaar	Maximaal 0,10 kg/ha, interval minimaal 7 dagen, druppelen 3,50 gr/1.000 planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!
	<b>Decis EC</b>	Deltamethin	7774 N	3	50 ml	3/heel	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.
	<b>Sunickidin Super</b>	Ecyvaldekloor	10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. <b>Oogbruikstermijn W. 16-1-2019</b>
<b>Trips</b>	<b>Nematus F</b>	Steinemeia fellea	-	-	-	-	Souten: 125-250 miljoen/1.000m <sup>2</sup> . Voor meer informatie en dosering, raadpleeg uw adviseur.
	<b>Mycotal</b>	Lecanilium muscarum	10980 N	-	100 gr	24/jaar	Maximaal 2 kg/ha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Alleen tegen larven Addx (250ml) toevoegen voor betere werking. Let op met Fungiciden -> interval fungicidenbehandeling minimaal 3 dagen!
	<b>NeemAzal-T/S</b>	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.
	<b>Azatin</b>	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen bespuiting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.
	<b>Oikos</b>	Azadirachtine a.	15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen
	<b>Botanigard vlb</b>	Beauveria bassiana	12611 N	-	125 ml	25/jaar	Interval minimaal 5 dagen, maximaal 1,50 ltr/ha, in blokken van 3-4 bespuitingen. Let op met Fungiciden -> interval fungicidenbehandeling minimaal 7 dagen!
	<b>Botanigard WP</b>	Beauveria bassiana	12612 N	-	62,50 gr	25/jaar	Interval minimaal 5 dagen, maximaal 1,50 ltr/ha, in blokken van 3-4 bespuitingen. Let op met Fungiciden -> interval fungicidenbehandeling minimaal 7 dagen!
	<b>Nocturn</b>	Pyridalyl	13359 N	-	150 ml	4/jaar	Maximaal 1,50 ltr/ha toepassing, 2 blokken van 2 toepassingen, interval minimaal 7 dagen. Interval tussen blokken minimaal 28 dagen
	<b>Misch</b>	Lufenuron	12821 N	15	150 ml	4/jaar	Zv van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,20 ltr/ha, interval tussen bespuiting minimaal 14 dagen. Zv van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,50 ltr/ha, interval tussen bespuitingen minimaal 14 dagen.
	<b>Movento OD</b>	Spirotetramat	13404 N	23	0,50 ltr/ha	2/jaar	2 toepassingen per jaar. Max. 0,50 ltr/ha per toepassing, interval minimaal 14 dagen.
	<b>Regulim Prime</b>	Terpenoid blend	15599 N	-	650 ml	12/jaar	Maximaal 10 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen
	<b>Rapitol</b>	Pyrethine+kalzoadaolie	15230 N	4	1000 ml	4/jaar	Interval minimaal 7 dagen
	<b>Insect-off</b>	Kalzoeten van organische zetzuren	-	-	-	-	Bespuiting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen.
	<b>Flipper</b>	Zetzuren, kalkzetzuren	-	-	-	-	Interval minimaal 7 dagen, maximaal 3 bespuitingen per blok, pH water minimaal 7 of hoer
	<b>Batavia</b>	Spirotetramat	15615 N	23	75 ml	2/jaar	Maximaal 0,90 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 14 dagen.
	<b>Conserve</b>	Spiromesfen	12363 N	5	75 ml	6/jaar	Resistentiegevoelig, in blok bespuiting van 2-3 toepassingen met een interval tussen bespuiting minimaal 7 dagen
	<b>Vertimec Gold</b>	Abamectine	13087 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden
	<b>Abamectine</b>	Abamectine	13190 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 3 blokken van 3 bespuitingen, interval tussen bespuiting minimaal 7 dagen, interval tussen blokken minimaal 28 dagen
	<b>Winner</b>	Formetanat	14958 N	1a	30 gr	20/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden
	<b>Decis EC</b>	Deltamethin	7774 N	3	50 ml	3/heel	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.
	<b>Sunickidin Super</b>	Ecyvaldekloor	10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. <b>Oogbruikstermijn W. 16-1-2019</b>
<b>Spin</b>	<b>Apollo</b>	Chlorfenox	8794 N	10a	30 ml	19/heel	Minimaal 450 ml/ha gebruiken, werkt alleen tegen eit en jonge larven. Resistentiegevoelig
	<b>Caractac</b>	Axonoxynol	12388 N	20b	100 ml	8/jaar	Maximaal 2,20 ltr/ha toepassing, minimaal interval 7 dagen. Maximaal 3 blokken van 3 bespuitingen, interval 28 dagen tussen de blokken.
	<b>Floarmite</b>	Bifenthrin	12421 N	9b	40 ml	3/jaar	Zv per blok, maximaal 0,60 ltr/ha. Let op pH gevoelig tussen 5-6!
	<b>NeemAzal-T/S</b>	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.
	<b>Azatin</b>	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen bespuiting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.
	<b>Oikos</b>	Azadirachtine a.	15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen
	<b>Nissorun vlb</b>	Hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	12/jaar	6 blokken van 2 toepassingen, werkt alleen op eit en larve. Max. 0,20 ltr per toepassing per ha.
	<b>Movento OD</b>	Spirotetramat	13404 N	23	0,50 ltr/ha	2/jaar	2 toepassingen per jaar. Max. 0,50 ltr/ha per toepassing, interval minimaal 14 dagen.
	<b>Scalix</b>	Cyflumetofenol	13448 N	26	100 ml	4/jaar	Zv per blok, interval minimaal 7 dagen. Maximaal 1,00 ltr per toepassing per hectare
	<b>Regulim Prime</b>	Terpenoid blend	15599 N	-	650 ml	12/jaar	Max. 10 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen
	<b>Rapitol</b>	Pyrethine+kalzoadaolie	15230 N	4	1000 ml	4/jaar	Interval minimaal 7 dagen
	<b>Insect-off</b>	Kalzoeten van organische zetzuren	-	-	-	-	Bespuiting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen.
	<b>Envidor</b>	Spirodiclofen	12477 N	23	40 ml	2/heel	Maximaal 0,40 ltr/ha. <b>Oogbruikstermijn W. 1-1-2019</b>
	<b>Borneo</b>	Etoxazole	13227 N	10b	50 ml	1/heel - 4/jaar	Let op pH 5-7! Zv per blok
	<b>Oboron</b>	Spiromesfen	12363 N	23	50 ml	2/heel	Geen uitvoeren toevoegen of andere hulpstoffen. Niet mengen met andere middelen. In de zomerperiode lichte strobil kan onschade. <b>Oogbruikstermijn W. 4-5-10-2019</b>
	<b>Vertimec Gold</b>	Abamectine	13087 N	6	25 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden
	<b>Abamectine</b>	Abamectine	13190 N	6	25 ml	8/jaar	Maximaal 3 blokken van 3 bespuitingen, interval tussen bespuiting minimaal 7 dagen, interval tussen blokken minimaal 28 dagen
	<b>Miteknock</b>	Milbectine	12364 N	6	25 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoor