

Chrysant spuitadvieslijst

Uitgave januari 2019

Indeling insecticiden	Plaagziekte	Middel	Werkzame stof	Tot.nr.	Groep	Spuiten /100 ltr.	Maximaal aantal toepassingen	Opmmerkingen	
Insecticiden en acariciden	Bladluis	Teppski	Fonicamid	12757 N	9c	14 gr	3/jaar	Maximaal 2x per teelt i.v.m. resistentie, interval minimaal 21 dagen	
		Tafari	Pyrethroïne	15583 N	9b	20 gr	2/jaar	Maximaal 0,24 ltr/ha toepassing. Maximaal 2,16 ltr/ha/ha. Oogbruikstermijn 30-1-2020	
		Plenum 50 WG	Pyrethroïne	12491 N	9b	20 gr	2/jaar	Resistentiewaaktijd mogelijk, interval minimaal 7 dagen. Oogbruikstermijn W. 2.1-7-2019 W. 3.23-8-2019. Verouderd. Tallen geen gebruik.	
		NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
		Azatin	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen besputting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.	
		Okios	Azadirachtine a.	15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen	
		Movento OD	Spiroetramet	13404 N	23	0,50 ltr/ha	2/jaar	2 toepassingen per teeltcyclus per jaar. Max. 0,50 ltr/ha per toepassing, interval minimaal 14 dagen.	
		Rapitol	Pyrethrine+kalzoadaalide	13230 N	4	1000 ml	4/jaar	Interval minimaal 7 dagen	
		Insect-off	Kalzoeten van organische vezuren	-	-	1-2%	-	Besputting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen.	
		Calypso	Thiacloprid	12452 N	4	25 ml	3/jaar	Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Maximaal 0,25 ltr/ha/ha. Interval minimaal 7 dagen tussen de behandelingen. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
		Closer	Sulfoxaflor	15631 N	4c	13-26 ml	1/jaar	Maximaal 0,20 ltr/ha toepassing. Maximaal 0,40 ltr/ha/ha. Interval minimaal 7 dagen	
		Batavia	Spiroetramet	15615 N	23	75 ml	2/jaar	Maximaal 0,90 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 14 dagen	
		Gasalla	Acaricid	12809 N	4	25 gr	3/jaar	Oogbruikstermijn W. 4.1-7-2019	
		Pediment	Prinacarb	15584 N	1a	50 gr	2/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha toepassing. Werkt niet tegen alle soorten luizen. Oogbruikstermijn 30-1-2020	
		Primar sp.k.	Prinacarb	5794 N	1a	50 gr	2/jaar	Werkt niet tegen alle soorten luizen, maximaal 0,50 ltr/ha. Interval minimaal 7 dagen. Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Oogbruikstermijn W. 8.23-8-2019. Verouderd. Pediment daar gebruiken	
		Pediment rookontkalkelaar	Prinacarb	15083 N	1a	2/jaar	2/jaar	1 rookontkalkelaar per 400 m ² teelt. > 22 C, max. 25 stha, interval minimaal 10 dagen, werkt niet tegen alle soorten luizen. Oogbruikstermijn W. 6.23-9-2019	
		Actara	Thiamethoxam	12879 N	4	10 gr	3/jaar	Zo nodig na 7-10 dagen herhalen. Oogbruikstermijn W. 8.30-10-2020	
		Admira	Imidacloprid	11483 N	4	10 gr	3/jaar	Maximaal 0,10 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, druppelen 3,50 gr/1.000 planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
		Kohinar 700 WG	Imidacloprid	13831 N	4	10 gr	2/jaar	Maximaal 0,10 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, druppelen 3,50 gr/1.000 planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
		Decis EC	Deltamethin	7774 N	3	50 ml	3/week	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.	
Suniskidin Super	Esvalvelestat	10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. Oogbruikstermijn W. 16.1-7-2019			
Mineervlieg	NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.		
		Azatin	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen besputting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.	
		Okios	Azadirachtine a.	15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen	
		Rapitol	Pyrethrine+kalzoadaalide	13230 N	4	1000 ml	4/jaar	Interval minimaal 7 dagen	
		Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
		Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
		Milbeknock	Milbectine	12364 N	6	100 ml	9/jaar	Maximaal 3 blokken van 3 besputtingen, interval tussen besputting minimaal 7 dagen, interval tussen blokken minimaal 28 dagen	
		Decis EC	Deltamethin	7774 N	3	50 ml	3/week	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.	
		Suniskidin Super	Esvalvelestat	10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. Oogbruikstermijn W. 16.1-7-2019	
		Runner	Methoxyfenozide	13968 N	18	40 ml	2/jaar	Oogbruikstermijn W. 8.1-7-2019	
		Defin	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	10944 N	11	50-62,50 gr	3/jaar	Maximaal 0,75 kgha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Let op pH gevoelig!	
		Difel DF	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	14874 N	11	100-200 gr	8/jaar	Maximaal 1 kgha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Let op pH gevoelig!	
		Turex 50 WP	Bacillus thuringiensis	11702 N	11	50-100 gr	8/jaar	Maximaal 1 kgha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Let op pH gevoelig!	
		Xentari	Bacillus thuringiensis	12437 N	11	100 gr	8/jaar	Maximaal 2,00 kgha per toepassing, interval minimaal 5 dagen. Let op pH gevoelig!	
		Nocturn	Pyridalyl	13359 N	-	150 ml	4/jaar	Maximaal 1,50 ltr/ha toepassing. 2 blokken van 2 toepassingen, interval minimaal 7 dagen. Interval tussen blokken minimaal 28 dagen	
		Match	Lufenuron	12821 N	15	150 ml	4/jaar	Zv van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,20 ltr/ha, interval tussen besputting minimaal 14 dagen. Zv van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,50 ltr/ha, interval tussen besputting minimaal 14 dagen.	
		Conserve	Spiromad	12363 N	5	75 ml	6/jaar	Resistentiegevoelig, in blok besputting van 2-3 toepassingen met een interval tussen besputting minimaal 7 dagen	
		Decis EC	Deltamethin	7774 N	3	50 ml	3/week	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.	
		Suniskidin Super	Esvalvelestat	10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. Oogbruikstermijn W. 16.1-7-2019	
		Wittevlieg	Admiral	Pyriproxyfen	11828 N	7	25 ml	5/jaar	Maximaal 1x per teeltcyclus en maximaal 5x per jaar. Maximaal 0,25 ltr/ha
Beauveria bassiana	12612 N			1	125 ml	25/jaar	Interval minimaal 5 dagen, maximaal 1,50 ltr/ha, in blokken van 3-4 besputtingen. Let op met Fungicide-> interval fungicidebehandeling minimaal 7 dagen!		
Beauveria bassiana	12611 N			1	125 ml	25/jaar	Interval minimaal 5 dagen, maximaal 1,50 ltr/ha, in blokken van 3-4 besputtingen. Let op met Fungicide-> interval fungicidebehandeling minimaal 7 dagen!		
PreFaal	Paecilomyces fumosoroseus			12694 N	1	100 gr	3/week	Insecticide op basis van schimmelsporen. Let op met Fungicide-> interval fungicidebehandeling minimaal 7 dagen! Oogbruikstermijn W.0.1-5-2019	
Mycotal	Lecanidium muscarum			10980 N	1	100 gr	24/jaar	Maximaal 2 kgha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Alleen tegen larven Addi (250ml) toevoegen voor betere werking. Let op met Fungicide-> interval fungicidebehandeling minimaal 3 dagen!	
NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.			12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
Azatin	Azadirachtine a.			14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen besputting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.	
Okios	Azadirachtine a.			15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen	
Match	Lufenuron			12821 N	15	150 ml	4/jaar	Zv van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,20 ltr/ha, interval tussen besputting minimaal 14 dagen. Zv van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,50 ltr/ha, interval tussen besputting minimaal 14 dagen.	
Tafari	Pyrethroïne			15583 N	9b	20 gr	2/jaar	Maximaal 0,24 ltr/ha toepassing. Maximaal 2,16 ltr/ha/ha. Oogbruikstermijn 30-1-2020	
Plenum 50 WG	Pyrethroïne			12491 N	9b	20 gr	2/jaar	Resistentiewaaktijd mogelijk, interval minimaal 7 dagen. Oogbruikstermijn W. 2.1-7-2019 W. 3.23-8-2019. Verouderd. Tallen geen gebruik.	
Rapitol	Pyrethrine+kalzoadaalide			13230 N	4	1000 ml	4/jaar	Besputting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen.	
Insect-off	Kalzoeten van organische vezuren			-	-	1-2%	-	Besputting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen.	
Batavia	Spiroetramet			15615 N	23	75 ml	2/jaar	Maximaal 0,90 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 14 dagen	
Calypso	Thiacloprid			12452 N	4	25 ml	3/jaar	Zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Maximaal 0,25 ltr/ha/ha. Interval minimaal 7 dagen tussen de behandelingen. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
Closer	Sulfoxaflor			15631 N	4c	13-26 ml	1/jaar	Maximaal 0,20 ltr/ha toepassing. Maximaal 0,40 ltr/ha/ha. Interval minimaal 7 dagen	
Gasalla	Acaricid			12809 N	4	25 gr	3/jaar	Oogbruikstermijn W. 4.1-7-2019	
Actara	Thiamethoxam			12879 N	4	10 gr	3/jaar	Zo nodig na 7-10 dagen herhalen. Oogbruikstermijn W. 8.30-10-2020	
Admira	Imidacloprid			11483 N	4	10 gr	3/jaar	Maximaal 0,10 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, druppelen 3,50 gr/1.000 planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
Kohinar 700 WG	Imidacloprid			13831 N	4	10 gr	2/jaar	Maximaal 0,10 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, druppelen 3,50 gr/1.000 planten, zie etiket voor toepassingvoorwaarden. Let op verscherpte lozingsvoorschriften!	
Decis EC	Deltamethin	7774 N	3	50 ml	3/week	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.			
Suniskidin Super	Esvalvelestat	10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. Oogbruikstermijn W. 16.1-7-2019			
Trips	Nemesis F	Steinernema feltiae	-	-	-	-	-	Souten: 125-250 miljoen/1.000m ² . Voor meer informatie en dosering: raadpleeg uw adviseur.	
		Mycotal	Lecanidium muscarum	10980 N	1	100 gr	24/jaar	Maximaal 2 kgha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Alleen tegen larven Addi (250ml) toevoegen voor betere werking. Let op met Fungicide-> interval fungicidebehandeling minimaal 3 dagen!	
		NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
		Azatin	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen besputting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.	
		Okios	Azadirachtine a.	15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen	
		Match	Lufenuron	12821 N	15	150 ml	4/jaar	Zv van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,20 ltr/ha, interval tussen besputting minimaal 14 dagen. Zv van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,50 ltr/ha, interval tussen besputting minimaal 14 dagen.	
		Tafari	Pyrethroïne	15583 N	9b	20 gr	2/jaar	Maximaal 0,24 ltr/ha toepassing. Maximaal 2,16 ltr/ha/ha. Oogbruikstermijn 30-1-2020	
		Plenum 50 WG	Pyrethroïne	12491 N	9b	20 gr	2/jaar	Resistentiewaaktijd mogelijk, interval minimaal 7 dagen. Oogbruikstermijn W. 2.1-7-2019 W. 3.23-8-2019. Verouderd. Tallen geen gebruik.	
		Rapitol	Pyrethrine+kalzoadaalide	13230 N	4	1000 ml	4/jaar	Besputting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen.	
		Insect-off	Kalzoeten van organische vezuren	-	-	1-2%	-	Besputting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen.	
		Flipper	Vezuren, kalkzouten	-	-	1-2%	-	Interval minimaal 7 dagen	
		Batavia	Spiroetramet	15615 N	23	75 ml	2/jaar	Maximaal 0,90 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 14 dagen	
		Conserve	Spiromad	12363 N	5	75 ml	6/jaar	Resistentiegevoelig, in blok besputting van 2-3 toepassingen met een interval tussen besputting minimaal 7 dagen	
		Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
		Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
		Winner	Formetanat	14958 N	1a	30 gr	20/jaar	Maximaal 0,30 kg per toepassing per hectare. Maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus. Let op pH tussen 5-6, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
		Decis EC	Deltamethin	7774 N	3	50 ml	3/week	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.	
		Suniskidin Super	Esvalvelestat	10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. Oogbruikstermijn W. 16.1-7-2019	
		Spint	Apollo	Chlorfenvinphos	8794 N	10a	30 ml	1/week	Minimaal 450 ml/ha gebruik, werkt alleen tegen ei en jonge larve. Resistentiegevoelig
				Acetamiprid	12388 N	20b	100 ml	8/jaar	Maximaal 1,20 ltr/ha toepassing, minimaal interval 7 dagen. Maximaal 3 blokken van 3 besputtingen, interval 28 dagen tussen de blokken.
Bifenthrin	12421 N			9c	40 ml	3/week	Zv per blok, maximaal 0,60 ltr/ha. Let op pH gevoelig tussen 5-6!		
NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.			12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
Azatin	Azadirachtine a.			14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen besputting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.	
Okios	Azadirachtine a.			15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen	
Nissorum vlb.	Hexythiazox			10378 N	10a	20 ml	12/jaar	6 blokken van 2 toepassingen, werkt alleen op ei en larve. Max.0,20 ltr per toepassing per ha.	
Movento OD	Spiroetramet			13404 N	23	0,50 ltr/ha	2/jaar	2 toepassingen per teeltcyclus per jaar, maximaal 0,50 ltr/ha per toepassing, interval minimaal 14 dagen	
Scelta	Cyflumetofen			13440 N	25	100 ml	4/jaar	2x per blok, interval minimaal 7 dagen. Maximaal 1,00 ltr per toepassing per hectare	
Rapitol	Pyrethrine+kalzoadaalide			13230 N	4	1000 ml	4/jaar	Interval minimaal 7 dagen	
Insect-off	Kalzoeten van organische vezuren			-	-	1-2%	-	Besputting na 7-10 dagen herhalen. Minimaal 2, bij voorkeur 3 toepassingen.	
Flipper	Vezuren, kalkzouten			-	-	1-2%	-	Interval minimaal 7 dagen, maximaal 3 besputtingen per blok, pH water minimaal 7 of hoger	
Batavia	Spiroetramet			15615 N	23	75 ml	2/jaar	Maximaal 0,90 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 14 dagen	
Conserve	Spiromad			12363 N	5	75 ml	6/jaar	Resistentiegevoelig, in blok besputting van 2-3 toepassingen met een interval tussen besputting minimaal 7 dagen	
Vertimec Gold	Abamectine			13087 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
Abamectine	Abamectine			13190 N	6	50 ml	8/jaar	Maximaal 0,50 ltr/ha, interval minimaal 7 dagen, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
Winner	Formetanat			14958 N	1a	30 gr	20/jaar	Maximaal 0,30 kg per toepassing per hectare. Maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus. Let op pH tussen 5-6, zie etiket voor toepassingvoorwaarden	
Decis EC	Deltamethin			7774 N	3	50 ml	3/week	Interval 7 dagen. Maximaal 0,50 ltr/ha, spuiten met maximaal 1.000 ltr/ha.	
Suniskidin Super	Esvalvelestat			10211 N	3	50 ml	10/jaar	Foggen 1,00 ltr/ha. Oogbruikstermijn W. 16.1-7-2019	
Aaltjes (o.a. wortelknobbel)	Vydate 100			Osiprot	12408 N	1a	400 ontlr	1/jaar	Maximaal 2 kgha per toepassing, interval minimaal 7 dagen. Alleen tegen larven Addi (250ml) toevoegen voor betere werking. Let op met Fungicide-> interval fungicidebehandeling minimaal 3 dagen!
		Mycotal	Lecanidium muscarum	10980 N	1	100 gr	24/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
		NeemAzal-T/S	Azadirachtine a.	12455 N	UN	250 ml	18/jaar	Breedwerkend middel tegen zuigende en stekende insecten. Toepassen in 6 blokken van 3 opeenvolgende besputtingen. Interval minimaal 7 dagen binnen een blok en tussen de blokken minimaal 1,5 maand. Let op: advies spuitoplossing pH 5,5-7,0.	
		Azatin	Azadirachtine a.	14936 N	UN	140 ml	20/jaar	Maximaal 1,40 ltr/ha, toepassingen verdelen over 5 blokken. Interval tussen besputting minimaal 7 dagen. Interval tussen een blok minimaal 42 dagen. Let op pH tussen 5 en 7.	
		Okios	Azadirachtine a.	15729 N	UN	100 ml	5/jaar	Maximaal 0,80 ltr/ha toepassing. Interval minimaal 7 dagen	
		Match	Lufenuron	12821 N	15	150 ml	4/jaar	Zv van 1 maart tot 1 september (voorjaar/zomer) met maximaal 1,20 ltr/ha, interval tussen besputting minimaal 14 dagen. Zv van 1 september tot 1 maart (najaar/winter) met maximaal 1,50 ltr/ha, interval tussen besputting minimaal 14 dagen.	
		Movento OD	Spiroetramet	13404 N	23	0,50 ltr/ha	2/jaar	2 toepassingen per teeltcyclus per jaar, maximaal 0,50 ltr/ha per toepassing, interval minimaal 14 dagen	
		Rapitol	Pyrethrine+kalzoadaalide	13230 N	4	1000 ml	4/jaar	Interval minimaal 7 dagen	
		Insect-off	Kalzoeten van organische vezuren	-	-	1-2%	-	Besputting na 7-10 dagen herhalen	