

Paprika spuitadvieslijst

Uitgave januari 2019

Plag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel.nr.	Groep	Sputen /100 ltr.	Max toepassing / ha	Maximaal aantal toepassingen	Min interval in dagen	Wachtijd in dagen	Opmerkingen	
Insecticiden en acariciden											
Bladluis	Plenum 50 WG	Pymetrozine	12491 N	9b	20 gr	0,24 kg	2/jaar	7	1	Nu ook druppelen toegestaan (10 gr/1000 planten). Aflevertermin 30-10-2019, ocoebruiktermin 30-01-2020	
	Pediment Rookontwikelaar	Pririmicarb	5793 N	1a	Zie opmerking	4 kg	2/jaar	7	1	1 rook-ontwikelaar per 250-400 m ² . W.6 etiket Opgebruik tot 23-09-2019	
	Pirimor	Pririmicarb	5794 N	1a	50 gr	0,75 kg	2/jaar	7	1	Werk niet tegen alle soorten luizen. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Teppeki	Flonicamid	12757 N	29	60 gr	0,12 kg	2/jaar	7	1	Uitsluitend toegestaan van 1 april tot 1 november	
	Calypso	Thiacloprid	12452 N	4	25 ml	0,375 L	2/teelt	7	1	Druppelen op substraat vanaf 1 maart: 20 ml/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden.	
	Closer	Sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,20 L	2/jaar	7	1		
	Gazelle	Acetameprid	12809 N	4	25 gr	0,375 kg	2/jaar	20	3	Niet toepassen in een jonq gewas gedurende de periode van 1 november tot 1 april in verband met mogelijke nadelige gewasreacties	
	NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100 - 150 ml	1,50 L	5/jaar	7	7	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
	Sivanto Prime	Flupyradifurone	15598 N	4d	60-75 ml	0,90 - 1,12 L	2/jaar	10	3	Alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	
	Admire	Imidacloprid	11483 N	4	0,10 kg/ha		2/teelt	Druppelen 7 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 3,50 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Kohner 700 WG	Imidacloprid	13831 N	4	0,10 kg/ha		2/teelt	Druppelen 50 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 3,50 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Mineervlieg	Triard	Cyromazine	12014 N	17	100 ml	1,50 L	3/teelt	7	1	Werk alleen tegen larvestadium, trage aanvangswerking
		Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100 - 150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt
		NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups
Vertimec Gold		Abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
Abamectine		Abamectine	13190 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
Decis EC		Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,70 L	3/jaar	7	3		
Rups		Altacor	Chlorantranilprole	13643 N	28	10 gr	0,15 kg	4/jaar	7	1	Niet-grondgebonden; 2x/blok. Interval tussen blokken 90 dagen
		Nocturn	Pyridalyl	13359 N	un	100 ml	1,50 L	4/jaar	7	3	Snelle aanvangswerking, bestrijdt alle larvale stadia 2 toepassingen per blok interval tussen 2 blokken 28 dagen
		Runner	Methoxyfenoxide	12696 N	18	40 ml	0,80 L	2/jaar	7	1	
		Turex 50 WP	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	11702 N	11	50 - 100 gr	1 kg	6/jaar	7	n.v.o.	Het middel is pH gevoelig
	DIPal DF	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	14674 N	11	100 - 200 gr	1 kg	6/jaar	7	n.v.o.	Het middel is pH gevoelig	
	XenTari	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	12437 N	11	100 gr	1,50 kg	8/jaar	7	n.v.o.	Het middel is pH gevoelig	
	Defin	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	10944 N	11	50 gr	0,75 kg	3/teelt	7	1	Let op pH gevoelig!	
	Steward	Indoxacarb	12371 N	22	12,50 gr	0,25 kg	6/jaar	8	1		
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100 - 150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
	NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
	Nomolt	Teflubenzuron	9914 N	15	100 ml	1,50 L	3/teelt	7	3		
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,70 L	3/jaar	7	3		
	Wittevlieg	Admiral	Pyriproxyfen	11828 N	7	25 ml	0,375 L	2/teelt	10	3	Werk alleen tegen het ei- en larvestadium
		Botaniard WP	Beauveria bassiana	12612 N	1	62,50 gr	0,90 kg	6/teelt	5	n.v.o.	
		Botaniard vb	Beauveria bassiana	12611 N	1	125 ml	1,80 L	6/teelt	5	n.v.o.	
Plenum 50 WG		Pymetrozine	12491 N	9b	20 gr	0,24 kg	2/jaar	7	1	Nu ook druppelen toegestaan (10 gr/1000 planten). Aflevertermin 30-10-2019, ocoebruiktermin 30-01-2020	
Mycotal		Lecanicillium muscarium	10980 N	1	100 gr	2 kg	12/teelt	7	1	Alleen tegen larve. Voeg 250 ml Addit toe voor een betere werking.	
ERI		Maldextrine	15175 N	-	2,50 l	75 L	20/jaar	3	1		
Naturalis-L		Beauveria bassiana	13857 N	-	300 ml	3,0 L	5/teelt	5	n.v.o.	Insecticide op basis van schimmelsporen.	
Oberon		Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,75 L	4/jaar	10	3	Gebruik van 1 maart tot 1 september wordt afgeraden. 2 blokken van 2x met interval van 90 dagen (niet-grondgebonden teelt)	
Oikos		Azadirachtin	15729 N	26	100 - 150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
Closer		Sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,20 L	2/jaar	7	1		
NeemAzal - T/S		Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
Calypso		Thiacloprid	12452 N	4	25 ml	0,375 L	2/teelt	7	1	Druppelen op substraat vanaf 1 maart: 20 ml/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden.	
Sivanto Prime		Flupyradifurone	15598 N	4d	60 - 75 ml	0,90 - 1,12 L	2/jaar	10	3	Alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	
Nomolt		Teflubenzuron	9914 N	15	50 ml	0,75 L	3/teelt	7	3		
Admire		Imidacloprid	11483 N	4	0,10 kg/ha		2/teelt	Druppelen 7 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 3,50 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
Kohner 700 WG	Imidacloprid	13831 N	4	0,10 kg/ha		2/teelt	Druppelen 50 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 3,50 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden		
Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,70 L	3/jaar	7	3			
Trips	Tracer	Spirosad	12567 N	5	20 ml	0,30 L	5/jaar	7	1	Tijdens toepassen schadelijk voor bijen en hommels	
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100 - 150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
	NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,70 L	3/jaar	7	3		
	Spint	Floramite	Bifenoxaaf	12421 N	un	40 ml	0,60 L	4/jaar	7	1	Middel heeft contactwerking en werkt tegen spint en ei. pH gevoelig! pH spuitoplossing tussen 5,5 en 6 max 2x per blok interval 56 dagen
		Nisserun vb	Hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	0,30 L	2/teelt	7	3	Contactwerking. Tegen 1e larvestadium en eieren
		ERI	Maldextrine	15175 N	-	2,50 l	75 L	20/jaar	3	1	
		Oberon	Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,75 L	4/jaar	10	3	Gebruik van 1 maart tot 1 september wordt afgeraden. 2 blokken van 2x met interval van 90 dagen (niet-grondgebonden teelt)
Vertimec Gold		Abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
Abamectine		Abamectine	13190 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
Slakken		SluXX slakkenkorrels	Uzari(l)fosfaat	13316 N	1	7 kg/ha	7 kg	4/jaar	7		0,70 gr/m ²
Fungiciden											
Meeldauw		Flint	Trifloxystrobin	12289 N	11	12,50 gr	0,188 kg	3/jaar	7	1	Eerst proefbespuiting, na 7-10 dagen herhalen
		AQ 10	Ampelomyces quisqualis stam AQ 10	14294 N	NC		35 - 70 gr	12/jaar	7		Toepassen in 3000 liter water
	Ortiva	Azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	1,20 L	3/teelt	10	1	Scherp! Niet toepassen op jong gewas	
	Sernade SC	Bacillus subtilis	14536 N	44	8 ltr/ha	8 l	5/jaar	5		Altijd een uitvloeier meenemen	
	Pado	OC2- OCA	14921 N	NC		3 - 4 L	5/jaar	7	0	Uitsluitend preventief toe passen, minimaal 3x sputen. Toepassen met minimaal 1000 L/ha	
	Karma	Kalium waterstofcarbonaat	13854 N	NC		3 kg	8/jaar	7	1	Toepassen met 500 - 1500 ltr/ha	
	Sionum	Pyraclostrobin / Boscalid	12630 N	11	100 ml	1,50 L	3/teelt	7	1	Breedwerkende fungicide	
	Topaz 100 EC	Penconazole	9364 N	3	50 ml	0,50 L	4/teelt	8	3	Alleen niet-grondgebonden teelt	
	Vivando	Metrafanone	14231 N	U8	30 ml	0,30 L	2/jaar	7	3		
	Phytophthora	ATerra ME	Etridiazool	8766 N	14		0,40 - 0,80 L	2/teelt	14		In oogst gewas of na april i.v.m. scherpte. Druppelen in substraat
Botrytis	Propamocarb / Fosetyl	Propamocarb / Fosetyl	13221 N	28/33		3 L	4/jaar	14-28	3	Alleen op kunstmatig substraat	
	Prestop	Gliocladium catenulatum	13413 N	1	500 gr		6/jaar	21		10 L spuitoplossing per 500 planten	
	Prolectus	Fenpyrazamine	14453 N	17	80 - 120 gr	1,20 kg	3/jaar	10	1		
	Teldor	Fenhexamide	12130 N	17	100 gr	1,50 kg	3/jaar	7	1		
	Signum	Pyraclostrobin / Boscalid	12630 N	11	100 gr	1,50 kg	3/teelt	7	1	Alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	
	Thiram Granufo	Thiram	10172 N	M3			1/jaar			Plek op stengel of poot insmeren met papje 200 gr/1 ltr. Ocoebruiktermin 30-04-2019	
	Switch	Fludioxonil / Cyprodinil	12819 N	12/9	80 gr	1 kg	3/jaar	10	3	Stengelbehandeling	
	Pythium	ATerra ME	Etridiazool	8766 N	14		0,40 - 0,80 L	2/teelt	14		In oogst gewas of na april i.v.m. scherpte. Druppelen in substraat
		Mycostop	Streptomyces griseoviridis	11708 N	1						In de opkweekfase is de dosering 2 gr/1.000 planten. Zie etiket
		Propamocarb / Fosetyl	Propamocarb / Fosetyl	13221 N	28/33		3 L	4/jaar	14-28	3	Alleen op kunstmatig substraat
Proplant		Propamocarb-hydrochloride	12918 N	28		2 L	4/jaar	7	3	Alleen op kunstmatig substraat, 1-2 ltr/ha.	

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

Indeling insecticiden (IRAC)	Indeling fungiciden (FRAC)
1) carbamaten	1) MBC - fungiciden
3) pyrethroiden	2) dicarboximides
4) neonicotinen	3) DMI - fungiciden
5) spinosyns	4) PA - fungiciden
6) avermectinen	5) amines
7) pyriproxyfen	7) SDHI
9) pymetrozine	8) hydroxy-(2-amino)-pyrimidines
10) thiazolidines	9) AP - fungiciden
11) bacillus thuringiensis	11) Ool - fungiciden
12) org. tinverbindingen	12) PP - fungiciden
	14) aromatic hydrocarbons + heteroaromatics
	17) hydroxylanilides
	28) carbamates
	33) phosphonates
	40) CAA - fungiciden
	M2) inorganic
	M3) dithiocarbates and relatives
	M4) phthalimides
	M5) chloronitrils
	NC) diverse
	U8) benzophenonen

n.v.o. = niet op de dag voor de oogst

Neveneffect op natuurlijke bestrijders

	Inzetbaar in geïntegreerde teelt
	Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders
	Niet te combineren met natuurlijke bestrijders

Voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming:

- * Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking.
- * Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies.
- * Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade van gevolg.
- * Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van gevolg, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- * Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen BV deze lijst of gegevens uit deze lijst te verspreiden of te kopiëren.