

Tomaat spuitadvieslijst

Uitgave januari 2019

Plaa/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel.Nr.	Groep	Spuiten /100 ltr.	Max toepassing / ha	Maximaal aantal toepassingen	Min interval in dagen	Wachttijd in dagen	Opmerkingen	
Insecticiden en acariciden											
Bladluis	Plenum 50 WG	Pyrethroïne	12491 N	9b	20 gr	0,24 kg	2/jaar	7	1	Nu ook druppelen toegestaan (10 gr/1000 planten). Allevetermijn 30-10-2019, opgebruiktermijn 30-01-2020	
	Pediment Rookontwikkelaar	Primicarb	5793 N	1a	Zie opmerking	4 kg	2/jaar	10	1	1 rook-ontwikkelaar per 250-400 m². W 6 etiket Opgebruik tot 23-09-2019	
	Primor	Primicarb	5794 N	1a	50 gr	0,75 kg	2/jaar	10	1	Werk niet tegen alle soorten luizen. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Flipper Plus	Vetzuren, kaliumzouten	15184 N	1	2 l	16 L	5/teelt	7	1	Maximaal 3 bespuitingen per blok, pH water minimaal 7 of hoger	
	Calypso	Thiacloprid	12452 N	4	25 ml	0,375 L	2/teelt	7	1	Druppelen op substraat vanaf 1 maart: 20 ml/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden.	
	Closer	Sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,20 L	2/jaar	7	1		
	Gazelle	Acetameprid	12809 N	4	25 gr	0,375 kg	2/jaar	20	3	Niet toepassen in een jong gewas gedurende de periode van 1 november tot 1 april in verband met mogelijke nadelige gewasreacties	
	NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100-150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
	Sivanto Prime	Flupyradifuron	15598 N	4d	60-75 ml	0,90 - 1,12 L	2/jaar	10	3	Alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	
	Kohinor 700 WG	Imidacloprid	13831 N	4	0,1 kg/ha	0,10 kg/ha	2/teelt	Druppelen 50 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 3,50 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Admire	Imidacloprid	11483 N	4	0,1 kg/ha	0,10 kg/ha	2/teelt	Druppelen 7 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 3,50 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
Mineervlieg	Trigard	Cyromazin	12014 N	17	100 ml	1,50 L	3/teelt	7	1	Werk alleen tegen larvestadium, trage aanvangswerking.	
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100-150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
	NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,50 L	3/jaar	7	3		
Rups	Altacor	Chlorantraniliprole	13643 N	28	10 gr	0,15 kg	4/jaar	7	1	Niet-grondgebonden; 2x/blok. Interval tussen blokken 90 dagen	
	Nocturn	Pyridalyl	13359 N	un	100 ml	1,50 L	4/jaar	7	3	Snelle aanvangswerking, bestrijdt alle larvale stadia 2 toepassingen per blok interval tussen 2 blokken 28 dagen	
	Runner	Methoxyfenoxide	12696 N	18	40 ml	0,80 L	2/jaar	7	1		
	Turex 50 WP	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	11702 N	11	50 - 100 gr	1 kg	6/jaar	7	n.v.o.	Het middel is pH gevoelig	
	DIPel DF	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	14674 N	11	100-200 gr	1 kg	8/jaar	7	n.v.o.	Het middel is pH gevoelig	
	XenTari	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	12437 N	11	100 gr	1,50 kg	8/jaar	5	n.v.o.	Het middel is pH gevoelig	
	Defin	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	10944 N	11	50 gr	0,75 kg	3/teelt	7	n.v.o.	Maximaal 0,75 kg/ha per toepassing, interval minimaal 7 dagen Let op pH gevoelig!	
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100-150 ml	1,5 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
	NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2-3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
	Steward	Indoxacarb	12371 N	22	12,5 gr	0,25 kg	6/jaar	8	1	Heeft een nawerking op cicaden en wantsen	
	Nomolt	Teflubenzuron	9914 N	15	100 ml	1,5 L	3/teelt	7	3	Alleen in bedekte niet bodemgebonden teelt toegestaan.	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,50 L	3/jaar	7	3		
	Wittevlieg	Admiral	Pyriproxyfen	11828 N	7	25 ml	0,375 L	2/teelt	10	3	Werk alleen tegen het ei- en larvestadium
		PreFeRal	Paecilomyces fumosoroseus	12694 N	-	100 gr	3 kg	3/teelt	7	n.v.o.	Insecticide op basis van schimmelsporen
		Botanigard WP	Beauveria bassiana	12612 N	-	62,5 gr	0,9 kg	25/teelt	5	1	Insecticide op basis van schimmelsporen
		Naturalis-L	Beauveria bassiana	13957 N	-	300 ml	3,0 L	5/teelt	5	n.v.o.	Insecticide op basis van schimmelsporen
		Plenum 50 WG	Pyrethroïne	12491 N	9b	20 gr	0,24 kg	2/jaar	7	1	Nu ook druppelen toegestaan (10 gr/1000 planten). Allevetermijn 30-10-2019, opgebruiktermijn 30-01-2020
		ERII	Maltodextrine	15175 N	-	2,5 l	75 L	20/jaar	7	n.v.o.	
Mycotal		Laccaria bicolor	10980 N	-	100 gr	2 kg	12/teelt	7	1	Insecticide op basis van schimmelsporen	
Calypso		Thiacloprid	12452 N	4	25 ml	0,375 L	2/teelt	7	1	Druppelen op substraat vanaf 1 maart: 20 ml/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden.	
Closer		Sulfoxaflor	15631 N	4c	13 ml	0,2 L	2/jaar	7	1		
Oberon		Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,75 L	4/jaar	10	n.v.o.	Aan Oberon geen hechters /uitvoeiers toevoegen, ook niet mengen met andere middelen 2 blokken van 2x interval 90 dagen	
Flipper Plus		Vetzuren, kaliumzouten	15184 N	1	2 l	16 L	5/teelt	7	1	Maximaal 3 bespuitingen per blok, pH water minimaal 7 of hoger	
Oikos		Azadirachtin	15729 N	26	100-150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
NeemAzal - T/S		Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
Sivanto Prime		Flupyradifuron	15598 N	4d	60-75 ml	0,90 - 1,12 L	2/jaar	10	3	Alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	
Nomolt		Teflubenzuron	9914 N	15	100 ml	1,5 L	3/teelt	7	3	Werk alleen tegen het larvestadium	
Decis EC		Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,50 L	3/jaar	7	3		
Admire		Imidacloprid	11483 N	4	0,1 kg/ha	0,10 kg/ha	1/teelt	Druppelen 7 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 14 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
Kohinor 700 WG		Imidacloprid	13831 N	4	0,1 kg/ha	0,10 kg/ha	2/teelt	Druppelen 50 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 14 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
Trips	Tracer	Spinosad	12567 N	5	20 ml	0,30 L	5/jaar	7	1	Tijdens toepassing schadelijk voor bijen en hommels	
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100-150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
	NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,50 L	3/jaar	7	3		
Spint	Floramite	Bifenazat	12421 N	un	40 ml	0,60 L	4/jaar	7	1	Middel heeft contactwerking en werkt tegen spint en ei. pH gevoelig! pH spuitplossing tussen 5,5 en 6 maximaal 2x per blok interval 56 dagen	
	Cantack	acequinozyl	12939 N	20b	100 ml	1,0 L	2/jaar	7	3		
	ERII	Maltodextrine	15175 N	-	2,5 l	75 L	20/jaar	3	n.v.o.		
	Scelta	Cyflumetofen	13440 N	25	100 ml	1,0 L	2/jaar	10	4	Niet-grondgebonden teelt	
	Nissorun vlb	Hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	0,30 L	2/teelt	7	3	Contactwerking. Tegen 1e larvenstadium en eieren	
	Flipper Plus	Vetzuren, kaliumzouten	15184 N	1	2 l	16 L	5/teelt	7	1	Maximaal 3 bespuitingen per blok, pH water minimaal 7 of hoger	
	Borneo	Etoxazol	13227 N	10b	50 ml	0,50 L	1/jaar	1	3	Werk op de eieren larve en nimfen	
	Oberon	Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,75 L	4/jaar	10	n.v.o.	Aan Oberon geen hechters /uitvoeiers toevoegen, ook niet mengen met andere middelen 2 blokken van 2x interval 90 dagen	
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
	Oberon	Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,75 L	4/jaar	10	n.v.o.	Aan Oberon geen hechters /uitvoeiers toevoegen, ook niet mengen met andere middelen 2 blokken van 2x interval 90 dagen	
	Kumulus S	Zwavel	6147 N	-	200 gr	4 kg	6/jaar	7	3		
Tuta absoluta	Isonet-T	Tuta absoluta feromoon	15564 N	-	-	-	1/jaar	-	-	800 - 1000 dispensers per hectare	
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100-150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
Fungiciden											
Meeldauw	Flint	Trifloxystrobin	12289 N	11	12,5 gr	0,188 kg	3/jaar	7	1	Eerst proefbespuiting, na 7-10 dagen herhalen	
	AQ 10	Ampelomyces quisqualis stam AQ 10	14294 N	NC	-	35 - 70 gr	12/jaar	7	-	Toepassen in 3000 liter water	
	Fado	COS- OGA	14921 N	NC	-	3 - 4 L	5/jaar	7	0	Uitsluitend preventief toe passen, minimaal 3x spuiten. Toepassen met minimaal 1000 L/ha	
	Fungafash	Imazalil	7119 N	3	200 ml	3 L	3/teelt	7	1	Niet in winter op jong gewas	
	Frupica SC	Mepanipyrim	12229 N	9	45-90 ml	0,90 L	2/teelt	7	1		
	Abir	Buperimaat	6834 N	8	200 ml	2 L	4/teelt	10	3	Maximaal 3 bespuitingen in een blok	
	Reflect	Isoyrazam	15125 N	7	100 ml	1 L	2/jaar	7	1		
	Ortiva	Azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	1,20 L	3/teelt	10	1	Scherp! Niet toepassen op jong gewas	
	Karma	Kalium waterstofcarbonaat	13854 N	NC	-	3 kg	8/jaar	7	1	Toepassen met 500 - 1500 l/ha	
	Rocket EC	Triflumizool	13378 N	3	100 ml	1,50 L	5/jaar	7	1	Scherp! Niet voor 1 mei toepassen.	
	Serenade SC	Bacillus subtilis	14536 N	44	8 L/ha	8 L	9/jaar	5	-	Altijd een uitvoer meenemen	
	Signum	Pyraclostrobin / Boscalid	12630 N	11	100 ml	1,50 L	3/teelt	7	1	Breedwerkende fungicide	
	Topaz 100 EC	Penconazole	9364 N	3	50 ml	0,50 L	4/teelt	8	3	Alleen niet-grondgebonden teelt	
	Vivando	Metrafenone	14231 N	U8	30 ml	0,45 L	2/jaar	7	3		
	Phytophthora	AAterra ME	Etridiazool	8766 N	14	-	0,40 - 0,80 L	2/teelt	14	-	In oogst gewas of na april i.v.m. scherpte. Druppelen in substraat
		Ranman Top	Cyrazofamide	13467 N	-	42 ml	0,50 L	6/jaar	7	3	600-1.200 l water per ha, eerste behandeling vanaf 5e blad, na 7-10 dagen herhalen
		Revus	Mandipropamid	12969 N	40	50 ml	0,60 L	4/teelt	7	3	
		Previcur Energy	Propamocarb / Fosetyl	13221 N	28/33	-	3 L	4/jaar	14-28	3	Alleen op kunstmatig substraat
Botrytis	Hermosan 80 WG	Thiram	11609 N	M3	-	-	1/jaar	-	-	Plek op stengel of poot insmeren met papje 200 gr/l tr. Opgebruiktermijn 30-04-2019	
	Luna Privilege	Fluopyram	13832 N	7	-	1 L	4/jaar	7	1	Druppelen 40 ml/1000 planten. Nevenwerking op meeldauw.	
	Prestop	Gliocladium catenulatum	13413 N	NC	500 gr	6/jaar	21	-	-	10 L spuitplossing per 500 planten. Voor- en najaar: blok van 3 toepassingen. Interval 2 weken.	
	Scala	Pyrimethanil	11555 N	9	100 ml	1,50 L	2/teelt	7	1	Stengelbehandeling	
	Signum	Pyraclostrobin / Boscalid	12630 N	11	100 gr	1,50 kg	3/teelt	7	1	Alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	
	Switch	Fludioxonil / Cyprodinil	12819 N	12/9	80 gr	1 kg	3/jaar	10	3	Stengelbehandeling	
	Teldor	Fenhexamide	12130 N	17	100 gr	1,50 kg	3/jaar	7	1		
	Prolectus	Fenpyrazamine	14453 N	17	80-120 gr	1,20 kg	3/teelt	10	1		
Pythium	Thiram Granufo	Thiram	10172 N	M3	-	-	1/jaar	-	-	Plek op stengel of poot insmeren met papje 200 gr/l tr. Opgebruiktermijn 30-04-2019	
	AAterra ME	Etridiazool	8766 N	14	-	0,40 - 0,80 L	2/teelt	14	-	In oogst gewas of na april i.v.m. scherpte. Druppelen in substraat	
	Asperello T34	T. asperellum stam T34	15212 N	NC	-	5 kg, 8kg	1/teelt, 4/teelt	30	-	Mengen door teeltmedium: 10 g/m3 substraat. Druppel of aangieten: 10 g/m3 substraat, 10-200 g / 1000 planten	
	Previcur Energy	Propamocarb / Fosetyl	13221 N	28/33	-	3 L	4/jaar	14-28	3	Alleen op kunstmatig substraat	
Wondbehandeling	Proplant	Propamocarb-hydrochloride	12918 N	28	-	2 L	4/jaar	7	3	Alleen op kunstmatig substraat, 1-2 ltr/ha.	
	Scania Vital silica	Imazalil	13284 N	3	-	56 spuitbussen	2x per wond	14	-	Wond uitsnijden en ruim insmeren	
	Thiram Granufo	Thiram	10172 N	M3	-	-	1/jaar	-	-	0,5 tot 1 seconde op de wond spuiten, niet op blad Plek op stengel of poot insmeren met papje 200 gr/l tr. Opgebruiktermijn 30-04-2019	

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

||
||
||