

Paprika spuitadvieslijst

Uitgave juli 2019

Plaag/ziekte	Middel	Werkzame stof	Toel.nr.	Groep	Sputen /100 ltr.	Max toepassing / ha	Maximaal aantal toepassingen	Min interval in dagen	Wachttijd in dagen	Opmerkingen	
Insecticiden en acariciden											
Bladluis	Plenum 50 WG	Pymetrozine	12491 N	9b	20 gr	0,24 kg	2/jaar	7	1	Nu ook druppelen toegestaan (10 gr/1000 planten). Aflevertermin 30-10-2019, oopgebruiktermin 30-01-2020	
	Pediment Rookontwikkelaar	Pririmicarb	5793 N	1a	Zie opmerking	4 kg	2/jaar	7	1	1 rook-ontwikkelaar per 250-400 m ² . W.6 etiket Oopgebruik tot 23-09-2019	
	Pirimor	Pririmicarb	5794 N	1a	50 gr	0,75 kg	2/jaar	7	1	Werk niet tegen alle soorten luizen. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Teppeki	Flonicamid	12757 N	29	10 gr	0,12 kg	2/jaar	7	1	Uitsluitend toegestaan van 1 april tot 1 november	
	Calypso	Thiacloprid	12452 N	4	25 ml	0,375 L	2/jaar	7	1	Druppelen op substraat vanaf 1 maart: 20 ml/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden.	
	Closer	Sulfosfor	15631 N	4c	13 ml	0,20 L	2/jaar	7	1		
	Gazelle	Acetameprid	12809 N	4	25 gr	0,375 kg	2/jaar	20	3	Niet toepassen in een jong gewas gedurende de periode van 1 november tot 1 april in verband met mogelijke nadelige gewasreacties	
	NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100 - 150 ml	1,50 L	5/jaar	7	7	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
	Sivanto Prime	Flupyradifuron	15598 N	4d	60 - 75 ml	0,90 - 1,12 L	2/jaar	10	3	Alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	
	Admiral	Imidacloprid	11483 N	4	0,10 kg/ha		2/teelt	Druppelen 7 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 3,50 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Kohinor 700 WG	Imidacloprid	13831 N	4	0,10 kg/ha		2/teelt	Druppelen 50 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 3,50 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,70 L	3/jaar	7	3		
	Mineervlieg	Trigard	Cyromazine	12014 N	17	100 ml	1,50 L	3/teelt	7	1	Werk alleen tegen larvestadium, trage aanvangswerking
		Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100 - 150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt
NeemAzal - T/S		Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
Vertimec Gold		Abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
Abamectine		Abamectine	13190 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
Decis EC		Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,70 L	3/jaar	7	3		
Rups		Altacor	Chlorantranilprole	13643 N	28	10 gr	0,15 kg	4/jaar	7	1	Niet-grondgebonden; 2x/blok. Interval tussen blokken 90 dagen
		Nocturn	Pyridalyl	13359 N	un	100 ml	1,50 L	4/jaar	7	3	Snelle aanvangswerking, bestrijdt alle larvale stadia 2 toepassingen per blok interval tussen 2 blokken 28 dagen
		Rumer	Methoxyfenoxide	12696 N	18	40 ml	0,80 L	2/jaar	7	1	
		Turex 50 WP	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	11702 N	11	50 - 100 gr	1 kg	6/jaar	7	n.v.o.	Het middel is pH gevoelig
	DIPel DF	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	14674 N	11	100 - 200 gr	1 kg	8/jaar	7	n.v.o.	Het middel is pH gevoelig	
	XenTari	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	12437 N	11	100 gr	1,50 kg	8/jaar	5	n.v.o.	Het middel is pH gevoelig	
	Defin	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	10944 N	11	50 gr	0,75 kg	3/teelt	7	1	Let op pH gevoelig!	
	Steward	Indoxacarb	12371 N	22	12,50 gr	0,25 kg	6/jaar	8	1		
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100 - 150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
	NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
	Nomolt	Teflubenzuron	9914 N	15	100 ml	1,50 L	3/teelt	7	3		
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,70 L	3/jaar	7	3		
	Wittevlieg	Admiral	Pyriproxyfen	11628 N	7	25 ml	0,375 L	2/teelt	10	3	Werk alleen tegen het ei- en larvestadium
		Botaniard WP	Beauveria bassiana	12812 N	1	62,50 gr	0,90 kg	6/teelt	5	n.v.o.	
		Botaniard vtb	Beauveria bassiana	12811 N	1	125 ml	1,80 L	6/teelt	5	n.v.o.	
Plenum 50 WG		Pymetrozine	12491 N	9b	20 gr	0,24 kg	2/jaar	7	1	Nu ook druppelen toegestaan (10 gr/1000 planten). Aflevertermin 30-10-2019, oopgebruiktermin 30-01-2020	
Mycotal		Lecanicillium muscarium	10980 N	1	100 gr	2 kg	12/teelt	7	1	Alleen tegen larve. Voeg 250 ml Addit toe voor een betere werking.	
ERII		Malodextrine	15175 N	-	2,50 l	75 L	20/jaar	3	1		
Naturalis-L		Beauveria bassiana	13857 N	-	300 ml	3,0 L	5/teelt	5	n.v.o.	Insecticide op basis van schimmelsporen.	
Oberon		Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,75 L	4/jaar	10	3	Gebruik van 1 maart tot 1 september wordt afgeraden. 2 blokken van 2x met interval van 90 dagen (niet-grondgebonden teelt)	
Oikos		Azadirachtin	15729 N	26	100 - 150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
Closer		Sulfosfor	15631 N	4c	13 ml	0,20 L	2/jaar	7	1		
NeemAzal - T/S		Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
Calypso		Thiacloprid	12452 N	4	25 ml	0,375 L	2/teelt	7	1	Druppelen op substraat vanaf 1 maart: 20 ml/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden.	
Sivanto Prime		Flupyradifuron	15598 N	4d	60 - 75 ml	0,90 - 1,12 L	2/jaar	10	3	Alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	
Nomolt		Teflubenzuron	9914 N	15	100 ml	1,50 L	3/teelt	7	3		
Admiral		Imidacloprid	11483 N	4	0,10 kg/ha		2/teelt	Druppelen 7 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 3,50 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden	
Kohinor 700 WG	Imidacloprid	13831 N	4	0,10 kg/ha		2/teelt	Druppelen 50 dagen	n.v.o.	Druppelbehandeling op substraat 3,50 gr/1000 planten. Zie etiket voor toepassingsvoorwaarden		
Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,70 L	3/jaar	7	3			
Trips	Tracer	Spinosad	12567 N	5	20 ml	0,30 L	5/jaar	7	1	Tijdens toepassen schadelijk voor bijen en hommels	
	Oikos	Azadirachtin	15729 N	26	100 - 150 ml	1,50 L	5/jaar	7	3	Alleen bedekte, niet-grondgebonden teelt	
	NeemAzal - T/S	Azadirachtin	12455 N	26	250 ml	2 - 3 L	3/jaar	7	3	Ook nevenwerking op spint, bladluis, mineervlieg, trips en rups	
	Vertimec Gold	Abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
	Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
	Decis EC	Deltamethrin	7774 N	3	50 ml	0,70 L	3/jaar	7	3		
	Spint	Floramite	Bifenazaat	12421 N	un	40 ml	0,60 L	4/jaar	7	1	Middel heeft contactwerking en werkt tegen spint en ei. pH gevoelig! pH spuitplossing tussen 5,5 en 6 max 2x per blok interval 56 dagen
		Nissorun vib	Hexythiazox	10379 N	10a	20 ml	0,30 L	2/teelt	7	3	Contactwerking. Tegen 1e larvestadium en eieren
		ERII	Malodextrine	15175 N	-	2,50 l	75 L	20/jaar	3	1	
		Oberon	Spiromesifen	12588 N	23	50 ml	0,75 L	4/jaar	10	3	Gebruik van 1 maart tot 1 september wordt afgeraden. 2 blokken van 2x met interval van 90 dagen (niet-grondgebonden teelt)
Vertimec Gold		Abamectine	13087 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3		
Abamectine	Abamectine	13190 N	6	50 ml	0,75 L	3/jaar	7	3			
Slakken	Sluxx slakkenkorrels	Uzertillifosfaat	13316 N	1	7 kg/ha	7 kg	4/jaar	7		0,70 gr/m ²	
	Fungiciden										
	Meeldauw	Flint	Trifloxystrobin	12289 N	11	12,50 gr	0,188 kg	3/jaar	7	1	Eerst proefbespuiting, na 7-10 dagen herhalen
		AQ 10	Ampelomyces quisqualis stam AQ 10	14294 N	NC		35 - 70 gr	12/jaar	7		Toepassen in 3000 liter water
		Oriva	Azoxystrobin	12169 N	11	80 ml	1,20 L	3/teelt	10	1	Scherp! Niet toepassen op jong gewas
		Serenade SC	Bacillus subtilis	14536 N	44	8 ltr/ha		3/jaar	5		Altijd een uitlooiert meemeren
		Fado	COS- OGA	14921 N	NC		3 - 4 L	5/jaar	7	0	Uitsluitend preventief toe passen, minimaal 3x sputen. Toepassen met minimaal 1000 l/ha
		Karma	Kalium waterstofcarbonaat	13854 N	NC		3 kg	8/jaar	7	1	Toepassen met 500 - 1500 ltr/ha
		Signum	Pyraclostrobin / Boscalid	12630 N	11	100 ml	1,50 L	3/teelt	7	1	Breedwerkende fungicide
		Topaz 100 EC	Penconazole	9364 N	3	50 ml	0,50 L	4/teelt	8	3	Alleen niet-grondgebonden teelt
		Vivando	Metrafenone	14231 N	U8	30 ml	0,30 L	2/jaar	7	3	
		Phytophthora	ATerra ME	Etridiazool	8766 N	14		0,40 - 0,80 L	2/teelt	14	
	Previcor Energy		Propamocarb / Fosetyl	13221 N	28/33		3 L	4/jaar	14-28	3	Alleen op kunstmatig substraat
	Prestop		Gliocladium catenulatum	13413 N	1	500 gr		6/jaar	21		10 L spuitplossing per 500 planten
	Prolectus		Fenpyrazamine	14453 N	17	80 - 120 gr	1,20 kg	3/teelt	10	1	
Teldor	Fenhexamide		12130 N	17	100 gr	1,50 kg	3/jaar	7	1	Alleen niet-grondgebonden teelt (bedekt)	
Signum	Signum	Pyraclostrobin / Boscalid	12630 N	11	100 gr	1,50 kg	3/teelt	7	1	Plek op stemel of poot insmeren met papje 200 gr/1 ltr. Oopgebruiktermin 30-04-2019	
	Thiram Granulfo	Thiram	10172 N	M3		1 kg	1/jaar	10	3	Stengelbehandeling	
	Switch	Fludioxonil / Cyprodinil	12819 N	12/9	80 gr		3/jaar	10	3		
Pythium	ATerra ME	Etridiazool	8766 N	14		0,40 - 0,80 L	2/teelt	14		In oogst gewas of na april i.v.m. scherpste. Druppelen in substraat	
	Mycostop	Streptomyces griseoviridis	11708 N	1						In de opkweekfase is de dosering 2 gr/1.000 planten. Zie etiket	
	Previcor Energy	Propamocarb / Fosetyl	13221 N	28/33		3 L	4/jaar	14-28	3	Alleen op kunstmatig substraat	
	Proplant	Propamocarb-hydrochloride	12918 N	28		2 L	4/jaar	7	3	Alleen op kunstmatig substraat, 1-2 ltr/ha.	

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld

n.v.o. = niet op de dag voor de oogst

Indeling insecticiden (IRAC)

- 1a) carbamaten
- 3) pyrethroiden
- 4) neonicotinen
- 5) spinosyns
- 6) avermectinen
- 7) pyriproxyfen
- 9) pymetrozine
- 10) thiazolidines
- 11) bacillus thuringiensis
- 12) org. tinverbindingen
- 15) pyruzoelverbindingen
- 16) buprofezin
- 17) cyromazine
- 18) diacylhydrozinen
- 21) pyridazine verbindingen
- 22) indoxacarb
- 23) keteonolen
- 28) phthalic acid diamides
- UN) diverse

Indeling fungiciden (FRAC)

- 1) MBC - fungiciden
- 2) dicarboximides
- 3) DMI - fungiciden
- 4) PA - fungiciden
- 5) amines
- 7) SDHI
- 8) hydroxy-(2-amino)-pyrimidines
- 9) AP - fungiciden
- 11) Ool - fungiciden
- 12) PP - fungiciden
- 14) aromatic hydrocarbons + heteroaromatics
- 17) hydroxanilides
- 28) carbamates
- 33) phosphonates
- 40) CAA - fungiciden
- M2) inorganic
- M3) dithiocarbates and relatives
- M4) phthalimides
- M5) chloronitriels
- NC) diverse
- U8) benzophenonen

Neveneffect op natuurlijke bestrijders

- Inzetbaar in geïntegreerde teelt
- Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders
- Niet te combineren met natuurlijke bestrijders

Voor de beste combinatie van chemische met biologische bestrijding kunt u contact opnemen met uw specialist gewasbescherming:



- * Lees voor het gebruik altijd het etiket op de verpakking.
- * Alle informatie op deze lijst is bedoeld als advies.
- * Omdat de toepassing buiten onze controle gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade van gevolg.
- * Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van gevolg, die kunnen ontstaan bij of als gevolg van het gebruik maken van de op deze spuitadvieslijst verstrekte informatie.
- * Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van Iperen BV deze lijst of gegevens uit deze lijst te verspreiden.