

# RADIJS 2023

## SPUITADVIESLIJST RADIJS

De informatie op deze lijst verandert regelmatig door nieuwe toelatingen of aanpassingen van etiketten. Raadpleeg voor de meest actuele informatie [www.iperen.com/spuitadvieslijsten](http://www.iperen.com/spuitadvieslijsten).

Plaag/ziekte	Middel	Groep	Dosering per 100 ltr	Max. toe-passing /ha	Max. aantal toepassingen	Wachttijd in dagen	Opmerkingen
<b>INSECTICIDEN EN ACARICIDEN</b>							
<b>Koolvlieg</b>	<b>Altacor</b>	28	10 gr	0,10 kg	2/12 mnd	7	Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
	<b>Tracer</b>	5	20 ml	0,20 ltr	2/teelt	7	Max. 4 toepassingen/12 mnd.
	<b>Decis EC</b>	3a	50 ml	0,50 ltr	3/12 mnd	7	Spuiten met max. 1000 ltr/ha. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
<b>Mineervlieg</b>	<b>Budget Abamectine 18 EC</b>	6	50 ml	0,50 ltr	2/12 mnd	14	Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
	<b>Imex-Abamectine 2</b>	6	50 ml	0,50 ltr	2/12 mnd	14	Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
	<b>Vertimec Gold</b>	6	50 ml	0,50 ltr	2/12 mnd	14	Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
	<b>Decis EC</b>	3a	50 ml	0,50 ltr	3/12 mnd	7	Spuiten met max. 1000 ltr/ha. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
<b>Rupsen</b>	<b>Altacor</b>	28	10 gr	0,10 kg	2/12 mnd	7	Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
	<b>CoStar WG</b>	11a	50-100 gr	1,00 kg	6/teelt	-	-
	<b>Dipel DF</b>	11a	100-200 gr	1,00 kg	8/12 mnd	-	-
	<b>Turex Spuitpoeder</b>	11a	50-100 gr	1,00 kg	3/12 mnd	-	-
	<b>Turex WG</b>	11a	100 gr	1,00 kg	3/teelt	-	Max. 6 toepassingen/12 mnd.
	<b>XenTari</b>	11a	100 gr	1,00 kg	8/12 mnd	-	-
	<b>Tracer</b>	5	20 ml	0,20 ltr	2/teelt	7	Max. 4 toepassingen/12 mnd.
	<b>Decis EC</b>	3a	50 ml	0,50 ltr	3/12 mnd	7	Spuiten met 1000 ltr/ha. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
	<b>Decis EC</b>	3a	50 ml	0,50 ltr	3/12 mnd	7	Spuiten met 1000 ltr/ha. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
<b>Wittevlieg</b>	<b>Naturalis-L</b>	-	300 ml	3,00 ltr	5/teelt	-	-
	<b>Limocide</b>	UN	200-400 ml	3,20 ltr	6/12 mnd	-	-
	<b>Decis EC</b>	3a	50 ml	0,50 ltr	3/12 mnd	7	Spuiten met max. 1000 ltr/ha. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
<b>Trips</b>	<b>Budget Abamectine 18 EC</b>	6	50 ml	0,50 ltr	2/12 mnd	14	Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
	<b>Imex-Abamectine 2</b>	6	50 ml	0,50 ltr	2/12 mnd	14	Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
	<b>Limocide</b>	UN	200-400 ml	3,20 ltr	6/12 mnd	-	-
	<b>Vertimec Gold</b>	6	50 ml	0,50 ltr	2/12 mnd	14	Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
	<b>Decis EC</b>	3a	50 ml	0,50 ltr	3/12 mnd	7	Spuiten met max. 1000 ltr/ha. Extra eisen m.b.t. de max. hoeveelheid actieve stof/ha, zie etiket.
<b>Aaltjes</b>	<b>NEMguard DE</b>	-	20 kg/ha	60 kg	1/teelt	-	-
<b>Slakken</b>	<b>Ironmax Pro</b>	-	-	7,00 kg	4/12 mnd	-	-
	<b>Sluxx HP</b>	-	-	7,00 kg	4/12 mnd	-	Alleen naaktslakken.
<b>Ritnaald/Emelt</b>	<b>Entonem</b>	-	500.000/m <sup>2</sup>	-	-	-	-
	<b>Nemasys F</b>	-	500.000/m <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>FUNGICIDEN</b>							
<b>Alternaria</b>	<b>Amylo-X WG</b>	BM02	-	2,50 kg	6/teelt	1	Max. 48 toepassingen/12 mnd.
	<b>Ortiva</b>	11	-	1,00 ltr	1/teelt	21	-
	<b>Serenade</b>	BM02	-	8,00 ltr	6/12 mnd	-	Gewasbehandeling.
	<b>Serifel</b>	BM02	-	0,50 kg	6/teelt	-	Max. 48 toepassingen/12mnd.
	<b>Signum</b>	11 en 7	100 gr	1,50 kg	1/teelt	14	-
	<b>Switch</b>	12 en 9	-	0,60 kg	2/teelt	14	Min. interval 14 dagen.
	<b>Taegro</b>	BM02	-	0,37 kg	12/teelt	4 uur	-
	<b>Prestop</b>	BM02	100-300 gr	7,50 kg	6/12 mnd	-	Raadpleeg etiket voor de juiste bereiding.
<b>Botrytis</b>	<b>Signum</b>	11 en 7	100 gr	1,50 kg	1/teelt	14	-
	<b>Switch</b>	12 en 9	-	0,60 kg	2/teelt	14	Min. interval 14 dagen.
	<b>Prestop</b>	BM02	100-300 gr	7,50 kg	6/12 mnd	-	Raadpleeg etiket voor de juiste bereiding.
<b>Valse meeldauw</b>	<b>Pergado V</b>	40	-	0,60 ltr	2/teelt	14	Max. 4 toepassingen/12 mnd.
	<b>Previcur Energy</b>	28 en PO7	-	2,50 ltr	2/teelt	14	Max. 2,50 ltr/ha/toepassing. Max. 25 ltr/ha/12 mnd. Interval min. 7 dagen.
	<b>Limocide</b>	NC	200-400 ml	3,20 ltr	6/12 mnd	-	-
<b>Pythium</b>	<b>ASPERELLO T34 Biocontrol</b>	BM02	-	5,00 kg	1/teelt	-	10 gr/m <sup>3</sup> substraat.
	<b>Lalstop K61 WP</b>	BM02	-	1,00 kg	2/teelt	-	Ook zaadbehandeling mogelijk.
	<b>Serenade</b>	BM02	-	10 ltr	1/teelt	-	Grondbehandeling, max. 5 toepassingen/12 mnd.
	<b>Taegro</b>	BM02	-	0,37 kg	1/teelt	4 uur	Grondbehandeling.
	<b>Trianium-G</b>	BM02	-	50 kg	1/teelt	-	Volvelds strooien.
	<b>Trianium-P</b>	BM02	-	5,00 kg	1/teelt	-	Dosering afhankelijk van toepassingswijze.
	<b>Prestop</b>	BM02	100-300 gr	-	6/12 mnd	-	Max. 10 gr/m <sup>2</sup> /toepassing.
<b>Rhizoctonia</b>	<b>Signum</b>	11 en 7	100 gr	1,50 kg	1/teelt	14	-
	<b>Switch</b>	12 en 9	-	0,60 kg	2/teelt	14	-
	<b>Taegro</b>	BM02	-	0,37 kg	12/teelt	4 uur	-
<b>Sclerotinia</b>	<b>Amylo-X WG</b>	BM02	-	2,50 kg	6/teelt	1	Max. 48 toepassingen/12 mnd.
	<b>Contans</b>	BM02	-	4,00 kg	1/12 mnd	-	Grondbehandeling voor of tijdens het zaaien of planten.
	<b>Serenade</b>	BM02	-	8,00 ltr	6/12 mnd	-	Gewasbehandeling.
	<b>Signum</b>	11 en 7	100 gr	1,50 kg	1/teelt	14	-
	<b>Switch</b>	12 en 9	-	0,60 kg	2/teelt	14	-
	<b>Taegro</b>	BM02	-	0,37 kg	12/teelt	4 uur	-
<b>Echte Meeldauw</b>	<b>Amylo-X WG</b>	BM02	-	2,50 kg	6/teelt	1	Max. 48 toepassingen/12 mnd.
	<b>Fado</b>	-	-	4,00 ltr	5/teelt	-	Max. 15 toepassingen/12 mnd.
	<b>Karma</b>	-	-	3,00 kg	8/12 mnd	1	Kan schade veroorzaken, voer een proefbespuiting uit.
	<b>Ortiva</b>	11	-	1,00 ltr	1/teelt	21	-
	<b>Serenade</b>	BM02	-	8,00 ltr	6/12 mnd	-	Gewasbehandeling.
	<b>Sonata</b>	-	-	5-10 ltr	6/12 mnd	1	Gewasbehandeling.
	<b>Limocide</b>	NC	200-400 ml	3,20 ltr	6/12 mnd	-	-
<b>Hulpstoffen</b>	<b>Heliosol</b>	-	-	200-500 ml	-	-	-
	<b>Hi-Wett</b>	-	20 ml	-	-	-	-

Zorg dat de pH van de spuitvloeistof altijd tussen de 5 en 6 is. Bij andere pH-waarden kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen (sterk) achteruit gaan. Meet de pH-waarde na bereiding van de spuitvloeistof.

Het interval tussen de toepassingen is 7 dagen, tenzij anders vermeld in het opmerkingenveld.

### Neveneffect op natuurlijke bestrijders

- Inzetbaar in geïntegreerde teelt
- Gedeeltelijk te combineren met natuurlijke bestrijders
- Niet te combineren met natuurlijke bestrijders

Om resistentie te voorkomen moeten de middelen uit de verschillende groepen met elkaar worden afgewisseld.

### Indeling insecticiden (IRAC)

- 1a Carbamates
- 3a Pyrethroids, Pyrethrins
- 4a Neonicotinoids
- 4c Sulfoximines
- 4d Butenolides
- 5 Spinosyns
- 6 Avermectins
- 7c Pyriproxyfen
- 10a Hexythiazox
- 10b Etoxazole
- 11a Bacillus Thuringiensis
- 16 Buprofezin
- 18 Diacylhydrazines

### Indeling fungiciden (FRAC)

- 20b Acequinocyl
- 20d Bifenazate
- 21a Meti Acaricides and Insecticides
- 22b Semicarbazones
- 23 Tetrionic, Tetramic
- 25a Beta-Ketonitrile derivatives
- 28 Diamides
- 29 Fonicamid
- D Diversen
- UN Unknown or uncertain MoA
- UNF Fungal agents of unknown or uncertain MoA

### Indeling fungiciden (FRAC)

- 1 MBC - fungicides
- 3 DMI-fungicides
- 4 PA - fungicides
- 7 SDHI
- 8 Hydroxy- (2-amino-) pyrimidines
- 9 AP - fungicides
- 11 QoI-fungicides
- 12 PP-fungicides
- 14 AH-fungicides
- 17 KRI fungicides
- 20 Phenylureas
- 21 Qil - fungicides
- 28 Carbamates

- 33 Calcium-activated potassium channel
- 40 CAA-fungicides
- 44 Biologicals with multiple MoA
- 50 Aryl-phenyl-ketones
- BM02 Biologicals with multiple MoA
- M02 Inorganic
- M04 Phthalimides
- NC Unknown
- P01 BTH - fungicides
- P04 Polysaccharide elicitors
- P07 Phosphonates
- U06 Phenylacetamide