

RASSENADVIES: MAÏS

ADVIES

VOORKEURSRASSEN

RASSENLIJST

BESTELLEN



VAN IPEREN

groeispecialist sinds 1921

[iperen.com](https://www.iperen.com)

ADVIES VANUIT PASSIE EN SPECIALISME

Een geslaagde teelt, begint bij de inzaai van het juiste ras. In deze folder presenteren wij onze rassenselectie. Deze selectie is gemaakt op basis van het nationale rassenonderzoek en op onze praktijkervaringen.

Bij uw specialist kunt u terecht voor bedrijfsspecifiek advies over de maïsrassen die het beste bij uw situatie passen.

ONS ADVIES VOOR SEIZOEN 2026

Bij het selecteren van het meest geschikte ras spelen diverse eigenschappen een rol. Enkele kenmerken die voor ons van groot belang zijn:

☀ **Sterke landbouwkundige eigenschappen** zoals stevigheid, een goede beginontwikkeling en droogtetolerantie vormen de basis voor een betrouwbare en succesvolle oogst.

☀ **Lage ziektegevoeligheid** voor onder andere fusarium, builenbrand en het steeds vaker voorkomende kopbrand draagt bij aan oogst- en opbrengststabiliteit en een kwalitatief hoogwaardig en houdbaar eindproduct.

☀ **Opbrengst en rendement** worden gerealiseerd door een juiste afrijping in combinatie met een hoge opbrengst, uitgedrukt in korrel- of zetmeelopbrengst, VEM en/of totale drogestofopbrengst per hectare.

Onze specialisten adviseren u graag met een bedrijfsspecifiek maïsadvies, afgestemd op uw situatie en teeltomstandigheden.

ONZE VOORKEURSRASSEN

(Zeer) Vroeg	KWS Giso*	FAO 150, ultra vroege energieke silomaïs. Zeer goede voederwaarde. Degelijke en gezonde restplant.
	KWS Nevo	FAO 180, vroeg dubbeldoel ras met een hoge voederwaarde en een goede restplantverteerbaarheid.
	Pioneer P7179	FAO 180, ultra vroeg ras met sterke landbouwkundige eigenschappen, goede tolerantie tegen maïskopbrand. Optimale voederwaarde en oogstzekerheid.
	LG 31.206	FAO 205, vroeg en topvoederwaarde, hoge VEM-opbrengst, goede tolerantie voor maïskopbrand. Daarnaast uitstekend geschikt voor melkgeiten vanwege de vitale restplant.
	KWS Pluvio*	FAO 210, zeer vroege energiekrijke silomaïs / MKS / CCM / droge korrelmaïs. Goede jeugdgroei, snelle grondbedekking. Degelijke, gezonde restplant.
	KWS Allinno	FAO 210, zeer vroege allrounder met krachtige jeugdgroei en een gezonde restplant, perfect voor een tijdige oogst en hoge voederwaarde.
Vroeg	SY Symetric	FAO 210, een gezond en massaal ras met een hoge droge stof opbrengst. Goede landbouwkundige eigenschappen, sterk op kop- en builenbrand, zeer geschikt voor dubbeldoel.
	JPS Javelo*	FAO 220, kwaliteit-ras met hoge droge stof en zetmeelopbrengst. Geschikt voor silomaïs / MKS / CCM / droge korrelmaïs. Kenmerkt zich door zijn sterke landbouwkundige eigenschappen, een zeer stevige plant.
	LG Ashley	FAO 220, vroeg en dubbeldoel, zowel snij-,CCM- als korrelmaïs, hoog zetmeel, landbouwkundig zeer goed.
	LG Meluseen	FAO 220, topkwaliteit met hoge droge stof- en VEM-opbrengst, gezonde planten en goede tolerantie tegen maïskopbrand.
Midden-Vroeg	SY Opale	FAO 225, gezond en massaal ras met een zeer hoge VEM-opbrengst, uitstekende voederwaarde en sterke landbouwkundige eigenschappen.
	Pioneer P8255	FAO 230, dubbeldoel met hoge VEM-opbrengst, zeer goede droogtetolerantie en sterke landbouwkundige eigenschappen. Uitstekende zetmeelverteerbaarheid door de Dent-structuur van de korrel.
	EC Bazuk*	FAO 230, middenvroege allrounder met hoge kolf- en energieopbrengst, uitstekende droogtetolerantie en sterke plantgezondheid.
Laat	Pioneer P8677	FAO 245, stabiele dubbeldoel maïs, zowel hoog opbrengende en massale snijmaïs als MKS / CCM maïs.

* Nieuw ras

RASEIGENSCHAPPEN EN OPBRENGSTCIJFERS

In onderstaande tabellen ziet u de eigenschappen en opbrengstcijfers van korrelmaïs, corn cob mix en snijmaïs gebaseerd op 6-jarig onderzoek (2020 t/m 2025) van WUR – open teelten in Lelystad.

SNIJMAÏS, ZEER VROEGE EN VROEGE RASSEN

Gemiddelde resultaten over de jaren 2020 t/m 2025 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Stengelrot resistentie	Builenbrand resistentie	Maiskopbrand tolerantie ³⁾	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ⁴⁾	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35%ds	VEM/kgds ⁵⁾	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁶⁾
N	MAS 075B	7	8	5,5	8,5	o	7,5	93	8,5	41,7	109	106	102	101	93	94	4
	Papageno	6,5	7,5	6,5	7,5	-	8	101	8	40,2	105	105	101	100	101	101	6
	LG 31.211	7,5	7,5	8,5	8	-	7,5	96	8	39,3	103	103	102	101	98	99	6
	LG 31.206	7	7,5	7,5	7,5	+/-	7	95	8	39,3	103	102	100	102	99	101	6
	LG 31.205	7,5	7,5	8	6	-	6	105	8	39,3	103	103	103	100	100	99	6
N	Impression	8,5	8,5	7,5	8	o	7	98	7,5	39,1	102	101	101	101	102	103	3
	Benco	6,5	6,5	8	7	+	7	98	7,5	38,6	101	96	94	100	100	101	6
N	Concierto	7	8,5	6	8,5	o	8	105	7,5	38,5	101	100	98	98	100	97	3
	Emeleen	7,5	8,5	8,5	6,5	-	6,5	105	7,5	38,4	100	99	98	99	100	99	6
	LG 31.207	8	8,5	8	6	-	6,5	105	7,5	38,2	100	95	95	99	99	98	6
	Smoothi CS	7,5	7,5	6,5	9	++	8	99	7,5	38,2	100	97	98	96	96	92	6
N	LG 31.210	7	7	7	8	o	7	104	7	38,1	100	99	98	100	101	101	3
	LG 31.214	7	8	8,5	6,5	-	7	96	7,5	37,6	98	101	101	101	99	100	6
N	SU Addition	7,5	7,5	8	8	-	7,5	103	7	37,6	98	96	97	98	100	98	3
	KWS Curacao	8	8	7,5	8	-	8,5	104	7	37,4	98	94	96	97	103	100	6
	Revelation	7	7	6,5	6	-	7	104	8	37,0	97	100	102	101	101	102	5
	Cheerful	7,5	7	7,5	8,5	-	8	100	7,5	36,6	96	97	100	98	103	101	5
	LG 31.219	8	8,5	7,5	8	-	7	104	8	36,5	95	99	101	99	98	97	6
N	SY Vitamin	7,5	8	6	8,5	o	7	98	7,5	36,3	95	103	105	100	97	97	4
N	Clipperton	6	5,5	7,5	8	-	8	104	7,5	35,8	94	96	98	98	101	100	4
	Farmodena	6,5	6	7	7,5	-	6,5	97	7,5	35,7	93	99	103	97	100	96	6
	Around	8	7,5	8	8	-	7	96	8	35,1	92	97	102	97	99	96	6
	Privat	7	6,5	7	7,5	-	6,5	97	7	34,9	91	97	101	98	101	99	6
100=..resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha												38,2	398	381	1007	22,3	22,6

NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met die in tabel 2, midden-vroege/middenlate rassen.

* Onvoldoende resultaten beschikbaar

- 1) Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen.
Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.

2) Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

3) Classificatie maiskopbrand tolerantie:
++ = zeer goed aantasting < 1,0%
+ = goed aantasting van 1% tot < 2,0%
+/- = matig aantasting van 2% tot < 3,0 %
- = onvoldoende aantasting > 3%, of op enig proefveld boven de 5%
- o = nog in onderzoek
()=2 jaar onderzocht

4) De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.

5) De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.

6) Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek.
Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.

Bron: CSAR

SNIJMAÏS - MIDDEN VROEGE EN MIDDEN LATE RASSEN

Gemiddelde resultaten over de jaren 2020 t/m 2025 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Stengelrot resistente	Builenbrand resistentie	Maiskopbrand tolerantie ³⁾	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ⁴⁾	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35%ds	VEM/kgds ⁵⁾	Drogestof opbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁶⁾
	LG 32.257	7,5	7,5	7,5	8	-	7,5	102	7,5	39,1	107	108	106	101	100	101	5
	Meluseen	8,5	8,5	8	9	++	6,5	101	7	38,9	106	102	100	100	101	102	6
	Luxuri CS	7	7,5	8	7	-	7,5	93	8	38,6	106	104	102	102	95	96	6
N	DKC3323	7	7,5	7	8,5	-	8	103	7	38,3	105	103	100	100	103	103	4
N	LG 31.251	7	7,5	8	7,5	o	9	101	7	38,3	105	96	95	101	101	102	3
	Genialis KWS	8	8	8,5	8,5	++	8,5	91	7,5	38,2	105	105	105	101	97	98	6
	Gw endoleen	6,5	7	7,5	8,5	-	7,5	104	7	37,6	103	102	101	101	100	101	6
N	SY Opale	7,5	7,5	8	7	-	8	100	7	37,6	103	101	98	102	99	101	4
	P8153	7	8	7	7,5	-	7,5	102	7	37,6	103	97	95	100	100	100	6
	Greatful	8	8	8	7	-	8,5	94	7	37,4	102	103	103	101	98	98	6
N	P83224	7,5	7,5	7,5	8,5	-	8	104	6,5	37,3	102	97	97	100	102	102	4
N	SY Arax	9	8,5	6,5	7,5	-	8	100	7	36,9	101	102	100	100	100	100	4
	Farmueller	7,5	7,5	6	8	-	7	95	7	36,5	100	102	102	99	99	99	6
N	SY Remus	7,5	8,5	9	8,5	o	7,5	102	7	36,4	100	98	99	101	101	102	4
N	P82703	7,5	7	7	7	o	7	107	6	36,4	100	96	96	100	102	102	4
	P8317	8	8	8,5	7	(+)	6,5	101	6,5	36,2	99	97	97	100	102	103	5
N	Rooma	7,5	7	6,5	7,5	-	6,5	96	7	35,7	98	102	103	100	98	98	4
	SY Nomad	7,5	8,5	8,5	9	+	6,5	102	7	35,6	97	94	95	101	98	100	6
	EC Gisella	7	7	6,5	8	-	7	97	6,5	35,2	96	99	102	98	100	99	6
	Farmoritz	8,5	8,5	8	8	-	5,5	97	7	35,0	96	104	107	100	97	97	6
N	Nashorn	6,5	7	6	7,5	-	8,5	101	6,5	33,6	92	95	100	98	100	99	4
100=..resp. in cm, %, gr/kgds(2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha									320		36,6	36,6	383	374	992	23,4	23,2

NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met die in tabel 1, zeer vroege/vroege rassen.

* Onvoldoende resultaten beschikbaar

- 1) Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst w eergegeven in verhoudingsgetallen.
Drogestofgehalte ook in absolute w aarde. Overige eigenschappen in w aarderingscijfers, w aarbij een hoog cijfer voor een gunstige w aarderling staat.

2) Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

3) Classificatie maiskopbrand tolerantie:
++ = zeer goed (aantasting < 1,0%)
+ = goed (aantasting van 1% tot < 2,0%)
+/- = matig (aantasting van 2% tot < 3,0 %)
- = onvoldoende (aantasting > 3%, of op enig proefveld boven de 5%)
o = nog in onderzoek
() = 2 jaar onderzocht
- 4) De vroegheid van vrouw elijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben

5) Laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.
De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.

6) Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras w orden aanbevolen. Betrouw baarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek.
Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten w orden gebaseerd op de laatste 6 jaar.

Bron: CSAR

KORRELMAÏS EN CORN COB MIX

Gemiddelde resultaten over de jaren 2020 t/m 2025¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Snelheid grondbedekking	Vroegheid bloei	Plantlengte	Malkopbrand tolerantie ³⁾	Oogstbaarheid ⁴⁾	Stengelrot resistentie	Stevigheid	Zomerlegering	Bullenbrand op de kolf	Korrel			Aantal jaren in onderzoek ⁷⁾
											Vochtgehalte ⁵⁾	Drogestof gehalte	Drogestof opbrengst ⁶⁾	
	KWS Nevo	7,5	8	95	-	7	7	8,5	8,5	8,5	23,9	106	96	5
	Amarola	8,5	7	109	-	6,5	6,5	7,5	8,5	8,5	25,0	104	95	5
N	Amatino	7,5	7,5	102	-	5,5	5,5	7,5	8,5	8,5	25,1	104	98	4
N	KWS Allinno	7,5	7,5	104	o	7,5	8	6	*	8,5	25,1	104	99	3
	KWS Curacao	9	7	106	-	7	7,5	7	6,5	8	25,4	104	94	6
	KWS Emporio	8	7,5	105	(+/-)	6	6	7,5	8,5	8,5	26,2	103	98	5
N	KWS Pluvio	7,5	7,5	100	-	8,5	8,5	7,5	8,5	8	26,8	102	100	3
N	LG 31.241	7	7	104	o	7,5	7,5	7,5	6,5	8,5	27,1	101	100	3
N	Celebrato	7,5	7,5	99	-	8	8	8,5	8,5	8,5	27,2	101	98	4
N	LID2210C	6	6,5	102	o	8,5	8	8,5	8,5	8,5	27,3	101	100	3
N	P7737	6,5	7,5	97	-	7,5	7,5	8	9	8,5	27,5	101	99	4
	Ashley	8	7,5	103	-	7	7,5	7,5	8,5	7	27,5	101	99	6
	Megusto KWS	7	9	96	+	7,5	7	7,5	7,5	8,5	27,7	101	98	6
N	Chelsey	6,5	7	109	-	6	6	7	8	8	27,8	101	99	4
	LG 31.219	6,5	8	104	-	7,5	7,5	7,5	8,5	7,5	27,8	100	99	6
	Genialis KWS	8,5	7,5	93	++	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	27,8	100	96	6
	Climber	7,5	7	102	(+)	8	8,5	7	6,5	8	28,0	100	98	5
N	SY Facto	7	7,5	96	o	7,5	7,5	8	8,5	8,5	28,0	100	98	3
N	LG 32.257	7	7,5	105	-	7	7	6,5	7,5	8	28,5	100	105	3
N	P82848	6,5	7	99	o	8	8,5	7,5	8,5	8,5	28,7	99	104	4
N	P82000	7,5	7	105	o	6	6,5	6	8,5	9	28,7	99	106	3
N	Bacio	6,5	6,5	94	o	7	7	8	8,5	8,5	29,0	99	101	3
	Privat	6	7	98	-	7	7	7	6,5	7	30,3	97	103	6
N	Agro Sana	7	6,5	96	o	8	8	8	8,5	8,5	30,3	97	103	4
N	Beluga	7	7	100	o	6,5	7	7	7	6,5	30,4	97	102	3
N	KWS Arturello	6,5	6	96	o	7,5	7,5	8	8,5	8	30,8	96	106	4
N	Casadio	7	6,5	96	o	6,5	6,5	8	8,5	8	30,9	96	104	3
	Farmueller	7	7	99	-	6,5	6,5	7,5	8,5	8	31,3	96	105	6
	Farmoritz	5,5	7	100	-	8	8	7,5	8,5	8,5	31,3	96	103	6
N	EC Gisella	7	6,5	103	-	6,5	7	7	7	8,5	31,5	95	106	4
N	Bismark	6	7	96	-	7,5	8	6,5	7,5	8,5	32,4	94	106	4
100=...resp. in cm, %, ton/ha				314								71,8	11,6	

Bron: CSAR

* Onvoldoende resultaten beschikbaar

- 1) Plantlengte, drogestofgehalte en drogestofopbrengst zijn weergegeven in verhoudingsgetallen
- 2) Rassen gerangschikt op volgorde van vroegheid.
- N - Nieuw Aanbevelen, rassen die voor 1e of 2e jaar op de lijst staan.
- 3) Classificatie malkopbrand tolerantie:
- ++ = zeer goed aantasting < 1,0%
 - + = goed aantasting van 1% tot < 2,0%
 - +/- = matig aantasting van 2% tot < 3,0 %
 - = onvoldoende aantasting > 3%, of op enig proefveld boven de 5%
 - o = nog in onderzoek
 - () = 2 jaar onderzocht

- 4) Oogstbaarheid duidt op de kans op omgevallen planten door zowel een stengelrotaantasting als door gebrek aan stevigheid. Beide eigenschappen zijn ook afzonderlijk aangegeven.
- 5) Vochtgehalte is 100 - drogestofgehalte (absoluut). Laag vochtgehalte betekent lagere droogkosten en is dus gunstig voor korrelmais
- 6) 100 = 12.85 ton/ha bij 16% vocht (korrelmais) en 16.61 ton/ha bij 35% vocht (corn cob mix) - proefveldopbrengsten
- 7) Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevelen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.

ZAAIZAADBEHANDELING

Voor een geslaagde teelt bieden wij u verschillende zaaizaadbehandelingen.

Beschikbare zaaizaadontsmettingen per maiszaadkweker:

Kweker	Biostimulant aanwezig	Combinaam	Fungi-cide	Vogel-afweer	Ritnaal-den
LG	Ja	Starcover Active + Force	Ja	Matig	Ja
	Nee	Korit Pro	Ja	Redelijk	Nee
	Nee	Korit + Force *	Ja	Redelijk	Ja
Pioneer	Ja	Lumigen Premium + Bird Repellent (Korit)	Ja	Redelijk	Nee
	Ja	Lumigen Premium + Insecticide* (Korit + Force)	Ja	Redelijk	Ja
	Ja	Lumigen Premium + Lumiposa**	Ja	Redelijk	Ja
		(Korit + Lumiposa)			
KWS	Ja	Initio Bird Protect (Korit)	Ja	Redelijk	Nee
	Ja	Initio Pro *	Ja	Redelijk	Ja
		(Korit + Force)			
Syngenta	Nee	Korit	Ja	Redelijk	Nee
	Nee	Korit + Force*	Ja	Redelijk	Ja
Eurocorn	Nee	Maisprotektor (Korit)	Ja	Redelijk	Nee
JPS	Ja	Korit B-UP	Ja	Redelijk	Nee

*Op specifiek aantal rassen beschikbaar

** Lumiposa maximaal 1x per 3 jaar op perceel, Max 80.000 zdn/ha

BESTELLEN

Heeft u uw rassenkeuze gemaakt? Plaats dan tijdig bestelling. U kunt uw bestelling doorgeven aan uw adviseur of mailen naar: zaaizaden@iperen.com

LET OP: Voor zowel Korit als Force ontsmettingen geldt: * Tijdig bestellen

* Retouren zijn niet mogelijk.



GROESPECIALIST

Al generaties lang zorgt Van Iperen als Nederlands familiebedrijf met haar klanten voor de groei van gezonde én renderende gewassen. Op een manier die goed is voor mens, dier en plant. De liefde voor wat groeit en bloeit zit diep in onze vezels.

Onze akkerbouwspecialisten hebben ruime kennis en ervaring. Zij begeleiden u bij een integrale aanpak om gewassen te voeden, versterken en beschermen.

Van Iperen BV

☎ +31 (0)186 57 88 88

✉ info@iperen.com

🌐 www.iperen.com

